




LX-B-10


BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele III

LX


B


10

NAPOLI














HISTOIRE
DE
L'ACADEMIE
ROYALE
DES SCIENCES.

ANNE'E M. DCCXLI.

Avec les Mémoires de Mathématique & de
Physique, pour la même Année,


Tirés des Registres de cette Académie.



A AMSTERDAM,
Chez PIERRE MORTIER.

M. DCCXLVII.

Avec Privilège de N. S. Les Etats de Hollande & de West-Frise.





T A B L E

P O U R

L'HISTOIRE.

PHYSIQUE GENERALE.

SUR *les Tourbillons Cartésiens.* Page 1.

Diverses Observations de Physique &
d'Histoire Naturelle.

I. <i>Sur le rapport des différens degrés de fluidité des Liquides.</i>	15
II. <i>Sur l'Evaporation de l'Eau.</i>	23
III. <i>Trombe observée sur le Lac de Genève.</i>	27
IV. <i>Enfant beaucoup plus grand que ne comporte son âge.</i>	29
V. <i>Rouille singulière.</i>	30
VI. <i>Histoire Naturelle de la France Equinoxiale.</i>	32
VII. <i>Dents de Lamie.</i>	34
1741.	VIII.

T A B L E

VIII. Cachalot échoué près de Baignne.	35
IX. Crapaud mâle Accoucheur de la femelle.	39
X. Insectes qui se multiplient sans accouplement, & par la seule fécondité de chaque individu.	44
XI. Animaux coupés & partagés en plusieurs parties, & qui se reproduisent tout entiers dans chacune.	46
XII. Cire blanche de la Chine.	48
XIII. Ruisseau inflammable.	49
XIV. Fontaine sans fond, de Sablé.	50

A N A T O M I E.

Sur le siège de l'Âme dans le Cerveau.	52
Sur la réunion des Fractures des Os.	60
Sur de nouvelles Artères & Veines lymphatiques.	64
Sur l'Organe immédiat de la Voix & de ses différens tons.	69
Sur les mauvais effets de l'usage des Corps à balaine.	76

Diverses Observations Anatomiques.

I. Sur la Structure cellulaire du Corps vitré.	82
II. Observations sur la Cornée.	93
III. Sur les Noyés.	96
IV. Histoire d'une maladie singulière de la Matrice.	101
V. Cure	

POUR L'HISTOIRE.

V. Cure extraordinaire d'une Paralyse.	103
VI. Relâchement des Muscles des Bras & de la Tête.	104
VII. Conformations singulières.	104

CHYMIE.

Moyens de congeler l'Esprit de Vin, & de donner aux Huiles grasses quelques-uns des caractères d'une Huile essentielle.	106
Théorie chymique de la teinture des Etoffes.	107
Sur un Etain présenté à l'Académie.	110

BOTANIQUE.

Sur une espèce d'Ouate ou de matière cotonneuse trouvée au fond d'un Etang.	115
Recette pour garantir les Chevaux de la Piqure des Mouches.	116

ARITHMETIQUE.

Sur les Echelles Arithmétiques.	117
---------------------------------	-----

ALGEBRE.

Sur le Cas irréductible du troisième degré.	120
* 2	Sur

T A B L E

<i>Sur une Règle d'Algèbre que Descartes nous a donnée dans sa Géométrie, & qui a été critiquée par quelques Auteurs.</i>	124
<i>Sur le nombre des Racines Réelles ou Imaginaires, Réelles positives ou Réelles négatives, qui se trouvent dans les Equations de tous les degrés.</i>	128

G E O M E T R I E.

<i>Sur divers Elémens de Géométrie, publiés cette année par des Membres de l'Académie.</i>	130
<i>Sur la Jauge des Tonneaux.</i>	136

A S T R O N O M I E.

<i>Sur la hauteur apparente du Tropique du Cancer, & sur la détermination du Solstice d'Eté.</i>	145
<i>Sur le troisième Satellite de Jupiter.</i>	150
<i>Sur le Calcul infinitésimal des Différences dans la Trigonométrie sphérique, par rapport à l'Astronomie.</i>	157

Diverses Observations Astronomiques.

I. <i>Sur la Théorie de Saturne.</i>	164
II. <i>Sur</i>	

POUR L'HISTOIRE.

II. <i>Sur un Satellite aperçu auprès de la Planète de Vénus.</i>	169
III. <i>Sur les Antipodes.</i>	176
IV. <i>Projet pour l'invention des Longitudes.</i>	179
V. <i>Eclipse de Lune du 1 Janvier 1741.</i>	182
VI. <i>Soleil vu Elliptique à une hauteur considérable sur l'Horizon.</i>	183

GEOGRAPHIE ET HYDROGRAPHIE.

<i>Cartes Géographiques & Hydrographiques.</i>	185
<i>Cartes des Côtes méridionales de Terre-neuve, &c.</i>	193

MECHANIQUE.

<i>Sur un Problème de Dynamique.</i>	195
<i>Sur les Instrumens qui assortissent la Machine Pneumatique.</i>	199
<i>Sur la construction d'un Pendule qui ne puisse s'allonger par la chaleur, ni se raccourcir par le froid.</i>	201

Divers Mémoires & Observations de Méchanique.

I. <i>Sur les Forces Motrices des Corps.</i>	205
* 3	II. <i>Sur</i>

TABLE POUR L'HISTOIRE.

II. Sur le jet des Bombes.	210
III. Sur le roidissement & le relâchement alternatifs des Cordes qui tirent un Fardeau.	212
IV. Sur les différentes matières dont on peut fabriquer du Papier.	218
Machines & Inventions approuvées par l'Académie en 1741.	223
Eloge de Mr. Petit, Médecin.	231
Eloge de Mr. le Cardinal de Polignac.	246





TABLE

POUR LES MEMOIRES.

REFLEXIONS sur la Théorie du troisième Satellite de Jupiter. Par Mr. MARAL- DI.	Page I
Moyens de congeler l'Esprit de Vin, & de donner aux Huiles grasses quelques-uns des caractè- res d'une Huile essentielle. Par Mr. GEOF- FROY.	14
Sur le Cas irréductible du troisième degré. Par Mr. NICOLE.	33
Théorie Chymique de la Teinture des Etoffes. SE- COND MEMOIRE. Par Mr. HELLOT.	49
Démonstrations de la Règle de Descartes, pour connoître le nombre des Racines positives & né- gatives dans les Equations qui n'ont point de Racines imaginaires. Par Mr. l'Abbé DE GUA.	96
Observations sur la réunion des Fractures des Os. PREMIER MEMOIRE. Par Mr. DU HAMEL.	130
Sur la hauteur apparente du Tropique du Cancer, observée en 1740 avec un Sécateur de six pieds	de

T A B L E

<i>de rayon.</i> Par Mr. CASSINI DE THURY.	152
<i>Observations sur les Remèdes de Mlle. Stephens, pour la Pierre. SECOND MEMOIRE.</i>	
Par Mr. MORAND.	166
<i>Sur la détermination des Solstices.</i> Par Mr. CASSINI DE THURY.	172
<i>Observations Botanico-Météorologiques pour l'année 1740.</i> Par Mr. DU HAMEL.	203
<i>Sur les mauvais effets de l'usage des Corps à balaine.</i> Par Mr. WINSLOW.	234
<i>Mémoire dans lequel on examine par voie d'expérience, quelles sont les forces & les directions d'un ou de plusieurs Fluides renfermés dans une même Sphère qu'on fait tourner sur son Axe.</i>	
Par Mr. l'Abbé NOLLET.	251
<i>Observations par lesquelles on tâche de découvrir la partie du Cerveau où l'Ame exerce ses fonctions.</i> Par Mr. DE LA PEYRONIE.	271
<i>Formule sur les Echellès Arithmétiques.</i> Par Mr. DE BUFFON.	300
<i>Observations sur la réunion des Fractures des Os. SECOND MEMOIRE.</i> Par Mr. DU HAMEL.	303
<i>Calcul des Différences dans la Trigonométrie sphérique.</i> Par Mr. l'Abbé DE LA CAILLE.	324
<i>Sur des Pierres de Fiel singulières.</i> Par Mr. MORAND.	355
<i>Extrait des Observations & Opérations qui ont été faites dans le Bas Languedoc, pendant les mois de Mai & Juin de l'année 1740.</i> Par Mr. PITOT.	359
<i>Problèmes de Dynamique, où l'on détermine les</i>	Tra-

POUR LES MEMOIRES.

- Trajectoires & les vitesses d'une infinité de Corps mis en mouvement autour d'un centre immobile.* Par Mr. DE MONTIGNY. 379
- Expériences sur la force du Bois.* SECOND MEMOIRE. Par Mr. DE BUFFON. 394
- Observations sur l'étendue & la hauteur de l'Inondation du mois de Décembre 1740.* Par Mr. BUACHE. 449
- Sur les Instrumens qui sont propres aux expériences de l'Air.* TROISIEME PARTIE. Par Mr. l'Abbé NOLLET. 452
- Moyens de construire un Pendule qui ne puisse point s'allonger par la chaleur, ni se raccourcir par le froid.* Par Mr. CASSINI. 485
- Observations sur de nouvelles Artères & Veines lymphatiques.* Par Mr. FERREIN. 495
- Sur un Instrument propre à jager les Tonneaux & les autres vaisseaux qui servent à contenir des liqueurs.* Par Mr. CAMUS. 513
- Remarques sur l'ascension droite d'Arcturus.* Par Mr. LE MONNIER le Fils. 537
- De la formation de la Voix de l'Homme.* Par Mr. FERREIN. 545
- Instruction sur la manière de faire les Expériences rapportées dans le Mémoire précédent.* 575
- Eclipse de Lune observée le 13 Janvier 1740, à l'Hermitage qui est sur la montagne de Sainte-Victoire, à trois lieues à l'orient d'Aix en Provence.* Par Mr. l'Abbé DE LA CAILLE. 579
- Recherche du nombre des Racines Réelles ou Imaginaires, Réelles positives ou Réelles négatives, qui peuvent se trouver dans les Equations*

TABLE POUR LES MEMOIRES.

<i>tions de tous les degrés.</i>	Par Mr. l'Abbé DE GUA.	582
<i>Observations Météorologiques faites à l'Observatoire Royal pendant l'année 1741.</i>	Par Mr. MARALDI.	662
<i>Mémoire sur un Fœtus monstrueux.</i>	Par Mr. GOURRAIGNE, de la Société Royale de Montpellier.	665

Avis au Relieur.

Le Relieur prendra garde que le papier qui est à côté des Figures doit être conservé pour faire déborder les Figures hors du Livre.

Den Boekbinder zy gewaarschouwt het papier ter zyde de Figure niet af te snylen : maar zodanig in te zetten, dat dezelve buiten het Boek uit slaan.




HISTOIRE

DE

L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES.

ANNÉE M. DCCXLI.



PHYSIQUE GÉNÉRALE.

*SUR LES TOURBILLONS
CARTESIENS (a).*



R. l'Abbé de Molières, & Mr.
l'Abbé Nollet ont fait cette an-
née diverses expériences sur les
forces & les directions d'un ou
de plusieurs fluides renfermés
dans une même sphère qui tour-
ne

(a) Voyez les Mémoires p. 203.

Hist. 1741.

2 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

ne sur son axe, relativement au système des Tourbillons.

* Pag. 2. in 4. Avant que de parler des expériences de Mr. l'Abbé Nollet, qui font le principal sujet de cet Extrait, nous allons donner * une histoire succincte de ce qu'on avoit tenté avant lui sur la même matière.

Képler avoit pris garde que les corps légers, tels que les pailles & les fétus, qui viennent à rencontrer un tournant d'eau, y étoient bientôt entraînés au centre de la circulation; & la raison qu'il en donnoit, étoit que l'eau se trouvant plus pesante que ces corps, & tendant avec plus de force à gagner les extrémités, ou à suivre la tangente du cercle, devoit repousser vers le centre tout ce qu'elle rencontroit de plus léger qu'elle. Mais Képler, au-lieu de tirer delà, comme a fait Descartes, une explication mécanique de la Pesanteur, employa ce même raisonnement à rejeter tout mécanisme de ce phénomène. Il aima mieux l'attribuer à une cause intrinsèque, à une *vertu naturelle attractive*, tant par rapport à la terre, qu'aux autres systèmes ou assemblages de matière de l'Univers; & cela, disoit-il parce que les corps terrestres sont certainement plus pesans que l'éther qui les environne, & qui circuleroit autour d'elle: raisonnement qui pêche & qui porte à faux par bien des endroits, puisqu'on y substitue l'effet à la cause, & qu'on y regarde déjà comme pesans des corps qui ne doivent le devenir que par le mouvement ou par l'impulsion des uns sur les autres. D'ailleurs, l'eau des tournans ne circule presque jamais dans

dans des cercles, elle décrit plutôt des spirales qui vont aboutir à un centre, où il y a même quelquefois un enfoncement, lorsqu'elle s'engouffre dans quelque cavité. Ainsi il n'est pas étonnant dans tous ces cas, que les corps légers qui surnagent, soient entraînés vers le centre du tournant, & ils y sont en effet plutôt entraînés que chassés par voie d'impulsion, & par la force centrifuge de l'eau. Il n'est pas vrai encore que des corps plongés dans un fluide circulant, ne doivent céder à sa réaction vers le centre que par leur légèreté, ils le doivent aussi par le moins de mouvement qu'on leur suppose, & par le repos mutuel de leurs parties entre elles.

Quant à l'usage que Descartes a fait du principe rejeté par Képler, il est trop connu, & il a été trop souvent * expliqué dans cette histoire, pour nous y arrêter. Il n'est question ici que d'une expérience que Descartes avoit indiquée, mais qu'il n'a point faite, savoir, de la rotation d'un globe plein d'eau, dans lequel nageroient plusieurs petits corps solides, ou même fluides, & tels que quelques bulles d'huile ou d'air. C'est, dit Mr. l'Abbé Nollet, un juge que ce Philosophe s'étoit nommé lui-même. S'il l'a trouvé dans ces derniers tems, ceux qui le lui ont procuré ne seront pas accusés d'avoir corrompu ce juge en sa faveur.

Dès la troisième année de l'établissement de cette Académie, c'est-à-dire, en 1669, la grande question de la Pesanteur des corps y fut agitée; & l'Attraction mutuelle des uns vers les autres, telle que quelques Philosophes la conçoivent aujourd'hui, n'y manqua

4 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

pas de partisans. Mr. de Roberval toujours antagoniste de Descartes , après avoir exposé modestement les raisons qu'il avoit de douter que nous fussions jamais en état de connoître la cause de ce phénomène, à l'égard duquel , ajoutoit-il, nous ne sommes peut-être que comme des aveugles à l'égard des couleurs, se détermina en faveur d'une force interne & innée dans les corps , qui en réunit les parties & les détermine à s'assembler autour d'un centre commun. Mr. Frénicle s'éloigna peu de ce sentiment, & il admit l'Attraction comme une *vertu conservatrice* que l'Auteur de la Nature avoit imprimée à tous les êtres corporels. Mais Mrs. Buot, Perrault & Huyghens s'opposèrent fortement à toutes ces vertus attractives, innées & conservatrices; ils ne voulurent admettre que les impulsions, quelle qu'en fût la cause , pour principe de la descente des graves vers le centre de la Terre; & ils proposèrent diverses expériences pour en démontrer la possibilité. Mr. Huyghens qui a toujours cru qu'il falloit raisonner de tous les effets naturels d'après des causes mécaniques & intelligibles, *ou bien renoncer à toute espérance de jamais rien comprendre dans la Physique*, fut un de ceux qui insistèrent le plus en faveur de la théorie des Tourbillons , & l'on peut dire qu'il se la rendit propre par tout ce qu'il y ajouta de nouvelles vues pour * l'éclaircir & pour la rectifier. Il fit voir dès-lors à l'Académie une expérience mieux assortie à ce système que les tournans d'eau dont nous venons de parler, quoique encore bien imparfaite. Il ajusta sur un pivot un vaisseau

* Pag.
4. in 4.

vaisseau cylindrique à fond plat, rempli d'eau jusqu'à une certaine hauteur; il jetta dans cette eau plusieurs petits brins de cire d'Espagne concassée, dont la pesanteur spécifique est tant soit peu plus grande que celle de l'eau, & après avoir fait tourner quelque tems le vaisseau sur son axe, il l'arrêta subitement pour laisser à l'eau seule le mouvement aquis par la rotation, & l'on vit tous les brins de cire se rassembler en peloton autour du centre.

Nous ne nous étendrons pas sur cette expérience, qui est rapportée dans la plupart des Traités de Physique, & qui a vraisemblablement enfanté toutes celles qui sont venues depuis. Mr. Huyghens lui-même ne fut pas longtems à s'apercevoir de ce qu'elle avoit de défectueux, sur-tout dans l'application qu'on en fait aux Tourbillons de Descartes. Il remarqua que la rotation ne s'y faisant pas sur un centre unique, mais, pour ainsi dire, sur une infinité de centres rangés en ligne droite ou sur l'axe de rotation, soit du cylindre, soit du Tourbillon quelconque, il falloit nécessairement que la matière chassée par le fluide vers cet axe, s'y rangeât autour en petit cylindre ou en fuseau, & par conséquent que si cette mécanique avoit lieu, il faudroit que la matière qui forme le Soleil & les Planètes se fût rangée de même sur les axes de leurs Tourbillons. C'est ce qui l'obligea, comme on vit depuis dans son Traité de la Pesanteur, à imaginer que la matière éthérée dont l'effort centrifuge cause la Pesanteur, tournoit en tous sens, & sur une infinité de grands cercles, autour du point central de

6 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

chaque Tourbillon. Par ce moyen la matière du Soleil ou de la Planète étant également chassée de toutes parts vers ce point, elle sera contrainte de s'y assembler sphériquement. Mais Mr. Huyghens n'en fit point l'expérience, qui seroit en effet d'une exécution très difficile, par cette multiplicité d'axes sur lesquels il faudroit faire tourner le fluide autour d'un même centre.

* Pag. 5.
in 4.

* Cependant Mr. Saurin peu satisfait de ce mouvement en tous sens de la matière éthérée de Mr. Huyghens, & plus étroitement attaché aux Tourbillons de Descartes, donna en 1703, au Journal des Savans, un Mémoire dans lequel il fait voir que, spéculativement parlant, un fluide qui circule autour d'un seul axe, & dans un globe creux d'où il ne peut s'échaper, devoit sans cesse être repoussé perpendiculairement par les parois intérieures, & réagir vers le centre. Il étendit & orna cette idée dans un Mémoire qu'il lut à une Assemblée publique de l'Académie, & qu'on peut voir dans le Volume de 1709. La réponse qu'il fait aux difficultés de Mr. Huyghens sur cette matière, porte encore sur quelques-unes de celles de Mr. Newton.

Il faut compter parmi les expériences qui ont été entreprises en faveur des Tourbillons célestes, celles que fit Mr. Saulmon en 1712 & 1714 (a), quoiqu'il n'eût pour but que de constater les différentes vitesses des couches du fluide, conformément à la règle de Képler, sur

(a) Voyez l'Hist. & les Mémoires de ces années.

sur les tems périodiques des révolutions des Planètes autour du Soleil. Il se servoit d'un grand baquet cylindrique, comme avoit fait Mr. Huyghens, avec cette différence, que ne s'agissant pas ici directement d'expliquer la cause de la Pesanteur, mais seulement les différentes vitesses des corps qui nagent à peu-près dans le même plan d'un grand cercle de la sphère, ou entre les limites assez étroites d'une même zone, les inductions qu'on en pouvoit tirer à cet égard, devoient être beaucoup plus légitimes que celles qu'on en avoit tirées par rapport à la Pesanteur. Mr. Saulmon y déterminoit l'eau à tourner par le moyen d'une canne, le vaisseau demeurant immobile, parce que, comme il l'avoit observé, lorsqu'on fait tourner le vaisseau sur un pivot, toutes les parties de l'eau, & les corps plongés dedans, achèvent leurs révolutions en des tems à peu-près égaux. Mais malgré toutes les précautions de Mr. Saulmon, l'expérience demeura insuffisante, elle ne put représenter les mouvemens des Planètes dans le Zodiaque, & elle y fut même quelquefois contraire.

* On en est venu bien tard à l'expérience du ^{in 4.} Tourbillon sphérique par le moyen d'un fluide renfermé dans un globe de verre creux, & tournant sur son axe. C'étoit pourtant la seule décisive sur les Tourbillons de Descartes, si quelque expérience le pouvoit être dans une matière où il est si difficile à l'art d'imiter la Nature; car nous ne parlerons pas de quelques expériences qui avoient été faites sur les Tourbillons considérés sous d'au-

tres aspects que celui de la Pesanteur. Mr Bulffinger ci-devant Professeur de Physique de l'Académie Impériale de Pétersbourg, & aujourd'hui Conseiller Privé de S. A. S. M. le Duc de Wirtemberg à Stutgard, est le premier que je sache, qui nous ait donné quelque chose d'exact sur la matière dont il s'agit. Ses expériences accompagnées de réflexions savantes & judicieuses, se trouvent dans le premier Tome des Mémoires de l'Académie de Pétersbourg, & il en résulte que les corpuscules de matière, ou les bulles d'un autre fluide quelconque, plongés dans celui qui remplit le globe tournant, se rangent autour de son axe, non en noyau sphérique, mais cylindrique, selon la pensée de Mr. Huyghens : ce qui donne occasion à Mr. Bulffinger de faire quelques remarques sur la démonstration de Mr. Saurin, qu'il ne croit pas applicable aux Tourbillons effectifs, & tels qu'ils peuvent exister dans la Nature.

Reste l'expérience qu'exigeoit l'hypothèse de Mr. Huyghens, d'un fluide tournant en tous sens dans de grands cercles de la sphère. En tous sens, il n'est pas permis d'en espérer l'exécution ; mais on peut en faire l'essai en y employant d'abord deux mouvemens dont les directions se coupent à angles droits.

Mr. Bulffinger qui nous a encore donné la description d'une semblable machine, dans l'excellente pièce qui remporta le Prix proposé par l'Académie en 1728, sur la cause physique de la Pesanteur, dit en avoir vu le jeu en petit, & sur le modèle que lui en avoit fourni un de ses amis ; mais elle n'étoit pas

encore achevée en grand, lorsqu'il fut obligé de nous envoyer sa Dissertation. Cependant il en a détaillé & démontré * les effets d'après des principes de Méchanique & d'Hydrostatique, qui lui persuadent qu'étant bien exécutée, elle représentera le phénomène de la Pesanteur dans l'hypothèse des Tourbillons; c'est-à-dire, que les particules de matière plongées dans le fluide soumis à cette double rotation, s'assembleront autour de son centre, & y formeront un noyau sphérique. C'est aussi par l'hypothèse des Tourbillons que Mr. Bulffinger explique la Pesanteur, & il croit qu'on ne doit abandonner une idée si naturelle qu'à la dernière extrémité.

* Pag.
7. in 4.

Enfin, Mr. l'Abbé de Molières ayant entrepris de rétablir les Tourbillons de Descartes, tant que formés par la révolution d'un fluide autour d'un seul axe, & après avoir publié divers ouvrages sur ce sujet, voulut l'année dernière & dans celle-ci, en faire voir la possibilité & les effets, par rapport à la Pesanteur, dans un globe rempli d'eau, & tournant verticalement sur un axe horizontal. Il avoit lu auparavant un Mémoire où il attaquoit les difficultés de Mrs. Huyghens & Bulffinger contre le Tourbillon résultant d'un seul mouvement autour de l'axe. Toutes les expériences qui en faisoient naître un noyau cylindrique lui devenoient suspectes, ou lui paroissoient mal exécutées, & les loix du mouvement qui lui étoient communes avec ces deux Géomètres, devoient, selon lui, donner en cette occasion des résultats tout contraires aux conclusions de ces Auteurs.

Mr. l'Abbé de Molières prit donc un globe de verre creux rempli d'eau, où il enferma une bulle d'air, seulement d'une ou deux lignes de diamètre; car la petitesse de cette bulle, & le rapport de son diamètre à celui du ballon ou du Tourbillon factice entroient dans sa théorie; & ayant fait tourner le globe de la manière que nous venons de dire, par le moyen du tour sur lequel on a coutume de l'ajuster, on vit en effet quelquefois la petite bulle, ou quelque autre portion d'air encore plus petite, que la première agitation de l'eau avoit détachée de celle-ci, se retirer vers le centre. Cependant, comme l'air n'est jamais sans quelque adhésion aux corps * où il s'applique, la petite bulle qu'on vouloit faire aller au centre, s'arrêtoit souvent aux parois intérieures du globe, & sur-tout vers ses poles, aux extrémités de l'axe de rotation, où la force centrifuge du fluide qui devoit la repousser au centre, étoit moins grande. Pour l'arracher du verre, il falloit quelquefois & pour un moment, incliner un peu cet axe, qui auroit dû être toujours exactement horizontal; après quoi la bulle d'air s'arrêtoit à la vérité quelquefois au centre du globe, ou vers le milieu de l'axe, mais encore & aussi souvent, à un autre de ses points quelconques, & elle remontoit au pôle opposé, si l'on ne rétablissoit pas promptement la position horizontale; position dont on ne pouvoit guère s'assurer parfaitement. Cependant Mr. l'Abbé de Molières prenoit pour preuve de son système, tous les cas où la bulle d'air paroissoit avoir été chassée vers le centre par la rotation

* Pag.
8. in 4.

tation du fluide, & n'attribuoit tous les cas contraires qu'à l'imperfection des instrumens, & aux difficultés inséparables de l'expérience. Mais l'Académie sous les yeux de qui cette expérience fut faite & répétée, n'en jugea pas de même. La plus grande partie de ceux qui en furent témoins, trouvèrent que la bulle d'air paroissoit indifférente à se porter vers quelque point que ce fût de l'axe, & que si elle affectoit de se fixer à l'un des poles, ce n'étoit que par les raisons que nous venons d'en donner ; en un mot, que l'expérience n'indiquoit dans le fluide circulant qu'une force *anisfuge*, qui ne pouvoit par conséquent imprimer par sa réaction, une tendance centrale aux corps plus légers qu'on y avoit plongés.

Mr. l'Abbé Nollet, qu'on fait être très exercé dans la Physique expérimentale, se déclara non seulement contre l'expérience de Mr. l'Abbé de Molières, & contre les inductions que Mr. l'Abbé de Molières en tiroit, mais aussi contre les principes sur lesquels il les avoit fondées. Il fit voir à l'Académie la même expérience sous d'autres faces, & il y lut quelque tems après le Mémoire qu'il donne aujourd'hui. Mr. l'Abbé de Molières répliqua, comme par provision, & en attendant qu'il pût traiter la matière plus à * fond. Il soutint que les expériences & les observations que Mr. l'Abbé Nollet & lui avoient faites, démontroient à l'œil, qu'outre la force *anisfuge* incidente, & qui ne procédoit que du poids des parties de l'eau, il y avoit dans le Tourbillon sphérique une force centrifuge

Pag. 9.
in 4.

ou plutôt centrale qui en résultoit ; que c'étoit cette force qui contraignoit la bulle d'air d'aller au centre du globe, & d'y séjourner malgré la tendance qu'elle a vers le pôle, lorsque l'axe du Tourbillon n'est pas exactement horizontal ; & qu'à plus forte raison se maintiendrait-elle au centre , si l'on pouvoit toujours conserver à l'axe sa situation horizontale , & ôter à la bulle son adhésion , & à l'eau , qui tient lieu ici de matière éthérée , sa pesanteur. Il seroit à désirer en effet qu'on pût y employer des matières exemptes de toute pesanteur spécifique , & qui n'eussent de tendance quelconque que ce qu'elles doivent en recevoir du mécanisme proposé. Il faudroit presque opérer sur un petit monde séparé du grand , & pouvoir y répandre le mouvement & la vie.

On voit assez par tout ce que nous venons de dire , quel a été le but du Mémoire de Mr. l'Abbé Nollet , & quel en peut être le résultat. Il a examiné les effets rapportés ci-dessus, séparément, dans chaque cas , & dans le concours de toutes les circonstances qui contribuent à les produire , & il en a donné raison d'après l'expérience & par le raisonnement ; il a suivi la petite bulle d'air de Mr. l'Abbé de Molières dans toutes les positions qu'elle prend sur l'axe du Tourbillon ; il a montré sur-tout que la position centrale de cette bulle ne sauroit jamais être due à la force centrifuge & réactive du fluide circulant où elle nage , & qu'en quelque parallèle ou tranche verticale qu'elle se trouve , elle doit y rester, lorsque l'axe est exactement horizontal ;

tal ; parce que toutes les tranches d'eau contigues ayant à pareille distance de l'axe des forces centrifuges égales, on ne voit aucune cause qui puisse déterminer la bulle d'air à passer d'une tranche ou d'un parallèle à l'autre. Et à l'égard de l'objection fondée sur le poids de l'eau, ou de sa tendance * vers le centre de la Terre, bien différent de celui du globe qui renferme cette eau, il y répond, en ce que lorsqu'on fait tourner le globe sur son axe, toutes les parties de l'eau sont en équilibre entre elles, & que leur pesanteur ne change rien à leur mouvement de rotation.

* Pag.
10. in 4.

Comme il ne s'est pas borné à la seule expérience de Mr. l'Abbé de Molières, il a fait entrer dans le globe avec l'eau plusieurs autres matières solides ou liquides, par exemple, de l'huile de Térébenthine colorée, & en assez grande quantité pour pouvoir occuper & couvrir toute la place de l'axe de rotation. Le mouvement rapide de l'eau divise bientôt cette huile en une infinité de petites bulles, qui, cédant à la force axifuge du fluide qui les emporte, viennent se ranger autour de l'axe. C'est ordinairement en cylindre, quelquefois en conoïde, en fuseau, & assez souvent sous une forme de bobine ou de cylindroïde évasé à ses extrémités ; mais ce n'est jamais en forme de noyau sphérique, ni en rien qui approche d'une sphère. Ces expériences ont été faites en présence de l'Académie, & devant des Commissaires nommés par elle, & que Mr. l'Abbé Nollet avoit eu la délicatesse de demander.

Enfin il a voulu faire l'expérience du globe

14 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

tournant en même tems sur deux axes qui se coupent à angles droits, & le succès en a été très différent de celui qu'en attendoit Mr. Bulffinger.

Tout cela est exposé en détail & fort clairement dans le Mémoire de Mr. l'Abbé Nollet.

Cependant nous devons avertir que Mr. l'Abbé de Molières étoit bien éloigné de se rendre à toutes ces preuves expérimentales contre les Tourbillons. Il prétendoit toujours qu'elles tourneroient en leur faveur étant mieux approfondies, & dégagées des circonstances étrangères qui en changent l'effet à nos yeux ; mais sa mort arrivée l'année suivante 1742, avant l'impression de ces Mémoires, a terminé la dispute.

* Pag. II. * **N**OUS renvoyons entierement aux Mémoires.
in 4.

(a) Les Observations Météorologiques de Mr. Maraldi, pour la présente année 1741.


(b) Les Observations Botanico-Météorologiques de Mr. du Hamel pour l'année 1740.

(c) Les Observations sur l'étendue & la hauteur de l'Inondation du mois de Décembre 1740, avec un Plan de la ville de Paris, relatif à cette inondation ; par Mr. Buache.

(a) Voyez les Mémoires, p. 662.

(b) P. 203.

(c) P. 449.



DIVERSES OBSERVATIONS
DE PHYSIQUE
ET D'HISTOIRE NATURELLE.

I.

*Sur le rapport des différens degrés de fluidité
des Liquides.*

LES qualités sensibles des corps ne sont pas seulement difficiles à connoître en elles-mêmes & dans ce qu'elles ont de mécanique, indépendamment de nos sens, elles sont encore un sujet de recherche très difficile par rapport à leurs intensités, ou à l'évaluation de leur quantité & de leur force plus ou moins grande. C'est ainsi que la quantité ou l'intensité du Son & de la Lumière, ont fait de tout tems des problèmes de Physique aussi curieux que mal-aisés à résoudre. La dureté & la mollesse, la solidité & la fluidité, qualités convertibles, comme la grandeur & la petitesse, & presque toujours relatives à la résistance que nous éprouvons en voulant diviser les corps, ne sont ni plus faciles à déterminer, ni moins dignes de la curiosité du Physicien. Elles semblent même avoir un rapport plus immédiat à nos besoins que les autres, par les lumières que leur mesure exacte * peut fournir sur le différent degré d'acti-

* Pag. 124

in 4.

d'activité de diverses substances employées dans la Médecine.

C'est dans ce point de vue que Mr. le Monnier Médecin, fils & frère d'Académicien dans cette Compagnie, & digne émule de ses parens, a cherché une méthode pour déterminer les différens degrés de fluidité des Liqueurs, & qu'il a présenté à l'Académie le Mémoire dont nous allons rendre compte.

Mr. le Monnier définit le Fluide, un corps dont les parties sont si peu liées entre elles, qu'elles cèdent à la moindre force qui tend à les désunir, & se mettent aussitôt en mouvement au milieu les unes des autres. Il avertit cependant que cette définition ne doit pas être prise à la rigueur, puisque l'expérience nous apprend, que quelque peu de liaison qu'il y ait entre les parties d'un fluide, il leur en reste toujours assez pour se faire appercevoir, & pour apporter une résistance sensible à leur séparation.

Le défaut d'adhérence ou de ténacité entre les parties d'un fluide faisant le caractère essentiel de la fluidité, & le fluide parfait ne pouvant être que celui où l'adhérence & la ténacité seroient nulles, on voit clairement qu'une liqueur sera d'autant plus fluide, que l'adhérence entre ses parties sera plus petite.

Mr. le Monnier s'abstient sagement d'entrer dans la discussion épineuse de ce qui produit cette adhérence de parties, soit pression de la part d'un fluide ambiant plus subtil, soit attraction quelconque; il ne s'agit ici que d'en déterminer la quantité. Ce sera la mesure qu'on cherche.

Newton

Newton s'est servi d'un Pendule, qu'il a fait osciller dans différens fluides, pour déterminer la résistance de différens milieux au mouvement des corps qu'on y a plongés, & il a conclu de ses expériences, que les milieux, ou ce qui est ici la même chose, les fluides, résistent à peu-près en raison de leur densité. Il trouve, par exemple, que selon sa règle la résistance de l'eau est à celle de l'air à peu-près en raison de 850 à 1; mais il a senti que cette règle n'avoit pas lieu * à l'égard des milieux ténaces, qu'il avoue résister plus que d'autres de même densité. Ainsi, ajoute-t-il, l'huile froide résiste plus que l'huile chaude, celle-ci plus que l'eau commune, & l'eau commune plus que l'esprit de Vin. Il laisse donc entrevoir ici une manière de déterminer les degrés de ténacité des liqueurs, puisque dans celles qui sont également denses ou de même pesanteur spécifique, les résistances du pendule seroient proportionnelles à leur ténacité. Le même Philosophe donne ailleurs une méthode plus positive pour découvrir la résistance qui résulte de la ténacité des parties d'un fluide, savoir, en y faisant tomber d'une même hauteur des corps spécifiquement plus pesans les uns que les autres, & en comparant les tems effectifs de leurs chutes à ceux que donneroit la théorie dégagée de cette circonstance.

Mr. le Monnier convient de l'excellence de ces méthodes pour découvrir la résistance des milieux; mais il les juge peu praticables pour estimer les différens degrés de ténacité entre les parties intégrantes des liqueurs. Elles

* Pag.
13. in 4.

les en exigent , selon lui , une trop grande quantité , & qui doit être au moins de 5 à 6 pieds cubiques.

Voici la méthode qu'il leur substitue , & qui peut faire connoître le degré de fluidité que l'on cherche , dans telle quantité de liqueur qu'on voudra.

Il a pris une bouteille sphérique de verre d'environ 4 pouces de diamètre : il y a fait foudrer vis-à-vis du centre deux petits tuyaux de verre d'environ trois lignes de diamètre , & qui communiquent avec le dedans de la bouteille. Il a fait rétrécir à la lampe des E-mailleurs l'orifice extérieur d'un de ces tuyaux , jusqu'à ce que son ouverture fût tout au plus d'un 12 de ligne , l'autre tuyau demeurant tout-à-fait ouvert , pour laisser une entrée libre à l'air , sans quoi la liqueur , qu'on devoit mettre aussi par-là dans la bouteille , n'auroit pu couler par le petit orifice. Il a rempli successivement cette bouteille de différentes liqueurs , & l'ayant située perpendiculairement à l'horizon , par rapport à l'axe indiqué par les deux tuyaux , l'orifice rétréci se trouvant en embas , * il a observé avec un Pendule à secondes , en combien de tems toute la liqueur s'écouloit par cet orifice.

Chaque goutte de la liqueur qui sort de la bouteille s'écoule en vertu de sa pesanteur spécifique & du poids de toute la masse du fluide supérieur qui la presse , l'axe ou les deux tuyaux étant situés verticalement. Donc si les parties intégrantes des liqueurs étoient absolument dénuées de ténacité ou d'adhérence entre elles , les tems de l'écoulement entier des

quan-

* Pag.
14. in 4.

quantités égales feroient réciproquement proportionnels aux pesanteurs ou gravités spécifiques. Mais en même tems que la gravité spécifique de la liqueur entraîne ses gouttes en embas, la ténacité de ses parties les retient unies à la masse qui lui est contigue, & aux bords du verre, dont elle tend à se détacher, jusqu'à ce qu'enfin la goutte ainsi suspendue, soit devenue assez grosse pour que sa pesanteur l'emporte sur son adhérence, & la détache entièrement de l'orifice qui la retenoit. Où il est aisé de remarquer que les gouttes qui font partie des liqueurs plus ténaces, sont toujours plus grosses avant leur chute, que celles des liqueurs plus fluides. La goutte restera donc plus ou moins longtems suspendue à l'orifice du tuyau rétréci, selon que la ténacité de la liqueur dont elle fait partie, & dont elle doit se séparer, sera plus ou moins grande.

Donc dans les liqueurs de même gravité spécifique, les tems de l'écoulement seront en même raison que leurs ténacités, & dans celles de gravité spécifique & de ténacité différentes, ces tems seront en raison composée, inverse des gravités, & directe des ténacités. D'où l'on voit que les ténacités sont directement comme les produits des tems de l'écoulement, par les pesanteurs spécifiques, & enfin les degrés de fluidité réciproquement comme ces produits.

D'après cette méthode & les expériences faites en conséquence, Mr. le Monnier a dressé un Table où sont exprimés les rapports de

20 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

de différentes liqueurs les plus connues , & qui est partagée en 5 colonnes.

* Pag. 25. in 4. La première de ces colonnes contient les noms des * liqueurs considérées dans leur différent état de condensation & de raréfaction ; la seconde indique le degré de chaleur correspondant de ces liqueurs , tel qu'il a été pris sur le Thermomètre à Mercure de Mr. Delisle, & réduit à la graduation du Thermomètre de Mr. de Réaumur ; & la troisième marque le tems de l'écoulement. On voit dans la quatrième la pesanteur spécifique & actuelle de chaque liqueur , comme elle se trouve au moment de l'expérience ; l'eau d'Arcueil supposée d'un poids quelconque exprimé par 1000 , en est le terme de comparaison. La cinquième colonne donne enfin le rapport des fluidités, dont l'eau d'Arcueil est encore la commune mesure.

Il paroît par cette Table que la fluidité du vin de Bourgogne, par exemple , est un peu moins grande que celle de l'eau , & ne va qu'à environ $99\frac{1}{2}$; celle de l'huile d'Olive n'est que de $45\frac{22}{2000}$; celle de l'huile de Noix,

de $122\frac{8}{1000}$; de l'huile de Lin de $149\frac{6}{1000}$, &c.

L'esprit de Vin & l'huile de Térébenthine, qui par leur grande facilité à s'évaporer, semblent être si fluides , n'ont pas cependant des fluidités bien différentes de l'eau commune, celle de l'un n'étant que d'environ 1098, & celle de l'autre de 1009 ; encore ces liqueurs, quand elles ont été mises en expérience,

rience , étoient-elles un peu moins froides que l'eau. Enfin, les liqueurs minérales, telles que le Mercure & l'huile de Vitriol, qu'on ne sauroit appeller ni aqueuses ni huileuses ; ont des degrés de fluidité bien au dessous de celui de l'eau & de l'huile, le Mercure ne donnant que 134 degrés de fluidité par rapport à l'eau, que nous supposons en avoir 1000, & l'huile de Vitriol ne passant guère 60 de ces mêmes degrés.

Nous ne toucherons que succinctement quelques objections qu'on pourroit faire contre la Méthode de Mr. le Monnier, & qu'il s'est faites lui-même pour la plupart.

Le tuyau inférieur d'où la liqueur découle par un très-petit orifice, tombe dans le cas des tuyaux capillaires. Or * on sait que l'adhésion des liqueurs au verre, ou leur ascension dans les tuyaux capillaires de verre, diffère quelquefois considérablement en différentes liqueurs, & apparemment aussi dans la même liqueur, soit par la température actuelle où elle est, soit par celle de l'air qui l'environne. D'où il suit, qu'il restera toujours dans le tuyau inférieur une certaine quantité plus ou moins grande de liqueur, qui se refusera à l'entier écoulement. Mais il est clair qu'il n'y a qu'à tenir compte de ce reste, par rapport à la masse totale, ou mieux encore, qu'à prendre la fin de l'écoulement à l'endroit du tuyau, où l'on aura éprouvé auparavant que la liqueur dont il s'agit, dans l'état donné, se soutient par la simple adhésion. Et l'on prévient même une partie de cet inconvénient en faisant toujours l'expérience à peu près

* Pag.
16. in 4.

près dans la même température d'air. La température que Mr. le Monnier a choisie par préférence, est celle de 2 degrés au dessus de la congélation.

Quant aux changemens que la froideur ou la chaleur des liqueurs pourroit causer à la capacité de la bouteille qui les contient, par le rétrécissement, ou par la dilatation du verre, ils ne sauroient apporter ici d'erreur sensible, pourvu qu'on ne remplisse pas entièrement la bouteille, & que la quantité de liqueur qu'on y met ne soit réglée que par le poids, comme l'a pratiqué Mr. le Monnier. Mais l'élargissement, ou le rétrécissement que la même cause doit produire en pareils cas, sur le petit trou du tube inférieur par où la liqueur découle, nous paroît de plus grande conséquence, & nous ne voyons pas par quelle voie on pourroit y remédier. Nous remarquerons seulement que cet inconvénient n'a lieu qu'à l'égard de la même liqueur dans ses différens états, & n'influe point sur la plupart des résultats de la Table, où les liqueurs sont considérées à un même degré de chaleur.

La gravité spécifique & relative de chaque liqueur dans ses différens états, entre nécessairement, comme nous l'avons vu, dans le produit qui constitue le degré de fluidité des liqueurs. Aussi Mr. le Monnier a-t-il pris grand soin de la *bien déterminer. Il s'est servi pour cela de la balance hydrostatique décrite dans plusieurs Auteurs modernes, & à laquelle il a ajusté, au lieu du poids de verre solide qu'on a coutume de suspendre à l'un de ses bras, une bulle de verre fort min-

*Pag. 17.
in 4.

mince, & presque pleine de mercure. Il a trouvé que la diminution de poids de cette bulle ainsi chargée étoit dans l'eau bouillante, de 128 grains, & dans l'eau froide approchant de la congélation, de 133 grains; d'où il a calculé, conformément au terme de comparaison qu'il a choisi pour toutes les autres liqueurs, que la gravité spécifique de l'eau à ce degré de froideur, étoit à celle de l'eau bouillante, comme 1000 est à 962. Mr. Halley avoit conclu d'une semblable expérience qu'il fit en 1693, que c'étoit comme 1000 à 963 : différence presque insensible d'avec le résultat de Mr. le Monnier, & qui prouve l'extrême attention qu'il a donnée à cette partie de sa recherche.

Du reste Mr. le Monnier ne donne tout ceci que pour un premier essai, qui ne lui laisse pas ignorer combien la matière qui en fait l'objet, exigeroit encore d'expériences, tant sur le même plan que sous de nouveaux points de vue, pour être portée au degré de certitude que l'on pourroit y désirer.

I I.

Sur l'Evaporation de l'Eau.

Il est assez surprenant que la terre imbibée d'eau, & qui fait en tout une masse plus solide & plus pesante qu'un pareil volume d'eau pure, fournisse une Evaporation plus prompte que l'eau. C'est cependant ce qui résulte de l'expérience qu'on va voir, & qui est due à Mr. Bazin déjà connu dans le monde savant par d'excellentes

* Pag.
18. in 4

tes observations de Physique & d'Histoire Naturelle. Cette expérience nous a été communiquée par Mr. de Réaumur, à qui Mr. Bazin en a fait part dans une Lettre qu'il lui a écrite de Strasbourg. Le fait est d'autant plus digne de remarque, qu'il contredit une observation de Mr. Hales, l'un de plus habiles observateurs de l'Europe ; car on trouve en propres termes dans la *Statique * des végétaux* de cet Auteur, que *l'évaporation de la surface de l'eau, est à l'évaporation de la surface de la terre, comme 10 est à 3*, ce qui fait plus du triple.

Mr. Bazin avoit depuis 2 ans & demi une terrine vernissée presque pleine de terre à potier, qu'il arrosoit constamment tous les jours d'une certaine mesure d'eau, & qui cependant n'en étoit pas plus imbibée que le premier jour, quoiqu'il lui parût que la quantité d'eau qu'il y mettoit chaque jour, fût plus grande que celle qui pouvoit s'en évaporer en 24 heures. Surpris de ce phénomène il voulut s'en assurer plus parfaitement. Il mit à côté de la terrine un vase de la même grandeur, & il y versa pendant six mois de suite la même quantité d'eau qu'il versoit dans le vase où étoit la terre. Il remarqua que ce vase où il n'y avoit que de l'eau, se trouvoit rempli, & avoit besoin d'être vuïdé plusieurs fois, tandis que celui où étoit la terre demouroit toujours dans le même état ; preuve certaine que l'évaporation étoit plus prompte & plus abondante dans celui-ci. Mr. Bazin fit encore deux fois la même expérience, & y employa

employa même d'autres moyens , & elle eut le même succès.

Nous présumons, quoiqu'il ne l'ait pas énoncé dans sa Lettre, qu'il n'aura pas manqué de mettre toujours les deux vaisseaux à couvert de la pluie, & sur-tout de la rosée, puisque selon le même Mr. Hales, dont il combattoit le sentiment, la rosée tombe en plus grande quantité & du double sur une surface d'eau, que sur une pareille surface de terre humide, ce qui rendroit l'expériencequivoque.

Si ce que nous venons de dire arrivoit sur une terre qui n'eût pas été imbibée d'eau depuis longtems, on pourroit croire que la chaleur de la fermentation seroit capable d'y produire cette prompte évaporation de l'eau; mais qu'une terre arrosée chaque jour & pendant deux ans & demi, ait constamment produit cet effet, c'est ce qu'il est difficile d'attribuer à la fermentation.

Il seroit à désirer cependant pour plus de sûreté, qu'on eût toujours tenu dans chacune des deux vaisseaux un Thermomètre* de sem-
 *Pag. 19.
 ble graduation; car enfin il est rare que in 4.
 deux différentes substances renfermées dans le même lieu aient le même degré de chaleur, il est certain que, toutes choses d'ailleurs égales, une chaleur différente change considérablement l'évaporation de l'eau. Il paroît par les expériences que Mr. Halley fit sur ce sujet, pendant tout le cours de l'année 1693, & qui sont rapportées dans les Transactions Philosophiques, que la différence va
 Hist. 1741. B quel-

quelquefois à plus du quadruple , de l'Hiver à l'Eté de Londres.

On trouve à la fin du Volume de nos Mémoires de 1709, un Mémoire de Mr. Gautheron Médecin de Montpellier & Secrétaire de la Société Royale des Sciences de cette ville, dans lequel il conclut de diverses expériences qu'il avoit faites la même année, que l'évaporation de certains liquides (& l'eau est de ce nombre) est plus grande pendant une forte gelée; que lorsque l'air est dans un état moyen entre le grand froid & le grand chaud. Nous fîmes aussi quelques expériences en 1716, en travaillant sur la formation de la glace, qui nous persuadèrent que l'eau glacée, & à surfaces égales en apparence, s'évaporoit quelquefois plus promptement que dans son état de liquidité; mais nous remarquâmes en même tems, que dans un vaisseau de même diamètre la surface de l'eau glacée n'est jamais réellement égale à celle de l'eau tranquille & dans son état de liquidité, tant à cause des rides & des inégalités dont la superficie de la glace est presque toujours remplie, que parce que la glace en se détachant des parois intérieures du vase où elle est contenue, & en montant au-dessus de son premier niveau, sans quoi elle feroit crever ce vase, présente de plus en plus de nouvelles surfaces à l'air qui l'environne, & se trouve exposée par-là à une plus grande évaporation.

Peut-être y auroit-il quelque chose de pareil à observer sur la terre imbibée d'eau, & dont la surface n'est qu'un tissu de rugosités & de petits grains; mais qu'oiqu'il en soit,

nous

nous ne savons pas qu'on ait rien donné jusqu'ici de si positif & de si concluant sur ce sujet, que les expériences de Mr. Bazin.

* I I I.

* Pag.
20. in 4,

Trombe observée sur le Lac de Genève.

Mr. Jallabert Professeur de Physique expérimentale à Genève, l'un des plus savans & des plus utiles Correspondans de l'Académie, nous a communiqué une observation dont on lui a fait part, sur une espèce de météore qu'on a vu sur le Lac de Genève.

Ce Phénomène qui étoit nouveau pour le pays, fut apperçu à 7 heures du matin sur ce Lac, & à une portée de mousquet de ses bords, dans le mois d'Octobre de cette année. C'étoit une colonne dont la partie supérieure aboutissoit à un nuage assez noir, & dont la partie inférieure qui étoit plus étroite, se terminoit un peu au-dessus de l'eau. Il avoit plu & fait beaucoup de vent la veille; mais le vent avoit cessé sur le matin, & le Ciel demouroit seulement chargé de quelques nuages. Ce météore fut observé pendant deux ou trois minutes, après quoi il se dissipa; mais on apperçut aussitôt une vapeur épaisse qui montoit de l'endroit sur lequel il avoit paru, & là même les eaux du Lac bouillonnaient & sembloient faire effort pour s'élever. On voit ordinairement quelque chose de pareil après les Trombes de Mer, ou pendant qu'elles paroissent. Aussi Mr. Jallabert juge-t-il que celle du Lac de Genève n'étoit pas d'une

nature différente ; mais il ajoute une circonstance singulière, & qu'il tient d'un Observateur digne de foi, qui n'étoit qu'à quelques 300 pas de la colonne, c'est que le tems étoit alors fort calme, & que lorsqu'elle se dissipa, il ne s'ensuivit ni vent ni pluie. Avec tout ce que nous savons déjà sur les Trombes marines, ne seroit-ce pas une preuve de plus, qu'elles ne se forment point par le seul conflit des vents, & qu'elles sont presque toujours produites par quelque éruption de vapeurs souterraines, ou même de volcans, dont on fait d'ailleurs que le fond de la mer n'est pas exempt ? Les tourbillons d'air & les ouragans qu'on croit communément être * la cause de ces sortes de Phénomènes, pourroient donc bien n'en être que l'effet ou une suite accidentelle.

* Pag. 21.
in. 4.

On a remarqué sur ce même Lac un Flux & Reflux, appelé dans le pays, *Sèches* ou *Laidce*, & que Mr. Jallabert croit être un des plus réguliers qu'on y observe. Dans de certains tems, & sur-tout en Été, les eaux de ce Lac croissent de 9, 10, 12 pouces & plus, dans l'espace de quelques minutes ; elles décroissent aussi rapidement, & ces crues se succèdent plus d'une fois en moins d'une heure. Comme ce Flux périodique n'avoit été observé jusqu'à présent qu'à Genève, ou tout au plus deux lieues au-delà, & qu'on ne croyoit pas qu'il s'étendît plus loin, on en a attribué la cause aux vents qui retardent quelquefois le cours du Rhône, ou à la grande quantité d'eaux qui se jettent par cet endroit dans ce fleuve, & qui pourroient refluer vers le Lac.

Mais

Mais plus Mr. Jallabert a examiné le fait, plus il s'est convaincu que ce n'en est point-là la véritable cause. Il travaille actuellement à l'approfondir, & il fera part à l'Académie de ce qu'il aura trouvé sur ce sujet.

D'habiles Géographes & des personnes du pays assurent que l'on sent quelquefois sur le Lac de Genève des vents souterrains qui en soulèvent les eaux. Si cette circonstance n'entre point dans la production des Flux & Reflux réglés dont nous venons de parler, elle indique du moins sous le bassin de ce Lac, quelques matières bitumineuses & inflammables, qui pourroient bien y avoir produit, conformément à notre idée, la Trombe décrite ci-dessus.

Nous ne hazardons nos conjectures que pour faire naître de nouvelles observations.

I V.

Enfant beaucoup plus grand que ne comporte son âge.

On amena à l'Académie en 1736 (a) un Enfant de 7 ans, de la Paroisse de Fresnay-le-Buffard près de Falaise en Normandie, qui avoit 4 pieds 8 pouces 4 lignes de hauteur, * étant sans fouliers. En 1739 (b), il avoit * Pag. 22. cru seulement de 3 pouces 2 lignes, & il ne^{in 4.} se trouve avoir cette année 1741, & à l'âge de 12 ans, qu'environ 1 ponce de plus, & en

(a) Voyez l'Histoire, p. 75.

(b) Voyez l'Histoire, p. 3.

30 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

en tout 5 pieds & $\frac{1}{2}$ ponce. Ce qui est bien éloigné de cet accroissement rapide qu'il avoit pris dès les premières années après sa naissance; car il n'avoit rien d'extraordinaire en venant au monde. Mr. Geoffroy qui s'en est informé, & de qui nous tenons ces particularités, croit que le jeune Païsan pourroit bien avoir abusé de son tempérament prématuré.

V.

Rouille singulière.

On a donné le nom de *Verdet* ou *Verd de gris* à la rouille du Cuivre & du Laiton. Ce n'est point une corruption, mais une simple dissolution de parties, puisqu'on retrouve dans le verdet toutes les parties du Cuivre. La manière ordinaire de se procurer du verd de gris, est de mettre le Cuivre dans du marc de raisin. C'est ainsi qu'on le pratique en Languedoc, en Provence & en Italie, où le marc de raisin a beaucoup de force pour pénétrer ce métal, & pour l'empreindre de son sel. Un peu d'eau & la seule humidité de l'air suffisent quelquefois pour faire paroître la rouille du Cuivre ou le verd de gris, mais en petite quantité.

Avec ces notions on auroit de la peine à se persuader que le voisinage du vernis eût pu produire sur plusieurs pièces de Cuivre un verd de gris presque aussi abondant que si elles avoient été mises dans le marc de raisin: voici le fait.

Un mouvement de pendule qui avoit été
achevé

chevé le 8. Juillet 1736, fut enfermé tout de suite dans une boîte de bois vernie en dehors & en dedans d'un vernis à l'imitation de celui de la Chine, & posée en même tems sur un serre-papiers & sur un bureau vernissé de même. En Mai 1738 la Pendule cessa d'aller, & l'on trouva ses roues, ses platines & toutes les pièces de Cuivre ou de Laiton qui la composoient, couvertes de verd de gris. Elle fut envoyée à * l'Horloger qui l'avoit faite, & qui la nétoya, la repolit & en travailla de nouveau le mouvement; mais en Juillet 1740 la Pendule s'arrêta encore, & les mêmes pièces se retrouvèrent couvertes de verdet. L'Horloger que l'on vouloit rendre responsable de cet accident, fit remarquer que depuis la première époque où la rouille avoit fait arrêter le mouvement, jusqu'à la seconde, il y avoit quatre mois de plus que depuis le jour où la Pendule fut livrée, jusqu'à la première. D'où il conclut que le vernis étoit l'unique cause de cette rouille, & que l'impression en avoit été d'autant plus prompte, qu'il avoit été plus récemment appliqué & moins sec. Il assure d'ailleurs que le métal de cette Pendule est le même absolument que celui qu'on a coutume d'employer dans l'Horlogerie.

L'Académie consultée sur ce sujet a jugé provisionnellement que l'Horloger ne devoit pas être responsable de cet accident. Mais il faut qu'il y ait ici quelque circonstance extraordinaire, ou dans le vernis, ou dans le métal, ou dans les deux à la fois; car on a vu d'autres Pendules ainsi renfermées dans du bois

32 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

vernissé, & auxquelles il n'est rien arrivé de pareil. La chambre où étoit le bureau, & le mur contre lequel il étoit appuyé, y entreront peut-être encore pour quelque chose. Il faudroit souvent des recherches sans fin pour expliquer les moindres phénomènes.

VI.

Histoire Naturelle de la France Equinoctiale.

Quelques Voyageurs ont nommé *France Equinoctiale*, ce que les François possèdent autour de la Rivière & de l'Ile de Cayenne en Amérique, à environ 5 degrés de latitude Nord, país célèbre par les observations Astronomiques de Mr. Richer en 1672, & sur-tout par celle de l'accourcissement du Pendule à secondes, d'où la question de la Figure de la Terre prit naissance.*

* Pag. 24. in 4.
C'est de cette Ile & des environs sur les côtes de la Mer, * & dans le continent de la Guiane, que Mr. Barrère Docteur & Professeur Royal en Médecine en l'Université de Perpignan, Correspondant de l'Académie, publie aujourd'hui l'*Histoire Naturelle*, sous le titre d'*Essai sur l'Histoire Naturelle de la France Equinoctiale*, après en avoir obtenu l'approbation de la Compagnie. C'est un dénombrement des Plantes, des Animaux & des Minéraux qui se trouvent dans le país, avec leurs noms différens, Latins, François & Indiens, & quelques observations sur leurs usages dans la Médecine & dans les Arts. Mr. Barrère fut à Cayenne en 1722 par ordre du Roi,

Roi, & avec les instructions de l'Académie, & il y demeura trois ans, pendant lesquels il fit toutes ces recherches curieuses. Il les rapporta en Europe en bon ordre, & avec des desseins fort bien exécutés, qu'il fit voir à l'Académie d'abord après son retour. Ce qu'il donne aujourd'hui n'est cependant que le plan ou l'abrégé d'un plus grand Ouvrage qu'il prépare sur ce sujet.

Nous n'entrerons point dans le détail d'une matière si vaste & si abondante. Nous remarquerons seulement d'après Mr. Barrère, qu'on trouve presque par-tout dans les montagnes de Cayenne, & bien avant dans la terre ferme d'alentour vers le Sud, des Mines de Fer, qui se montrent même sur la superficie du terrain. C'est cependant une opinion reçue, que le nouveau Monde n'a point de Fer. Comment les Américains ont-ils ignoré un trésor que la Nature leur offroit avec si peu de mystère? Ce n'est pas qu'ils n'ayent bien senti combien ce métal étoit préférable à leurs Mines d'Or & d'Argent, & qu'ils ne se soient montrés à cet égard très sages & très habiles, avec les premiers Européens qui portèrent du Fer chez eux; mais c'est qu'apparemment, & comme nous l'avons remarqué dans une autre occasion, le Fer qui se découvre si manifestement à des yeux Physiciens qui le connoissent déjà, est infiniment difficile à imaginer & à découvrir sous les apparences qui nous le cachent, & que la manière de le préparer & de s'en procurer les usages, suppose dans les Peuples qui le possèdent, une ancienneté

Pag. 25. * d'origine , ou une longue suite de connoissances que les Américains n'avoient pas.
in 4.

VII.

Dents de Lamie.

Mr. Geoffroy nous a fait part d'une Lettre qu'on lui a écrite de Marseille, en lui envoyant quatre dents d'une Lamie qui a été prise aux Iles Sainte-Marguerite. La Lamie est un grand Poisson ou Chien de mer , qu'on croit être le *Carcharias* des Anciens , & qu'on voit quelquefois sur les côtes de Languedoc & de Provence , d'Italie & d'Espagne. Les prétendues dents de Serpent qu'on trouve montées en argent chez les Orfèvres, ne sont autre chose que des dents de Lamie ; car entre autres vertus qu'on leur attribue , quelques Naturalistes se sont figurés, je ne sais sur quel fondement, qu'étant pendues au cou des enfans, elles leur faisoient grand bien quand les dents leur sortoient , & , ce qui est encore plus merveilleux, qu'elles les garantissoient de la peur. Ces dents sont très dures & très aiguës, de forme triangulaire, tranchantes & découpées des deux côtés, comme une scie ; il y en a six rangs à chaque mâchoire, celles du premier rang se montrent hors de la gueule du Poisson , & tendent vers le devant ; celles du second sont droites , & celles des autres rangs sont courbées en dedans. La Lamie prise aux Iles Sainte-Marguerite se trouva embarrassée dans la *Thounine* , ou filet à prendre le Thon ; elle pesoit près de cent
quin-

quintaux , & l'on fut obligé de la remorquer avec une Felouque jusqu'à Cannes , qui est à environ deux lieues delà. C'est apparemment une des plus grandes qu'on connoisse , puisque Rondelet, dans son Histoire des Poissons, en parlant de la grandeur ordinaire des Lamies, dit en avoir vu une qui pesoit dix quintaux. On l'éventra , & on lui trouva un Cheval encore tout entier dans l'estomac. C'est ce dont l'Auteur de la Lettre , qui étoit alors sur les lieux , dit avoir été témoin oculaire. On en fit beaucoup d'huile , & l'on en auroit mangé la chair qui * est réputée saine & de bon goût , sans ce Cheval mort qu'on avoit trouvé dans le corps , & qui en dégoûta les habitans de Cannes. Cependant cette chair fut vendue à des Etrangers qui n'en savoient rien.

* Pag.
26. in 4.

VIII.

Cachalot échoué près de Baïonne.

Voici encore un Poisson cétacée , & d'une toute autre grandeur que le précédent. C'est une sorte de Baleine appelée communément *Cachalot* , du nombre de celles qui ont des dents & des naseaux ou évents , par où elles rejettent une partie de l'eau qui est entrée dans leur gueule ; car la plupart des Baleines n'ont point de dents , & plusieurs manquent de ces naseaux , quoiqu'elles aient toutes des poumons & plusieurs autres parties semblables à celles des quadrupèdes terrestres , ce qui les distingue de presque tous les autres

36 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

Poissons. De longs fanons ou barbes qui pendent de leur mâchoire supérieure, leur tiennent lieu de dents, & se terminent en une espèce de frange assez semblable aux soies de Sanglier; c'est la matière qu'on appelle proprement *baleine*, & qui sert à divers ouvrages de l'art.

Le Cachalot dont il s'agit ici, vint échouer auprès de la barre de Baïonne dans la rivière de l'Adour, le 1 Avril de cette année. Nous en allons donner la description avec quelques autres détails, d'après les Mémoires & le dessein que Mr. de la Peyronie nous a remis sur ce sujet, & qui lui ont été envoyés à diverses reprises, par Mr. Despelette Chirurgien major de l'Hopital militaire de Baïonne.

Ce dessein montre le Poisson de profil, & posé horizontalement selon sa longueur, & le Cachalot qu'il représente & qu'on dit être un des plus grands qu'on ait vus sur ces côtes, a en ce sens 49 pieds de longueur, depuis l'extrémité de sa queue jusqu'au bout de son museau, sur environ 12 pieds $\frac{1}{2}$ de largeur ou de hauteur; son pourtour qu'on a mesuré à l'endroit le plus large, qui se trouve à peu-près vis-à-vis * de l'œil, est de 27 pieds. Il a sur le dos vers les deux tiers de sa longueur, à prendre depuis la tête, une petite éminence qu'on appelle *taquet*, d'environ un pied de hauteur; sa tête est fort grande & fort large vers le museau, dont le bout est applati en avant comme un muse de Taureau; elle partage presque toute la longueur du corps en deux parties égales. La figure extérieure de l'œil ressemble assez à celle de l'œil humain, il

il n'est que de 9 pouces de longueur sur quatre de largeur. Le milieu des trous de ses naseaux ou évents est à environ 2 pieds de la partie supérieure du museau, & ces trous paroissent avoir au moins un pied de diamètre: c'est par où ces Poissons soufflent l'eau, ce qui les a aussi fait nommer *Souffleurs*. La longueur de sa gueule est de 9 pieds. Il a 18 dents de chaque côté de la mâchoire inférieure seulement, n'y ayant à la supérieure que des trous placés vis-à-vis, & où ces dents peuvent se loger. A 14 pieds de distance du bout de sa queue est l'anus, d'environ un pied d'ouverture en longueur, & de 5 à 6 pouces de large. En suivant ainsi le dessous du ventre, & 6 pieds au delà vers la tête, se trouve une ouverture un peu plus grande, d'où sort le *Balenas* ou membre génital de ce Poisson; car les Baleines ont encore cela de commun avec les quadrupèdes terrestres, qu'elles s'accouplent & engendrent de même. Ce membre est d'abord à sa sortie de près d'un pied de diamètre, & long seulement de 18 pouces, d'une substance charnue & musculeuse; mais il se termine par une verge droite & pointue, d'environ 4 pieds de longueur sur 6 à 7 pouces de diamètre vers son milieu, de la même substance à peu-près que les fanons, & qu'on emploie aux mêmes usages. Les nageoires de la queue ont 13 pieds d'ouverture; celles qui sont à 10 pieds en deçà de l'œil, un peu au dessous, n'en ont que 4 de longueur & 2 de largeur; ainsi c'est principalement la queue de ce Poisson, comme on le fait

d'ailleurs, qui lui sert à se mouvoir & à se conduire dans l'eau.

* Pag. 28. in 4. Ce Cachalot a fourni une prodigieuse quantité de *Sperma ceti*, d'une beauté admirable. Le *Sperma ceti* n'est autre chose * que la cervelle de l'animal préparée sous la forme de cette drogue. On a rempli dix barriques de la cervelle & du cervelet de celui-ci, quantité que la préparation réduit ordinairement à la moitié ou au tiers. On lui trouva dans l'estomac une grosse boule, du poids d'environ 7 livres, qui fut prise pour de l'Ambre gris; c'étoit une substance assez molle, & d'un rouge clair lorsqu'on la retira du corps de l'animal; elle avoit une odeur désagréable & approchant de celle du Poisson corrompu; mais en s'obstinant à la sentir, cette odeur paroissoit bientôt surmontée par une autre qui approchoit de celle de l'Ambre gris. Un Marchand qui prétend s'y connoître, a acheté la boule entière 650 livres, ne doutant point que dans peu d'années, & en se desséchant, elle ne perdît sa couleur rouge & toute sa mauvaise odeur, pour prendre entièrement la couleur & l'odeur de l'Ambre gris, ce qu'il assure avoir déjà éprouvé plusieurs fois; & il est vrai que depuis quelques mois seulement que cette substance a été tirée du corps du Poisson, elle a pris une couleur plus brune, & une odeur fort semblable à celle de l'Ambre gris.

Mr. de la Peyronie a fait voir à la Compagnie, des échantillons du *Sperma ceti* préparé, qu'on a tiré de la cervelle de ce Cachalot, & qui a paru fort beau, & aussi de ce
vrai.

vrai ou prétendu Ambre gris dont nous venons de parler. Mr. de la Peyronie est cependant bien éloigné de croire que l'Ambre gris prenne son origine dans le corps de ce Poisson ; il pense au contraire que si l'on en trouve quelquefois dans l'estomac de ces animaux, c'est parce qu'ils l'ont avalé ; car voraces comme ils sont, que n'avalent-ils pas ?

Le reste du corps du Cachalot de Baïonne n'étoit presque que du lard ou une graisse, dont on a fait beaucoup d'huile.

IX.

Crapaud mâle Accoucheur de la femelle.

Il seroit à souhaiter pour quelques Lecteurs, que ce que nous avons à dire dans cet article, pût regarder les Colombes * & les Tourterelles ; plutôt qu'une espèce d'animaux qu'on ne voit ou qu'on n'imagine ordinairement qu'avec horreur. Mais l'imagination & les yeux du Physicien ne sont pas si délicats, ils sont accoutumés à voir la Nature agir bien différemment de ce que nos goûts & nos préjugés voudroient lui prescrire, & partager souvent avec distinction les animaux les plus vils en apparence, & les plus hideux.

Les Crapauds sont un genre particulier dans la classe des amphibies, & quoique amphibies, ils se divisent en aquatiques & terrestres ; parce que ces derniers qu'on divise encore en grande & petite espèce, quoique nés dans l'eau, n'y passent que les premiers jours de leur vie. C'est du Crapaud terrestre de

* Pag.
29. in 4.

de la petite espèce dont nous avons à parler, d'après le Mémoire que Mr. Demours Médecin est venu lire à la Compagnie sur ce sujet.

L'occasion de ce Mémoire est un de ces heureux hasards dont les Naturalistes seuls peuvent connoître le prix. Sur le soir d'un grand jour d'Été, Mr. Demours étant dans le Jardin du Roi, aperçut deux de ces Crapauds accouplés au bord d'un trou que formoit en partie une grande pierre qui étoit au-dessus. La curiosité le fit approcher pour voir quelle étoit la cause des mouvemens qu'ils se donnoient. Deux faits également nouveaux le surprirent; le premier étoit l'extrême difficulté qu'avoit la femelle à pondre ses œufs, de manière que sans un secours étranger elle ne paroïssoit pas pouvoir les faire sortir de son corps; le second, que le mâle travailloit de toute sa force, & avec les pattes de derrière, à lui arracher ses œufs.

Pour bien comprendre la mécanique de cet accouchement, il faut savoir, 1. Que les pattes de ces animaux, tant celles de devant que celles de derrière, sont divisées en plusieurs doigts. C'est par le moyen de ces doigts que le mâle tiroit les œufs du fondement de la femelle.

2. Que les œufs sortent du fondement de la femelle, parce que le réceptacle dans lequel ils sont contenus jusqu'au tems de la ponte, s'ouvre à la partie inférieure du *rectum*.

*Pag. 30.
in 4. 3. Que les Crapauds s'accouplent comme les Grenouilles, c'est-à-dire, que le mâle monté sur le dos de la femelle, l'embrasse avec ses

ses pattes de devant : la seule différence qu'il y a , est que le mâle des Grenouilles a les pattes de devant assez longues pour embrasser entierement la femelle , & pour entrelasser ses propres doigts au-dessous les uns avec les autres ; au-lieu que les pattes du Crapaud mâle étant beaucoup plus courtes , il ne peut les joindre de même ; elles n'atteignent qu'aux côtés de la poitrine de la femelle , où il les applique quelquefois si fortement , qu'il y survient une inflammation avant que les deux animaux se séparent.

4. Enfin , que les œufs de cette espèce de Crapauds sont renfermés chacun dans une coque membraneuse très ferme , dans laquelle est contenu l'embryon , & que ces œufs qui sont oblongs , & qui peuvent avoir deux lignes de longueur , sont attachés les uns aux autres par un court filet très fort ; ils forment une espèce de chapelet , dont les grains sont distans les uns des autres d'environ la moitié de leur longueur.

Ces conformations étant bien entendues , il y a lieu de croire que la femelle fait beaucoup d'effort pour se procurer la sortie du premier œuf ; mais dès qu'il est sorti , c'est au mâle à faire le reste. C'est alors qu'il commence à exercer sa fonction d'Accoucheur , & il s'en acquitte avec une adresse qu'on ne soupçonneroit pas dans un animal qui paroît si engourdi. Celui-ci avoit déjà tiré le second œuf , lorsque Mr. Demours arrêta sur lui ses regards , & il redoubloit ses efforts pour tirer le troisième. Le premier œuf étoit engagé entre les deux doigts du milieu de
sa

42. HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

sa patte droite de derrière , par le filet qui l'attachoit au second , & c'est en allongeant cette patte qu'il tendoit le cordon du chapelet vis-à-vis le fondement de la femelle, qui pendant ce tems-là restoit immobile. Il tâchoit aussi de se saisir du cordon avec la patte gauche , & il en vint à bout après plusieurs tentatives. Cependant la présence de l'observateur ne l'embarassoit pas peu , & lui causoit sans doute bien des distractions ; car tantôt il s'arrêtoit tout court , & alors il jettoit sur ce curieux importun * des regards fixes qui marquoient son inquiétude & sa crainte ; tantôt il reprenoit son travail avec plus de précipitation qu'auparavant , & un moment après il paroissoit indécis , s'il devoit continuer ou non. La femelle marquoit aussi son embarras , par des mouvemens qui interrompoient quelquefois le mâle dans son opération. Mais enfin , soit que le silence & l'immobilité du spectateur eussent dissipé leur crainte , soit que le cas fût pressant , le mâle reprit son ouvrage avec la même vigueur , & toujours avec de nouveaux succès.

La curiosité de Mr. Demours avoit encore un autre objet ; il observoit attentivement si , à mesure que le mâle tiroit les œufs , il ne les arrosoit pas de sa liqueur séminale ; car c'est par un semblable arrosement , comme le rapportent plusieurs Auteurs , que les œufs de ces animaux aquatiques & amphibies sont fécondés , & en particulier les œufs des Grenouilles. C'est ainsi , selon Swammerdam , l'un des plus fameux Naturalistes de ce siècle , qu'après un accouplement d'environ 40 jours , la Gre-

* Pag.
31. in 4.

Grenouille mâle féconde les œufs de la femelle au moment qu'elle les a pondus. Mais comme Mr. Demours n'appercevoit rien de pareil aux deux Crapauds accouplés, & que l'endroit où ils se trouvoient étoit un peu sombre, il se détermina à les mettre sur sa main. L'ouvrage fut encore interrompu pendant quelques instans, & repris ensuite comme auparavant ; mais le mâle ne donna jamais le moindre signe de ce que l'observateur s'attendoit à découvrir par ses yeux, ou à sentir sur sa main où il les tint un quart d'heure.

Swammerdam avoit remarqué que le mâle de la Grenouille aide aussi à la ponte de la femelle ; mais il paroît que c'est d'une manière moins suivie, moins parfaite, moins décidée que le Crapaud, & telle enfin qu'on ne voit pas clairement que ce secours y soit absolument nécessaire. Ce n'est peut-être qu'en lui serrant les côtés dans ce moment ; car la femelle de la Grenouille accouche fort vite de tous ses œufs, &, comme dit le même Naturaliste, *uno impetu omnia ejaculatur* (a).

* C'est dommage que quelques Naturalistes * Pag. 323
qui ont pris extrêmement à cœur de nous per-^{in 4.}
suader que c'est aux Animaux que nous devons originairement nos Arts mécaniques & libéraux, ainsi que nos Sciences les plus sublimes, la Géométrie, la Dialectique, la Métaphysique même, & sur-tout la Médecine, n'ayent point eu connoissance du fait que nous venons de rapporter, ils en auroient tiré sans doute, & très directement, l'art des Matrones & des Accoucheurs.

(a) Swamm. Tom. II. p. 809.

X.

Insectes qui se multiplient sans accouplement, & par la seule fécondité de chaque individu.

Il y a des accouplemens d'Insectes qui ne peuvent être apperçus ; quoique très réels, parce qu'ils commencent & qu'ils s'accomplissent en des lieux cachés & impénétrables à nos regards. Il y en a d'autres qu'on ignore & qu'on n'a point vus, faute d'avoir appris à les voir, & de connoître les tems & les circonstances où ils pourroient être observés. Mais quelque difficulté qu'il y ait à découvrir la manière dont certains Insectes s'accouplent, & quelque diversité qu'il règne dans leurs accouplemens, tous les Naturalistes modernes sembloient s'être réunis à regarder le concours des individus pour la propagation de chaque espèce, comme une condition indispensable, & comme une de ces loix générales qu'on n'avoit point encore vu enfreindre à la Nature. Si quelques espèces d'Animaux avoient paru devoir s'y soustraire, c'étoient celles des Hermaphrodites ; mais il a été remarqué dès les premières années de cette Histoire (a), que les Insectes hermaphrodites les plus connus, tels que les Limaçons & les Vers de terre, n'étoient pas moins soumis à cette loi, quoiqu'avec des modifications & des variétés particulières.

Voici

(a) Voyez l'Histoire de 1699, p. 50, & suiv. de 1708, p. 58, & suiv. de 1724, p. 49.

Voici cependant une exception à la loi générale, & une exception qui pourra vraisemblablement être suivie de * plusieurs autres. * Pag. 33.
 Mr. de Réaumur donna il y a quelques années ^{in 4.} l'Histoire d'une espèce d'Insecte fort commun à la campagne & dans nos jardins, appelé *Puceron*; petit animal vivipare qui s'attache aux bourgeons, aux fleurs & aux jets des Plantes, souvent ailé, & quelquefois sans ailes. Mr. de Réaumur soupçonna dès-lors sur plusieurs indices qui auroient suffi à un observateur moins habile & moins exercé à douter, que les Pucerons accouchoient sans avoir eu d'accouplement ni aucune sorte de commerce entre eux, ou avec quelque autre Insecte quelconque de grandeur sensible. Il tenta les moyens de s'en assurer; mais divers accidens ayant fait périr les Pucerons tenus en solitude, avant qu'ils fussent parvenus à l'âge où ils mettent des petits au jour, il en écrivit à plusieurs de ses correspondans pour l'Histoire Naturelle, en les exhortant à répéter cette expérience avec toutes les précautions qu'elle demandoit. Mr. Bonnet de Genève s'acquitta le premier de cette commission délicate, & vérifia le fait par mille observations qui n'exigeoient pas moins de patience que de sagacité; & enfin Mr. de Réaumur s'en est pleinement convaincu lui-même sur des Pucerons de la fleur de Pavot. Il ne nous a encore rien communiqué là-dessus que verbalement, mais il nous en promet le détail dans un de ses Volumes sur les Insectes.

Nous allons voir une fécondité encore plus singulière.

X I.

*Animaux coupés & partagés en plusieurs parties,
& qui se reproduisent tout entiers dans
chacune.*

* Pag.
34. in 4.

L'Histoire du Phoenix qui renaît de ses cendres, toute fabuleuse qu'elle est, n'offre rien de plus merveilleux que la découverte dont nous allons parler. Les idées chimériques de la Palingénésie ou régénération des Plantes & des Animaux, que quelques Alchymistes ont cru possible par l'assemblage & la réunion de leurs parties essentielles, ne tendoient qu'à rétablir une Plante ou un Animal après sa destruction; le Serpent coupé en deux, & qu'on a dit se rejoindre, ne donnoit qu'un seul & même Serpent; mais voici la Nature qui va plus loin que nos chimères. De chaque morceau d'un même animal coupé en 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40 parties, & pour ainsi dire, haché, il renaît autant d'animaux complets & semblables au premier. Chacun de ceux-ci est prêt à subir la même division, & à renaître de même dans ses débris, & ainsi de suite, sans qu'on sache encore où s'arrêtera cette étonnante multiplication. On voit par-là, qu'à la tête séparée du reste de son corps, doit revenir un corps semblable à celui qu'elle a perdu; que la queue recouvrera de même un corps & une tête, & que les tronçons intermédiaires vont s'accroître de part & d'autre par l'addition de nouvelles parties, & se terminer enfin par une queue & une tête toutes

tes semblables à celles qu'on leur avoit enlevées, & qui appartiendront désormais à d'autres individus. Si l'animal est coupé en deux, par exemple, selon la longueur, de manière que les deux moitiés n'étant pas encore entièrement séparées, demeurent unies par une extrémité de son corps, vers la queue ou vers la tête, il en vient un Monstre à deux têtes ou à deux queues. Et tout cela quelquefois en vingt-quatre heures, ou en un petit nombre de jours.

Cette découverte est due à Mr. Trembley qui fait actuellement sa résidence à la Haye en Hollande, & c'est par Mr. de Réaumur, à qui Mr. Trembley en avoit écrit, que l'Académie en a été informée. L'expérience ne fut faite d'abord que sur une petite espèce d'Insecte ou Ver, de deux ou trois lignes de longueur, qu'on trouve ordinairement dans l'eau où croit la lentille de marais. Mr. de Réaumur l'appelle *Polype*, parce qu'il se termine par une des extrémités de son corps en plusieurs pieds ou bras, & *Polype d'eau douce*, pour le distinguer des Polypes marins. Comme les mouvemens de cet animal sont fort lents, M. Trembley douta si c'étoit un vrai animal ou une plante: ce doute accompagné de toutes les lumières d'un savant Naturaliste & de * détails très curieux, fit le sujet de sa ^{*Pag. 35;} première Lettre, & ce n'a été qu'après avoir su ^{in 4:} l'avis de l'Académie, & avoir réitéré bien des fois les mêmes expériences, qu'il s'est enfin rendu à cette espèce de prodige. Cependant Mrs. Bonnet & Lyonnet, autres observateurs habiles, & correspondans de Mr. de Réaumur,

48 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

mur, l'un à Genève, l'autre à la Haye, tentèrent la même expérience sur d'autres espèces de Vers aquatiques, parmi lesquels ils en trouvèrent plusieurs qui avoient la même propriété. Ils purent aussi s'en convaincre plus facilement, & d'une manière plus sensible, sur des Vers assez longs, & qui avoient encore cet avantage, qu'on ne pouvoit douter que ce ne fussent de vrais animaux, leurs mouvemens étant très vifs. Mr. Lyonnet en découvrit une espèce d'environ 3 pouces $\frac{1}{2}$ de longueur, & de la grosseur à peu-près d'une chanterelle de violon, & c'est sur cette espèce qu'il poussa la division jusqu'à 30 ou 40 parties.

On peut juger que Mr. de Réaumur n'étoit pas demeuré oisif sur les progrès d'une découverte si digne d'exciter sa curiosité, & qui tenoit en quelque sorte à son domaine: c'est lui qui en a rendu l'Académie témoin oculaire, & avec l'Académie, la Cour & la Ville, qui dans le siècle éclairé où nous vivons, diffèrent peu des Savans à cet égard.

Nous laisserons au Lecteur à tirer les conséquences, & à suivre les réflexions & les nouvelles vues qu'un tel phénomène est capable de faire naître sur la génération des Animaux, sur leur ressemblance extrême avec les Plantes, & peut-être sur des matières encore plus élevées.

XII.

Cire blanche de la Chine.

Mr. Geoffroy a reçu une Lettre du P. d'Incar-

carville, Jésuite, écrite de Canton le 15 Janvier de cette année, dans laquelle ce Père lui marque que la Cire blanche de la Chine vient de petits Vers que l'on trouve sur un arbre dans une Province de cet Empire. Ils se nourrissent sur cet arbre ; * on les y ramasse, on les fait bouillir dans de l'eau, & ils rendent une espèce de graisse qui, étant figée, est la Cire blanche de la Chine. Cette Lettre contient quelques autres particularités d'Histoire Naturelle, sur lesquelles Mr. Geoffroy espère recevoir une plus ample instruction.

* Pag.
36. in 4.

XIII.

Ruisseau inflammable.

Feu Mr. Raoul Conseiller au Parlement de Bourdeaux apprit à Mr. de Réaumur, par une Lettre du mois de Juillet de l'année dernière, qu'il y avoit dans le Prieuré de Trémolac de l'ordre de Clugny, à 5 lieues de Bergerac, un ruisseau inflammable & brulant ; ce qui fut découvert il y a 4 ans par un voleur d'Ecrevisses, qui, pour mieux appercevoir les trous où elles se cachent, se servoit de torches de paille allumées. Tant que cet homme marcha sur le gravier du lit presque horizontal de ce ruisseau, le feu ne prit point à l'eau de la superficie ; mais étant arrivé à des endroits plus inégaux & parsemés de creux, il fut bien étonné de voir que l'eau s'enflamma, au point qu'il en eut sa chemise brûlée. C'étoit une flamme bleuâtre. Mr. l'Abbé d'Alême alors Prieur de Trémolac en fit répéter l'ex-

Hist. 1741.

C

pé-

périence deux ou trois fois , & elle réussit toujours de même. On peut croire avec beaucoup de vraisemblance qu'il est tombé & qu'il s'est assemblé dans ces endroits creux , quelque limon chargé d'une matière sulfureuse , assez en mouvement pour s'exhaler au travers & au dessus de l'eau , & pour y prendre feu à la moindre approche d'une flamme étrangère.

Il s'en faut bien que la fameuse fontaine brulante de Dauphiné mérite ce nom à aussi juste titre que le ruisseau de Trémolac , puisqu'elle se réduit , du moins aujourd'hui & depuis fort longtems , à un simple terrein bitumineux sans eau , où l'on voit quelquefois une flamme errante & légère , fort semblable à celle de l'eau-de-vie allumée (a).

*XIV.

* Pag.
37. in 4.

Fontaine sans fond , de Sablé.

Mr. le Marquis de Torcy nous a communiqué une relation en forme de Lettre , qui lui a été adressée pour l'Académie , sur une Fontaine curieuse qui est auprès de Sablé en Anjou , & qu'on appelle *la Fontaine sans fond* , parce qu'en effet ceux qui l'ont fondée n'y ont point trouvé de fond , & que , selon la tradition du pays , plusieurs bestiaux qui y sont tombés n'ont jamais été retrouvés. C'est une espèce de gouffre de 20 à 25 pieds d'ouverture , situé au milieu & dans la partie la plus basse d'une Lande de 8 à 9 lieues de circuit , dont les bords

(a) Voyez l'Histoire de l'Académie 1699 , page 28.

bords élevés en entonnoir descendent par une pente insensible jusqu'à ce gouffre, qui en est comme la citerne. La terre tremble ordinairement tout autour, sous les pieds des hommes & des animaux qui marchent dans ce bassin. Il y a de tems en tems des débordemens qui n'arrivent pas toujours après les grandes pluies, & pendant lesquels il sort de la fontaine une quantité prodigieuse de poisson, & sur-tout beaucoup de brochets truités, d'une espèce fort singulière, & qu'on ne connoit point dans le reste du païs. Il n'est pas facile cependant d'y pêcher, parce que cette terre tremblante & qui s'affaisse au bord du gouffre, & quelquefois assez loin aux environs, en rend l'approche fort dangereuse. Il faut attendre pour cela des années sèches, & où les pluies n'ayent pas ramolli d'avance le terrain inondé. En général il y a lieu de croire que tout ce terrain est comme la voûte d'un Lac qui est au dessous. L'Académie qui porte par préférence son attention sur les curiosités naturelles du Royaume, mais qui veut en même tems que ce soient de vraies curiosités, a jugé que celle-ci méritoit une plus ample instruction. Elle avoit chargé Mr. de Brémond parent de Mr. l'Abbé Auvé, de qui nous vient la relation, de s'informer plus particulièrement de certains faits * & de quelques circonstances, qui pourront plus sûrement faire juger de la singularité de cette fontaine : mais une longue maladie, & la mort de Mr. de Brémond arrivée dans l'intervalle de cette recherche & de l'impression de cette Histoire, ayant arrêté les vastes & utiles projets de cet

* Pag. 38.
in 4.

Académicien, nous n'avons pas voulu priver le public de ce que nous savions déjà sur la Fontaine de Sablé, ni manquer l'occasion de donner à Mr. l'Abbé Auvé cette petite marque de notre reconnoissance.



* ANATOMIE.

* Pag.
39. in 4.

SUR LE SIEGE DE L'AME DANS LE CERVEAU (a).

DE quelque manière que l'on conçoive ce qui pense en nous, il est certain que les fonctions en sont dépendantes de l'organisation & de l'état actuel de notre corps pendant que nous vivons. Cette dépendance mutuelle du Corps & de ce qui pense dans l'Homme, est ce qu'on appelle *l'Union du Corps & de l'Ame*: union que la saine Philosophie & la révélation nous apprennent être uniquement l'effet de la volonté libre du Créateur. Du moins n'avons-nous nulle idée immédiate de dépendance, d'union, ni de rapport entre ces deux choses, corps & pensée. Cette union est donc un fait que nous ne pouvons révoquer en doute, mais dont les détails nous sont absolument inconnus : c'est à la seule expérience à nous les apprendre, & à décider sur
tou-

(a) Voyez les Mémoires, page 271.

river le
la Fon-
de don-
marque

3.

E.

AME

ivre ce
que les
ganisa-
endant
tuelle
omme,
& de
la ré-
ment
Du
te de
e ces
union
évo-
font
xpé-
r sur
tou-

toutes les questions qu'on peut proposer sur cette matière. Une de ces questions des plus curieuses, des plus intéressantes & la seule dont il s'agit ici, est de savoir si l'Ame exerce également ses fonctions dans toutes les parties du corps auquel elle est unie, ou s'il n'y en a pas quelqu'une à qui ce privilège soit particulièrement attaché, & quelle est cette partie, de manière que ses blessures ou sa destruction emportant nécessairement la cessation ou l'interruption des fonctions spirituelles, tandis que toutes les autres parties peuvent être altérées ou détruites, sans que le Sujet cesse de raisonner & de sentir. Nous disons & de sentir, parce que tout ce qui s'appelle sensation, voir, entendre, &c. n'appartient pas moins à l'Ame que la faculté de recevoir des idées, de les comparer & de raisonner; quoique, selon le * langage ordi- * Pag. 40.
naire, ce ne soit presque jamais qu'à ces der- in 4.
nières qu'on accorde le nom de pensée. Les sensations n'expriment, il est vrai, que des manières de penser très confuses; ou des modifications purement passives du Sujet pensant, tandis que les pensées proprement dites semblent en être l'action; mais ces modifications sont réellement aussi incompatibles avec l'idée du corps, que les spéculations métaphysiques les plus subtiles & les plus profondes. S'il y a donc quelque partie dans le corps humain d'où partent nos pensées & nos sensations, ou plutôt à laquelle toutes les affections corporelles & tous les mouvemens unis par institution à nos pensées & à nos sensations aillent aboutir, comme à une espèce de foyer ou de commun

organe, c'est cette partie que nous appelons *le siège de l'Ame*.

La première idée qui s'est présentée aux Philosophes sur ce sujet, a été sans doute, que l'Ame ne pouvant être par sa nature plus en un lieu qu'en un autre, & à la rigueur n'occupant aucun lieu, il falloit en vertu de son union intime avec le corps, l'imaginer comme répandue dans toutes ses parties, toutes étant capables de sentiment. Et s'il y avoit quelque préférence à donner à une portion de notre corps plutôt qu'à l'autre, pour en faire l'organe immédiat des opérations de l'Ame, il semble que ce devoit être au genre nerveux, puisque les nerfs sont la source & les instrumens du mouvement & du sentiment, & qu'ils se distribuent par tout le corps, depuis leur origine dans le cerveau jusqu'aux extrémités les plus reculées. Mais c'est un fait connu & que mille exemples ne permettent pas de révoquer en doute, que les nerfs d'une partie du corps, telle qu'un bras ou une jambe, peuvent être coupés, & la partie absolument retranchée, sans que l'on cesse d'y éprouver ou d'y rapporter les mêmes sensations, les mêmes douleurs, que si elle subsistoit encore. Il faut donc nécessairement reconnoître qu'il y a dans le corps humain quelque lieu privilégié, où l'Ame exerce ses fonctions, & où les corps qui viennent frapper celui qu'elle anime, vont aussi l'affecter, & pour ainsi dire, la frapper elle-même.

* Pag. 41. in 4. * La question du siège de l'Ame, réduite à ses véritables termes, n'est donc pas l'objet d'une recherche vaine, mais elle est très difficile

facile à résoudre. Nous ne nous arrêterons point aux opinions de ceux qui ont placé ce siège hors du Cerveau, dans le Cœur, par exemple, dans l'Estomac, & même dans la masse du sang; trop de faits en attestent la fausseté. Le Cerveau seul est aujourd'hui & depuis longtems en possession de fournir matière aux conjectures des Philosophes & des Anatomistes sur ce sujet; mais parmi tant de parties qui composent le Cerveau, laquelle choisirons-nous pour donner le mouvement aux autres, & pour en faire le siège des fonctions de l'Ame? Descartes s'est déterminé en faveur de la Glande pinéale, Willis Anatomiste Anglois, célèbre sur-tout par son Traité du Cerveau, l'a mis dans les Corps cannelés, & il n'y a pas de partie dans ce viscère à laquelle quelque Auteur n'ait attribué la même prérogative. Quelqu'un a donc nommé ou rencontré la partie du Cerveau qui est véritablement le siège de l'Ame; mais rencontrer ainsi la vérité & sans preuves suffisantes, c'est deviner & non pas découvrir.

Mr. de la Peyronie qui s'est appliqué il y a longtems à cette recherche, & qui en avoit donné une ébauche à la Société Royale de Montpellier dès l'année 1709, l'a présentée cette année-ci à l'Académie des Sciences, avec plus d'ordre & d'étendue, & l'a appuïée d'un si grand nombre de preuves & d'observations tant anciennes que nouvelles, qu'on peut regarder son Mémoire sur ce sujet, comme un nouvel ouvrage.

Après avoir bien établi l'état de cette question délicate, & avoir pris les précautions

56 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

qu'elle pouvoit exiger , il place le siège de l'Ame dans le *Corps calleux*, ce petit corps blanc un peu ferme & oblong, qui est comme détaché de la masse du Cerveau , & que l'on découvre quand on éloigne les deux hémisphères l'un de l'autre, leurs faces internes étant contigues & simplement couchées sur lui par leurs bords inférieurs.

* Pag.
42. in 4.

* Ce n'est ni sur l'inspection de la partie, ni sur sa structure particulière, qu'il lui accorde cette noble fonction, le Corps calleux n'ayant rien par lui-même de plus analogue avec la pensée & le sentiment que toute autre partie du Cerveau & qu'une matière quelconque, mais d'après les faits, par voie d'exclusion, & en montrant que les blessures ni la destruction entière d'aucune des autres parties de ce viscère n'influent point sur les opérations de l'Ame, tandis que celle que nous en avons nommé *le siège*, ne sauroit être affectée le moins du monde, sans que ces opérations ne soient troublées, ou qu'elles ne cessent totalement. L'on voit assez que cette méthode & cette espèce de démonstration indirecte étoit la seule qu'il convenoit d'employer en semblable matière.

L'exclusion ayant été donnée à tout ce qui n'est pas le Cerveau, on a dû chercher d'abord si c'est dans toute son étendue que le Cerveau constitue le siège de l'Ame; mais pour se convaincre du contraire, il ne faut que se rappeler une infinité d'exemples de Cerveaux altérés, pourris, gangrénés dans presque toute leur substance, sans que la raison & le sentiment en aient souffert, ces mêmes fonctions s'exé-

s'exécutant encore dans tous ces cas avec la même force, la même promptitude & la même vivacité que dans l'état de santé. La déperdition même d'une grande partie de la substance du Cerveau, comme on l'a vu après certaines blessures ou après certaines opérations Chirurgiques, n'a pas empêché les malades de raisonner, de sentir & de vivre comme auparavant. Mr. de la Peyronie a ouvert plusieurs de ces Cerveaux altérés ou défectueux, dont les Sujets n'avoient cependant éprouvé aucune des suites fâcheuses qu'il sembloit qu'on en devoit attendre. L'Ame ne réside donc pas dans toute l'étendue du Cerveau.

Venons-en au détail, & commençons par la Glande pinéale. Descartes qui avoit beaucoup observé en Anatomie, qui avoit fait une attention toute particulière à la nature & au mécanisme de nos sensations, & qui a été aussi le premier des Philosophes qui nous en ait donné une notion exacte, * qui ait ramené les qualités sensibles des corps à leur véritable princi-
 43. in 4. * Pag.

pe, avoit jugé cette glande plus propre qu'aucune autre partie, à être l'organe des fonctions de l'Ame. Elle est unique, & comme suspendue au milieu des ventricules du Cerveau par deux filamens nerveux & flexibles qui lui permettent de se mouvoir en tout sens, & par où elle reçoit toutes les impressions que le cours des esprits ou du fluide quelconque qui coule dans les nerfs, y peut apporter de tout le reste du corps; elle est entourée d'une infinité d'artérioles, tant du Lacis choroïde que des parois intérieures des ventricules, où elle

est renfermée, & dont les plus déliées tendent vers cette glande. C'est du moins par ces circonstances & par cette situation avantageuse, que Descartes, & après lui quelques Anatomistes, ont cru que la Glande pinéale étoit le véritable siège de l'Ame & l'organe commun de toutes nos sensations. Mais enfin on a découvert que la Glande pinéale manquoit dans certains Sujets, ou qu'elle y étoit entièrement oblitérée, sans qu'ils eussent perdu l'usage de la raison & des sens; elle a été trouvée pétrifiée dans quelques autres dont le sort n'avoit pas été différent, & Mr. de la Peyronie l'a vue pourrie dans une femme de 28 ans, qui avoit conservé la raison & le sentiment jusqu'à la fin de sa vie. Il remarqua aussi dans le même Sujet quelques autres parties du Cerveau, telles que les *Nates* & les *Tesses*, détruites par la pourriture; preuve que celles-ci ne sont pas non plus destinées à être le siège de l'Ame.

Nous en dirons autant des *Corps cannelés*, malgré leur structure singulière; les observations de feu Mr. Petit Médecin se réunissent avec celles de Mr. de la Peyronie, pour montrer que ces Corps ne sauroient être le centre de nos sensations ou le *Sensorium commune*, ainsi que l'appelle Willis, qui le plaçoit dans cette partie.

Les couches des nerfs optiques qui ne sont que des protubérances des nerfs qui servent à la vision, le Cervelet & toutes les autres parties intérieures de la tête, excepté le seul *Corps calleux*, passent en revue de la même manière, c'est-à-dire, * que Mr. de la Peyronie.

* Pag. 44
in 4.

apporte une foule d'exemples où l'on voit que les maladies les plus marquées & les plus dangereuses de ces parties n'ont point interrompu les fonctions de l'Ame, ni même quelquefois attaqué celles de la vie.

La conséquence après cela est aisée à tirer en faveur du Corps calleux, & elle est d'autant plus légitime, que par une suite contraire d'exemples aussi formels que les précédens, cette partie paroît être plus constamment liée avec l'exercice de la raison & des sens. Ce que Mr. de la Peyronie s'est attaché à prouver de la manière la plus solide.

Comme il y a longtems que l'esprit & la main travaillent chez lui de concert pour éclaircir cette fameuse question, & qu'il a été attentif à saisir tout ce qui pouvoit y conduire, il n'a manqué ni d'observations ni d'exemples. Il fait voir que dans tous les cas, soit de blessures accidentelles, soit de maladies internes, le Corps calleux ne sauroit être atteint, comprimé ou vicié par quelque cause que ce puisse être, sans que les étourdissemens, l'affaiblissement des membres, la léthargie, le délire & la cessation totale des fonctions de l'Ame ne s'ensuivent; & il y a tel de ces cas parmi ceux qu'il rapporte, où ces fonctions étoient alternativement & comme à volonté de la part du Chirurgien, suspendues ou rétablies, selon qu'avant ou après le pansement, le Corps calleux se trouvoit surchargé ou délivré de la matière étrangère qui s'amassoit & qui séjournoit sur un des côtés de sa surface. C'est Mr. de la Peyronie lui-même qui faisoit l'opération, & qui a vu ainsi

C 6


plu-

plusieurs fois la raison & le sentiment du malade s'éclipser & reparoitre.

Il conclut donc, & il est mal-aisé de ne le pas conclurre avec lui, d'après toutes les observations & tous les faits que nous venons d'indiquer, que le Corps calleux est véritablement cet organe primitif de la raison & des sensations, auquel tous les autres ne font, pour ainsi dire, que porter le résultat de ce qui se passe chez eux, & les impressions qu'ils ont reçues des objets, en un mot, le siège de l'Ame.

* Pag. 45.
in 4.

Cette théorie peut éclairer celle des maladies & des * dérangemens du Cerveau, & déterminer par conséquent les secours qu'on est en état d'y apporter. Tout est lié dans la Nature, & il seroit difficile d'y trouver quelque découverte à faire qui ne fût que curieuse, & qu'avec le tems de nouveaux points de vue, de nouveaux faits, ou quelque autre découverte ne pussent rendre utile.



SUR LA REUNION DES FRACTURES DES OS (†).

ON a vu dans l'Histoire de 1739 (‡), que les Os des Animaux, dans les alimens desquels on avoit mêlé de la racine de Garence, se coloroient en peu de tems d'un rouge plus ou moins vif, & quelquefois aussi
vif

(†) Voyez les Mémoires, pag. 130 & 303,

(‡) Page 34.

vif que du Carmin. Cette singularité, dont la première connoiffance eft due au hazard, ayant été obfervée par Mr. Belchier Chirurgien de Londres, & communiquée à l'Académie par Mr. Sloane Préfident de la Société Royale, Mr. du Hamel la jugea digne d'une plus ample recherche; il en repéta les expériences avec grand foin, & fur un grand nombre d'animaux de tout âge. Le réfultat de ces obfervations fut, 1. Que les Os des jeunes animaux fe coloroient beaucoup plutôt que ceux des vieux. 2. Que les progrès de la teinture des Os, & l'offification même, étoient d'autant plus prompts, que les animaux croiffoient plus vite & parvenoient en moins de tems à leur grandeur ordinaire. 3. Que quand on fupprimoit la Garence des alimens d'un animal dont les Os avoient aquis ainfi la couleur rouge, cette couleur difparoiffoit peu-à-peu, & que les Os redevenoient blancs. 4. Que ce rétabliffement des Os dans leur couleur naturelle, fe faifoit par la fuperpofition des couches blanches fur les couches rouges, à mefure que la couleur de celles-ci s'affoibliffoit, & difparoiffoit enfin entièrement.

Nous rappellons ces premières obfervations pour mieux faire fentir quelle a été leur fécondité entre les mains de * Mr. du Hamel. * Pag. 46. Elles l'ont conduit aux plus importantes dé- in 4. couvertes fur le développement & la formation des Os, fur la caufe & fur la guérifon de leurs maladies, & principalement fur la réunion de leurs Fractures, qui fait le fujet des deux Mémoires qu'on trouvera dans ce

Volume. C'est le commencement d'une théorie plus étendue qu'il prépare sur la même matière; mais d'une théorie toujours fondée sur de nombreuses expériences, & très applicable à la pratique. L'Anatomie, la Chirurgie & la Physique même, dans cette partie de l'Histoire Naturelle, ne peuvent qu'en retirer de grands avantages.

On avoit pensé jusqu'ici que la réunion des os fracturés se faisoit par l'effusion du suc osseux, qui, venant à couler dans les interstices de la fracture, en rejoignoit les bouts à peu-près comme la colle rejoint les parties d'un morceau de bois rompu: pensée si naturelle & si analogue à ce que l'art nous enseigne, qu'il n'est pas étonnant qu'on s'y fût arrêté. Mais Mr. du Hamel prouve par un nouvel enchainement d'observations & d'expériences, que c'est le Périoste seul qui réunit les os. Cette membrane se tuméfie d'abord & s'épaissit, elle devient ensuite cartilagineuse & enfin osseuse, ce qui forme le cal, ou cette espèce de virole qui entoure l'endroit rompu, & qui en assujettit les parties. C'est en suivant pas à pas cette ossification & cette réunion, que Mr. du Hamel s'est convaincu de la route que tenoit la Nature pour y arriver, route qui ne s'écarte pas du mécanisme qu'on peut remarquer dans la réunion des parties rompues des arbres & des plantes.

Quoique le Corps humain soit le sujet propre de l'Anatomie, on fait cependant de quelle utilité est la dissection des brutes, par la comparaison qu'on fait de leurs viscères avec ceux.

ceux de l'Homme. Cette comparaison étoit en usage dès le tems de Galien. Mais une autre espèce d'*Anatomie comparée*, celle des Végétaux, a été encore cultivée par les Modernes; & l'on peut voir à cette occasion dans l'Histoire de l'Académie (a), combien la génération & la structure de ces deux * espèces * Pag 47.
de corps vivans, les Plantes & les Animaux, in 4.
se ressemblent. Mr. du Hamel qui a beaucoup étudié l'une & l'autre, avoue que ce sont ses recherches sur la réunion des arbres rompus, qui l'ont conduit à l'utile & curieuse découverte qu'il nous donne aujourd'hui sur la formation du cal dans les fractures des os.

L'Ecorce des arbres est leur Périoste, leurs parties ligneuses sont leurs os. Or, comme Mr. du Hamel le fera voir plus particulièrement dans la suite, c'est par un allongement de l'écorce que la fracture ou la plaie de l'arbre est remplie, & non par l'allongement de ses fibres ligneuses, ou par l'effusion du suc nourricier qui suinte de leurs bouts rompus. L'écorce se tuméfie, s'épaissit sur la plaie, & elle y forme enfin un cal tout semblable à celui qui se fait sur les os par l'ossification du Périoste.

Quand ces sortes d'analogies se trouvent soutenues d'autant d'observations & de recherches réitérées que l'est celle-ci, elles deviennent de sûrs guides pour les Physiciens; car enfin la Nature n'est pas moins simple ni moins uniforme dans ses procédés, que variée dans ses ouvrages.

(a) Voyez l'Histoire de 1711, page 65.

SUR DE NOUVELLES ARTERES ET VEINES LYMPHATIQUES (†).

LEs découvertes qui nous intéressent le plus, sont celles qui fournissent des vues générales, ou qui tiennent de plus près aux principes fondamentaux des Sciences. Telles sont en Anatomie, celles qui ont rapport à la structure ou à l'usage de tous les organes du corps animé.

L'Anatomie ne connoissoit autrefois dans l'économie animale de fluide *universel* que le sang, mais la Physiologie ou la Physique du Corps humain en supposoit deux autres, l'un étoit l'esprit animal ou vital, l'autre une rosée ou lymphe nourricière qu'on croyoit renfermée dans les extrémités des vaisseaux qui doivent porter le sang du centre à la * circonférence. Des Médecins célèbres firent dans la suite une découverte à jamais mémorable dans l'Anatomie, ce fut celle des Vaisseaux lymphatiques & de la liqueur qu'ils contiennent. Ces vaisseaux sont de véritables veines qui reçoivent de toutes les parties du corps une liqueur limpide, & qui la versent par des troncs remarquables dans les réservoirs du chyle, dans le canal thorachique, &c.

La connoissance des Veines lymphatiques donna lieu d'imaginer aussi des Artères d'un genre

* Pag. 48.
in 4.

(†) Voyez les Mémoires, page 495.

genre nouveau, destinées à recevoir la sérosité ou la lymphe du sang, en laissant la partie rouge dans les vaisseaux sanguins. Mr. Boerhaave qui est celui qui a donné le plus de crédit à ce système, se crut en droit de supposer autant de différens genres d'artères qu'il y a de liqueurs dans le Corps humain ; mais cette opinion, quelque poids que pût lui donner un nom si fameux, n'a pas enlevé tous les suffrages ; l'Anatomie n'a reconnu constamment jusqu'ici, que les Artères qui portent le sang dans toutes les parties du corps. Et d'ailleurs, il n'étoit pas naturel de penser que si les Artères lymphatiques existoient, elles eussent échappé aux recherches de tant d'habiles Anatomistes, qui ont paru depuis qu'il en est question, & sur-tout dans un tems où l'usage du Microscope & des injections anatomiques est devenu si familier.

Les partisans des Artères lymphatiques répondoient qu'on n'avoit pu les observer à cause de leur extrême petitesse, & de plus, parce qu'il n'est pas facile de les distinguer d'avec les vaisseaux sanguins ; tous les petits vaisseaux, quelle que soit la liqueur qui les remplit, vus au Microscope, paroissant à peu-près de la même couleur & comme cristallins : mais ce n'est-là qu'une raison de possibilité & non d'existence.

On voit donc que l'idée des Artères lymphatiques n'a été jusqu'ici qu'une hypothèse dont on a pu se servir pour expliquer des faits connus, mais non pas pour développer ceux qui étoient cachés. Et un mot, l'Anatomie qui n'admet de véritables preuves que
le

* Pag.
49. in 4.

le témoignage des sens , n'avoit pas encore prononcé sur cet article ; mais les Sciences exactes * profitent quelquefois des conjectures les plus hasardées : il y a peu de découvertes importantes que l'imagination n'ait saisies ou effleurées d'avance , & la question dont il s'agit en fournit un exemple.

Mr. Ferrein a enfin découvert & constaté l'existence des Artères lymphatiques, & avec elles de nouvelles Veines lymphatiques qui les accompagnent. Il regardoit l'idée de ces artères comme une hypothèse qui n'avoit aucun fondement , lorsqu'il observa dans l'intérieur de la matrice une manière de velouté blanchâtre & extrêmement mince, qu'il examina en différens tems & en différens états. La comparaison qu'il fit de toutes ses observations lui donna lieu de juger que ce velouté n'étoit en effet qu'un tissu de vaisseaux lymphatiques artériels & veineux ; mais tout cela étoit encore fort éloigné d'une démonstration Anatomique. Il apperçut ensuite sur le haut de l'œil d'un Chien un appareil de vaisseaux qui le frappa ; c'étoit un nombre considérable de petits tuyaux ramifiés à la manière des artères & des veines, & pleins d'un fluide qui avoit toutes les apparences du lymphatique. Ils lui parurent très différens des Veines lymphatiques déjà connues, & il ne pouvoit guère les soupçonner d'être autre chose que les artères mêmes dont il s'agit. Il apperçut ces mêmes tuyaux dans une autre occasion ; mais il lui fut impossible de reconnoître leur origine, & d'éclaircir les difficultés qu'il avoit à ce sujet. Il revint donc à la matrice , & y fit

fit de nouvelles tentatives , qui lui dévoilèrent enfin le secret que la Nature sembloit cacher depuis si longtems. La finesse extrême de ces vaisseaux ne les empêcha pas de se montrer pour ce qu'ils étoient , & avec des ramifications tout-à-fait semblables à celles des artères ordinaires. Ce ne fut pas cependant sans beaucoup de peine que Mr. Ferrein vint à bout & de les bien voir & de s'affurer de leur véritable nature ; mais que ne surmonté-t-on point en des occasions si intéressantes , & où l'avancement d'une Science que l'on chérit , l'utilité publique & les mouvemens les plus légitimes de l'amour propre concourent à nous animer ?

* Il restoit à Mr. Ferrein de faire voir aux * Pag. 50.
autres ce qu'il s'étoit démontré à lui-même. ^{in 4.}
Il avoit pris garde que les objets à demi-transparens regardés avec une forte loupe , paroissent d'ordinaire plus distinctement sur un fond noir que sur des couleurs claires , & il se rappella que l'*Uvée* , cette tunique de l'œil qu'on a ainsi nommée , parce qu'elle ressemble à un grain de raisin noir , se trouvoit par-là très propre à faire paroître les vaisseaux diaphanes qui la tapissent. L'*Uvée* des enfans est préférable pour cela à celle des hommes faits , & l'*Uvée* des yeux bleus ou bleuâtres à celle des yeux noirs. Mr. Ferrein tira donc de l'orbite l'œil d'un Sujet âgé de six ans , mort depuis environ 24 heures ; il enleva la partie antérieure de la sclérotique ou la cornée , pour mettre la Choroïde & l'*Uvée* à découvert ; il regarda ces deux membranes de front , avec une lentille de 5 lignes de
foyer.

foyer. La Choroïde lui offrit une quantité extraordinaire de vaisseaux sanguins ; il n'en vit aucun dans l'Uvée, mais il y découvrit, & avec une espèce de ravissement, une multitude innombrable de vaisseaux blanchâtres & transparens, qu'il ne put douter qui ne fussent les nouvelles Artères lymphatiques tant désirées. C'est principalement sur cette partie qu'il en a démontré l'existence à l'Académie, leur origine, leur progrès & leurs ramifications, semblables à celles des artères sanguines, & disposées d'une manière qui n'est pas moins merveilleuse.

On trouvera dans son Mémoire un détail curieux & exact de tout ce qu'il faut observer pour appercevoir clairement ces tuyaux, aussi-bien que les nouvelles Veines lymphatiques, & une idée générale de la disposition naturelle des vaisseaux sanguins avec les lymphatiques, & les sécrétoires du corps. Il a touché en passant & par la liaison des matières, quelques autres points d'Anatomie qui peuvent passer pour autant de découvertes particulières. Tel est le nouvel *anneau de la Choroïde*, un réseau de vaisseaux sanguins dans cette membrane, &c.

* Pag. 51. in 4. On sent assez combien la connoissance certaine d'une * nouvelle espèce de tuyaux dans une Machine hydraulique, telle que le Corps animal, doit fournir de nouvelles vues, tant par rapport à son économie, qu'aux moyens de remédier à ses dérangemens.

SUR L'ORGANE IMMEDIAT DE LA VOIX

ET DE SES DIFFERENS TONS (†).

IL semble qu'on ait été un peu trop sévère à l'égard des Anciens, lorsqu'on les a repris d'avoir comparé l'organe de la Voix humaine à une Flute. Il n'est pas vraisemblable qu'ils aient entendu autre chose par là, sinon que cet organe étoit fait à peu près comme cet instrument, & que l'un & l'autre agissent ou donnent leurs tons par le moyen de l'air ou du vent qui passe par leurs cavités: & en effet, la trachée-artère est un tuyau par où passe l'air qui vient des poumons, & sa tête ou le Larynx qui la termine du côté de la gorge, & au milieu duquel est la petite ouverture ou fente qu'on nomme *la Glotte*, représente assez bien la tête & l'embouchure de la flute à bec. Il est vrai que dans la flute le vent qui produit le son, est poussé de l'embouchure vers l'autre extrémité du tuyau, & que c'est tout le contraire dans l'organe de la Voix; en quoi il n'est pas possible que les Anciens non plus que les Modernes aient jamais erré; mais il y a tout lieu de croire que les uns & les autres se sont trompés, quand ils ont cru que l'organe de la Voix n'étoit, à proprement parler,

(†) Voyez les Mémoires, page 545.

parler , qu'un instrument à vent , comme la flute , le flageolet ou le hautbois.

Mr. Ferrein se trouve là-dessus d'une opinion très différente , & , si l'on veut , très paradoxes , mais fondée en même tems sur des expériences dont il sera difficile d'éluder la conclusion. L'organe de la Voix est selon lui , un instrument à corde & à vent , & beaucoup plus à corde qu'à vent , l'air qui vient des poumons & qui passe par la Glotte , n'y faisant proprement que l'office d'un archet sur les fibres * tendineuses de ses lèvres , que Mr. Ferrein appelle *Cordes vocales* ou *Rubans* de la Glotte. C'est la collision violente de cet air & des Cordes vocales qui les oblige à frémir , & c'est par leurs vibrations plus ou moins promptes qu'elles rendent différens tons , selon les loix ordinaires des instrumens à cordes.

* Pag.
52. in 4.

Ces deux sortes d'instrumens de Musique , à corde & à vent , diffèrent entr'eux , en ce que dans les uns le son dépend & de leur construction & de la matière dont ils sont faits , tandis qu'il ne résulte dans les autres que de leur simple construction. Dans les premiers , tels que la viole , le claveffin , les cloches , la qualité de la matière influe sur la nature du son , parce que c'est des vibrations de cette matière , presque toujours sensibles à la vue ou au toucher , que dépendent le son & les différens tons qu'on en tire : au-lieu que les seconds ne sonnent ou ne rendent tel & tel son , qu'en conséquence de leurs dimensions , des ouvertures , des fentes & des biseaux qu'on y a ménagés , & par le moyen
des-

desquels les parties toniques de l'air sont différemment agitées & mises en contraction. Ainsi les métaux les plus mous comme les plus durs, l'ivoire, le bois, le carton même & la cire, y produisent à peu près les mêmes effets; & ce phénomène, quelque extraordinaire qu'il paroisse, se trouve constaté par l'expérience. C'est que le son que rendent la plupart des instrumens à vent, & sur-tout les flutes, n'est point dû aux vibrations totales & sensibles de la matière qui les compose. On peut éteindre ces vibrations à volonté, les interrompre & les arrêter entièrement par la pression, ou par quelque autre cause que ce soit, sans que le son de l'instrument change sensiblement de force ni de nature. Et s'il y a là-dessus quelques distinctions délicates, & quelque choix à faire pour la perfection de ces instrumens, c'est un détail de pratique dans lequel nous n'entrerons point ici. L'organe de la Voix de l'Homme & des Quadrupèdes, est au contraire, selon Mr. Ferrein, un instrument à corde, mais un instrument à corde que le vent fait agir en qualité d'archet.

* Mr. Dodart (†), qui est celui de tous les Modernes qui a le plus travaillé sur la Voix humaine, sur ses différens tons, & sur le mécanisme que la Nature y emploie, a admis, ou plutôt n'a pas exclu les frémissemens des parties insensibles des lèvres de la Glotte; mais il paroît par le résumé de tout ce

* Pag. 53. in 4.

(†) Voyez les Mémoires de l'Académie, années 1700, 1701, 1706, & 1707.

ce qu'il en a dit, & qui, selon Mr. Ferrein, diffère peu de ce qu'en avoit déjà dit Mr. Perrault, qu'il ne les a admises que comme accessoires, & non comme cause principale. Ce sont, selon Mr. Dodart, les différentes ouvertures dont la Glotte est susceptible, qui constituent cette cause, savoir, les grandes ouvertures pour les tons graves, & les petites pour les tons aigus. C'est ainsi du moins que Mr. de Fontenelle dans ses extraits, & les Auteurs qui sont venus depuis, & qui ont traité la même matière, l'ont entendu. Mais sans nous embarrasser davantage de ce qu'on a cru jusqu'ici, voyons ce qu'il convient de croire, & quelles sont les preuves que Mr. Ferrein apporte de son sentiment.

Comme il n'y a que deux Rubans ou Cordes vocales à la Glotte, & qu'elles y sont sensiblement de la même longueur, il est visible qu'elles ne sauroient suffire à donner cette multiplicité de tons hauts & bas dont la Voix humaine est capable, à moins qu'elles ne soient prolongées ou accourcies, ou, ce qui reviendra au même, plus ou moins tendues. Mais leur longueur ne peut changer que par voie de distension ou de contraction; donc toute la différence des tons en graves & aigus, sera due au plus ou moins de tension des fibres tendineuses de la Glotte, & l'air qui viendra à être poussé des poumons dans la trachée-artère, & à frôler contre les bords de la fente étroite qu'elles y forment, ne produira des tons plus ou moins aigus, qu'autant que ces fibres, ou ces cordes qu'il met en vibration,

bration, se trouveront plus ou moins tendues, & qu'elles feront par-là des vibrations plus ou moins promptes, indépendamment du plus ou du moins d'ouverture de la Glotte.

Voilà ce qui doit arriver, selon Mr. Ferrein; mais est-ce là ce qui arrive? Il n'y a pas assurément de meilleure manière * de le justifier & de réfuter le système de Mr. Doudart, que de mettre cet effet sous les yeux, en donnant, par exemple, différentes ouvertures à la Glotte avec une même tension des Rubans, ou au contraire différentes tensions avec la même ouverture, ou enfin une plus petite ouverture avec une moindre tension, & au contraire. Dans le premier de ces quatre cas, il faut que le ton demeure le même, quoique l'ouverture change; dans le second, ce doit être le contraire, il faut que le ton change, malgré une ouverture de Glotte constante; & dans le troisième ou le quatrième, il faut que le ton qu'on vient d'entendre avec une tension & une ouverture données, devienne plus aigu par une plus grande tension, malgré une plus grande ouverture, ou au contraire plus grave, malgré une tension & une ouverture plus petites. Or c'est ce que Mr. Ferrein a éprouvé de mille manières, tant sur l'homme que sur divers animaux, avant que de composer son Mémoire, & c'est aussi ce qu'il a fait voir à l'Académie assemblée, & à plusieurs de ses Membres en particulier.

Il prend une trachée-artère détachée du cadavre avec son Larynx, il souffle dans la trachée, tenant en même tems les Rubans de

Hist. 1741.

D

la

* Pag.
54. in 4.

la Glotte plus ou moins bandés , & l'on entend la Voix humaine ou animale hauffer & baiffer de ton , ou demeurer sur la tenue , dans toutes les circonstances que nous venons d'énoncer.

Ce qui est digne de remarque , & à quoi sans doute l'on ne se seroit pas attendu , en accordant même à Mr. Ferrein tout ce que suppose son système, c'est que les différentes Voix que donne cette expérience, changent peu de nature, & qu'elles sont encore très reconnoissables. Le mugissement d'un Taureau, le cri d'un Chien qui souffre, &c. s'y sont parfaitement distinguer. Cependant combien y manque-t-il de parties capables de modifier & de caractériser ces Voix ? Plus de palais, de dents, ni de lèvres; le Larynx même arraché de la gorge de l'animal, a été pour l'ordinaire très mutilé, on a retranché dans quelques-uns l'épiglotte, & tous les morceaux de cartilage qui environnent ou qui couvrent la Glotte, * & les Cordes vocales, pour mieux voir le jeu & les vibrations en effet visibles de ces cordes: & malgré tous ces retranchemens la Voix de chaque animal y conserve encore presque tout ce qui la distingue de celle des autres animaux.

• Pag.
55. in 4.

Enfin, Mr. Ferrein a fait voir que les Rubans tendineux qui bornent la Glotte à droite & à gauche, sonnent comme les Cordes sonores, & qu'ils ont les mêmes propriétés qu'elles. Il montre par ses expériences, comment les Cordes vocales peuvent rendre ensemble & séparément différens tons; comment on peut accorder, par exemple, l'octave aigue

gue de l'une, avec l'octave grave de l'autre; comment on peut partager ces cordes suivant leur longueur, & faire sonner leurs parties, leur moitiés, leurs tiers, &c.

Dans l'animal vivant ce sont ceux des cartilages du Larynx, où les bouts des Cordes vocales sont attachés, qui tirent ou qui relâchent ces cordes. Mr. Ferrein découvre par l'anatomie de ces parties, les articulations & les muscles qui leur donnent le mouvement nécessaire, & il va même jusqu'à montrer la manière de s'assurer par le tact dans l'Homme vivant, non seulement de la réalité, mais encore des degrés de ce mouvement, & de juger à peu-près de la différence des tons qui en doivent résulter. C'est en tirant ces mêmes cartilages dans les expériences, & en imitant leur jeu naturel, qu'il fait varier les tons des Larynx dont il se sert.

Il annonce en finissant, un nouvel organe qu'il a découvert indépendamment de ce qu'on vient de voir, & qui donne certaines différences particulières de la Voix. Il assure même qu'il y a tel animal qui fait entendre naturellement les deux Voix qui dépendent de ces deux organes, & qui sont à plus d'une octave l'une de l'autre; mais il n'en parlera que dans un autre Mémoire.

Ce qu'on appelle voix fausses dans le chant, vient communément du défaut d'oreille plutôt que d'aucune défecuosité dans l'organe de la Voix. Il faut convenir cependant qu'il y a des voix fausses par elles-mêmes, & la théorie que nous venons d'expliquer en rend la cause & la possibilité * très sensibles. Il suffit

pour cela d'un petit manque d'uniformité dans le tissu, la tension, l'élasticité, ou enfin dans les longueurs des deux Cordes vocales, & que la différence qui s'y trouve ne soit pas harmonique, qu'elle soit au contraire de faux accord ou incommensurable.

SUR LES MAUVAIS EFFETS

DE L'USAGE

DES CORPS A BALEINE (a).

LE Mémoire que Mr. Winslow nous a donné cette année sous ce titre, est une suite de ses Réflexions anatomiques sur les infirmités qui arrivent au Corps humain, à l'occasion de certaines attitudes & de certains habillemens (b): source de maux d'autant plus dangereuse, que l'on est communément moins en garde contre elle, & qu'elle tient à un desir de plaire qui l'emporte souvent sur l'amour même de la santé. Ce qui est certain, & dont on sera convaincu par la lecture du Mémoire de Mr. Winslow, c'est que les Corps à baleine peuvent causer & causent en effet très souvent aux femmes & aux jeunes personnes qui en font usage, des incommodités fâcheuses, & des maladies qu'on attribue ordinairement à de tout autres causes, qu'on traite par-là sans suc-

(a) Voyez les Mémoires page 234.

(b) Voyez les Mémoires de l'Académie 1740, page 84.

succès, & qui deviennent quelquefois incurables.

Mr. Winslow avoit observé dans plusieurs femmes & filles de condition, que les côtes inférieures se trouvoient plus basses, & les portions cartilagineuses de ces côtes plus courbées que dans les hommes & les enfans, & dans les femmes & filles du bas peuple. Il jugea que cette différence ne pouvoit être mise sur le compte de la Nature, qui ne connoit certainement point de ces distinctions d'état, ni venir d'aucune autre circonstance étrangère, mais seulement de l'usage fréquent & habituel des *Corps forts*, qui sont d'ordinaire extrêmement serrés par embas, & qu'on fait porter ainsi * aux jeunes per-
*Pag. 57.
in 4.

sonnes pour leur donner ou pour leur conserver ce que selon la mode présente on appelle une belle taille. Les réflexions qu'il fit sur cet usage lui fournirent bientôt la solution de plusieurs difficultés qu'il s'étoit formées sur la cause de certaines indispositions locales, & de certaines infirmités qu'il avoit remarquées dans les femmes accoutumées à porter des Corps à baleine. Il conçut que les intestins violemment pressés de bas en haut devoient comprimer l'estomac, le foie & la rate, les pousser fortement contre le diaphragme, & non seulement forcer ce muscle à se vouter plus que ne le demande la respiration, mais encore retarder ou empêcher le mouvement des différentes parties nécessaires à la respiration. La respiration gênée par le serrement des côtes inférieures & par la voute forcée du diaphragme, trouble la circulation

du sang dans le cœur & dans les gros vaisseaux qui en dépendent, & d'autant plus que la pression de l'aorte descendante & de la veine cave inférieure, retient en partie le sang dans les gros vaisseaux supérieurs, non seulement dans ceux de la poitrine, mais aussi dans ceux de la tête & du cerveau, & y occasionne une espèce de regorgement, qui, selon les différentes dispositions du Sujet, peut occasionner des palpitations, des polypes, des maladies pulmonaires, des maux de tête, des vertiges, des anévrysmes, & même tôt ou tard l'apoplexie. La compression de l'estomac, du foie & de la rate produira des accidens plus ou moins fâcheux par rapport aux nerfs, aux glandes mésentériques, à la route du chyle, aux reins, à la vessie & aux autres parties contenues dans la capacité du bas ventre. Du genre nerveux offensé naîtront les foiblesses, les suffocations, vulgairement appelées vapeurs, les tremblemens, les dispositions à la paralysie, &c.

Voilà, selon Mr. Winslow, les accidens plus ou moins fâcheux que les Corps à baigne doivent occasionner par leur partie inférieure & moyenne, selon que l'usage qu'on en fait est plus outré ou plus continu, & cela tant qu'ils sont plus roides, plus étroits, & qu'ils étranglent, pour ainsi * dire, d'avantage la partie du corps à laquelle ils sont appliqués. On croiroit après cela que leur partie supérieure étant toujours évasée & plus large, ne sauroit être nuisible; mais on va voir que Mr. Winslow y découvre des inconvéniens qui, pour être moins à craindre, ne
laiss-

* Pag.
58. in 4.

laissent pas de devoir être évités. Les échancrures des Corps au-dessous des bras, & qui répondent à peu-près au creux de l'aisselle, brident violemment deux muscles, savoir, le grand pectoral & le grand dorsal, qui forment le creux de l'aisselle, & qui servent aux principaux mouvemens des bras; le tranchant & les bords de ces échancrures serrent aussi les vaisseaux & les nerfs axillaires, de manière que quelques personnes en ont les bras rouges, & souvent tout livides, avec plus ou moins d'engourdissement, & qu'elles ne peuvent les étendre en avant. D'ailleurs les épaulettes, ces bandes qui passent par dessus l'épaule, reculent tellement les moignons des épaules que les extrémités antérieures des clavicules au haut du *sternum*, deviennent quelquefois par là très saillantes, & sont comme prêtes à se déboîter, ce qui paroît sur tout aux personnes maigres. Enfin Mr. Winslow explique par là un phénomène qui avoit fort embarrassé le célèbre Riolan; cet Auteur qui étoit premier Médecin de la Reine Marie de Médicis, & qui vivoit par conséquent dans un siècle où l'on sait que les Corps étoient encore plus en usage parmi les femmes du grand monde que dans celui-ci, avoit observé que la plupart de ces femmes avoient l'épaule droite plus grosse & plus charnue que l'épaule gauche; & il ne savoit, comme il l'avoue dans un de ses Ouvrages d'Anatomie, à quoi attribuer cette différence. Il pensa d'abord que ce pouvoit être l'effet du mouvement du bras droit, qui étant plus fréquent que celui du bras gauche, tirailloit & écartoit l'omoplate de ce côté, & en dilatoit

les muscles , en y faisant couler le suc nourricier & les esprits en plus grande abondance. Mais cette cause qui peut agir jusqu'à un certain point, pourquoi ne se manifeste-t-elle pas de même , ou par des effets encore plus

* Pag. 59. in 4. marqués dans les femmes du bas peuple & dans les * hommes? Il faut donc nécessairement en venir à quelque circonstance qui soit propre aux sujets dont il s'agit , & c'est ce que Mr. Winslow trouve dans l'abus des Corps à baigne. Les personnes accoutumées à en porter, ne laissent pas de remuer pour l'ordinaire beaucoup plus le bras droit que le bras gauche ; la partie de ces Corps qui se termine au dessous de l'aisselle, & la bande qui passe par dessus l'épaule du bras droit, se doivent donc relâcher peu à peu par le fréquent mouvement de ce bras, & beaucoup plus que du côté gauche ; après quoi il n'est pas surprenant que la matière de la nutrition & de l'accroissement y coule & s'y arrête en plus grande abondance que dans l'épaule gauche, où tout est plus contraint & plus resserré. Il n'y a pas d'apparence que cette difformité soit si sensible aujourd'hui. Si elle l'étoit, Mr. Winslow n'auroit pas sans doute manqué de le dire, & ce n'eût pas été un des moindres motifs dont il auroit pu accompagner ces conseils salutaires.

Nous renvoyons entierement aux Mémoires ,
 Les Observations de Mr. Morand sur les
 Re-

Remèdes de Mlle Stephens, pour la Pierre (a).

L'Ecrit du même sur des Pierres de Fiel singulières (b).

MR. Morgagni Premier Professeur d'Anatomie dans l'Université de Padoue, pu-
 blia l'année dernière plusieurs Ouvrages d'A-
 natomie, en deux Volumes in 4°. dont Mr. Morand a lu un Extrait détaillé à l'Académie,
 & dont voici le titre: *Viri celeberrimi, Antonii Mariae Valsalvæ, Opera, hoc est, Tractatus de*
de Aure humana, editione hac quarta accuratissime descriptus, tabulisque archetypis exornatus;
Et Dissertationes Anatomicæ quæ nunc primum
prodeunt, ad colon intestinum, ad arteriam ma-
gnam, ad accessorios nervos, ad oculos, ad suffu-
siones, Et ad renum succenturiatorum excretorios
ductus attinentes, tabulis itidem illustratæ. Om-
nia recensuit, Et Auctoris vitam, suasque ad
tractatum Et Dissertationes Epistolas addidit duo-
*deviginti Joannes * Baptista Morgagnus.* La
 plupart de ces Lettres de Mr. Morgagni font
 autant de Dissertations savantes & curieuses,
 qui, excepté la huitième, n'avoient point en-
 core paru, & elles remplissent la plus grande
 partie du premier Volume, & tout le second.
 Cet excellent recueil contient une critique
 judicieuse de plusieurs Auteurs d'Anatomie qui
 ont écrit sur les mêmes sujets, sans en excepter
 le célèbre Valsalva qui avoit été Maître de
 l'Au-
 ame Edi-
 tion du
 Traité de
 l'Oreille,
 de Valsal-
 va, &c.
 & divers
 Ouvrages
 de Mr.
 Morgagni.
 La Page. 60.

(a) Voyez les Mémoires, page 166.

(b) Page 355.

l'Auteur , des descriptions plus exactes des parties que celles qu'on en avoit , des éclaircissements qu'on ne trouve point ailleurs , & quantité d'observations sur l'Anatomie comparée. Mr. Morgagni y cite souvent les Anatomistes de l'Académie des Sciences, dont il fait partie depuis l'année 1731 , en qualité d'Associé Etranger. On trouvera ici plusieurs découvertes de Mrs. Duverney , Méry , Littré , Winslow , Petit Chirurgien , Petit Médecin , Morand & Hunauld , indiquées ou rapportées en preuve , avec l'éloge qu'elles méritent.

D I V E R S E S
O B S E R V A T I O N S
A N A T O M I Q U E S.

I.

Sur la Structure cellulaire du Corps vitré.

MR. Demours, dont nous avons parlé dans un des articles de l'Histoire Naturelle , & qui est connu par son savoir & son habileté dans le traitement des maladies des Yeux , est venu lire cette année à l'Académie , trois Mémoires sur l'Anatomie de l'Œil.

Dans le premier de ces Mémoires il démontre anatomiquement la structure cellulaire du Corps vitré. Il prouve dans le second , que la Cornée transparente n'est point une continuation

nuation de la Selérotique, comme on l'a cru jusqu'à présent. Le troisième contient plusieurs expériences d'où il * suit que les cellules du Corps vitré communiquent les unes avec les autres. * Pag. 61. in 4.

Nous allons rendre compte de ces trois Mémoires, & sans nous attacher à l'ordre dans lequel ils ont été lus à l'Académie, nous parlerons du troisième à la suite du premier, comme ne faisant qu'une continuation du même sujet.

L'organe de la Vue sur lequel les Anatomistes, les Philosophes & les Physiciens semblent s'être exercés à l'envi, & qui en effet n'est pas moins nécessaire pour l'instruction, la conduite & l'ornement de l'esprit de l'Homme, que pour la conservation de son corps, fournit encore & fournira sans doute longtems une ample matière à nos recherches & à nos découvertes. Entre les parties qui composent cet organe, on sait qu'il y a trois *Humeurs* ou substances renfermées dans le globe de l'œil; l'antérieure ou la première est l'humeur aqueuse; la seconde, improprement appelée humeur, puisqu'elle est plutôt solide que fluide, est la Cristalline, ou simplement le Cristallin, espèce de lentille ou de loupe; & la troisième qui tient un milieu entre la solidité & la fluidité, est l'Humeur vitrée. Ce qu'elles ont de commun est de laisser par leur transparence un libre passage à la lumière, & par leur configuration d'en réunir les rayons sur la Rétine & sur la Choroïde qui tapissent le fond de l'œil, & qui constituent l'organe immédiat de la vision.

L'Humeur vitrée ou le Corps vitré, qui fait l'objet du Mémoire de Mr. Demours, remplit beaucoup plus des trois quarts de la capacité du globe de l'œil, & consiste selon plusieurs Modernes, en un amas de cellules formées par la membrane *Hyaloïde* ou Tunique vitrée, & pleine d'une liqueur semblable à l'humeur aqueuse; d'autres prétendent que c'est un tissu de vaisseaux de différens genres. Quoiqu'il en soit, c'est un assemblage de petites membranes ou de petits vaisseaux, & d'une liqueur qui les remplit, ou qui en occupe les interstices, qui donne à l'Humeur vitrée plus de consistance qu'en a l'humeur aqueuse, & qui la rend moins coulante. Mr. Demours examine tous les différens * sentimens qu'on a eus là-dessus avant que de nous exposer le sien.

* Pag. 62.
in 4.

Riolan est le premier qui ait dit que la tunique hyaloïde jettoit dans toute la substance de la masse vitrée quantité d'*alongemens*, desquels dépendoit l'espèce de solidité qu'on apercevoit à cette humeur, & que ces alongemens que Mr. Winslow appelle *cellulaires*, & qu'il dit être une continuation de la lame interne de la Tunique vitrée, étant rompus, l'Humeur vitrée proprement dite se montrait avec toute sa fluidité, & paroïssoit semblable à l'Humeur aqueuse.

Hovius prétend au contraire, & Mr. Boerhaave semble être de ce sentiment, que le Corps vitré est formé d'un amas de vaisseaux de différent genre renfermés dans la membrane hyaloïde, & dont l'arrangement est, dit-il, merveilleux. Il assure avoir fait cette

dé-

découverte à la faveur d'une nouvelle injection préparée chymiquement : mais Hovius ne dit point ni en quoi consiste cette injection , ni de quelle manière il s'y est pris pour en remplir les vaisseaux du Corps vitré.

Le premier de ces deux sentimens opposés n'est qu'une conjecture dont personne n'a donné jusqu'ici aucune preuve suffisante , & cette conjecture seroit même détruite par la prétendue découverte d'Hovius , si cet Auteur méritoit assez de confiance. Le second est une pure imagination : Hovius a beau dire dans son *Traité De circulari Humorū motu in Oculis* , qu'il y a vu par le secours de son injection chymique , que le Corps vitré étoit un amas de nerfs extrêmement transparens , & de vaisseaux nevro-lymphatiques qui entrent par un côté & sortent par l'autre , sans presque souffrir de division ; on ne l'en a pas cru sur sa parole , non plus que Waldschmiedt Médecin Allemand , qui avance avec plus de raison , que ce Corps est un composé de cellules parallélépipedes. Mr. Morgagni dont l'autorité seroit bien d'un autre poids , a dit aussi qu'il étoit vraisemblable que l'Humeur vitrée fût contenue dans la membrane hyaloïde , à peu près de la même manière que le suc du raisin est contenu * dans un grain de ce fruit ; *Pag. 63. mais ce savant Anatomiste avoue en même ^{in 4.} tems que ce n'est que par conjecture qu'on parle des cellules du Corps vitré , & qu'il ne connoit personne qui les ait démontrées. Or conjecturer ou soupçonner , même lorsqu'on rencontre la vérité , n'est pas démontrer ni découvrir , quoique ce soit toujours une chose

louable & infiniment propre à faire naître des découvertes.

Mr. Winslow dit en parlant du Corps vitré, qu'on en découvre la structure cellulaire en le mettant tremper dans une liqueur *asagrelette* & légèrement coagulante ; mais il ne spécifie pas quelle est cette liqueur. Il l'indiquera sans doute dans l'Ouvrage qu'il doit publier sur les dissections & les préparations Anatomiques. En attendant, Mr. Demours a fait tremper des Corps vitrés dans des liqueurs aigries par tous les acides minéraux, & il n'a pas trouvé que ce moyen fût suffisant pour pénétrer dans la structure de ces Corps. Tout ce qu'il a remarqué, c'est que lorsqu'on les plonge dans une liqueur acide, ils y perdent un peu de leur transparence & deviennent plus fermes. Or ce changement n'indique pas plus des cellules que des vaisseaux, ou toute autre construction. La même chose arrive au Cristallin & à la Cornée lorsqu'on les fait tremper dans des liqueurs acides, & l'on fait cependant que la structure de ces parties n'est pas cellulaire.

Mr. Morgagni après avoir examiné des Corps vitrés qui avoient trempé dans de l'eau rendue acide par le mélange du jus de citron, à dessein de découvrir la structure intérieure de ces Corps, n'a pas été plus heureux, & il n'ose même assurer qu'il ait vu aucune portion de la membrane hyaloïde.

Enfin l'Auteur des Essais Anatomiques imprimés depuis peu, dit en parlant du Cristallin, *quelques recherches qu'on ait faites sur sa structure, on peut dire qu'elle n'est pas mieux développée que celle du Corps vitré.* II

Il y a cependant un moyen bien facile de s'assurer de la structure de cette partie ; mais ce qui est simple & facile ne se présente pas toujours le premier, & il n'est pas étonnant* * Pag. 64. qu'un tel moyen fût réservé aux recherches^{in 4.} d'un Anatomiste qui a tant d'intérêt à connoître l'organe de la Vue. Il ne s'agit, dit Mr. Demours, que de faire geler un œil : lorsqu'on ouvrira en deux cette partie ainsi préparée, on trouvera l'Humeur vitrée gelée par petits glaçons qu'on séparera facilement les uns des autres. Si l'on présente la pointe d'une aiguille à cataracte ou de tout autre instrument, à la surface des glaçons, on soulèvera des portions d'une membrane extrêmement transparente, & plus forte qu'on n'auroit osé le croire.

Voilà déjà une manière bien simple de démontrer anatomiquement les *productions* ou *exten-* sions de la membrane hyaloïde & la structure cellulaire du Corps vitré. Mais Mr. Demours n'en est pas resté là. Il a examiné avec soin la forme & la disposition des glaçons de l'Humeur vitrée, pour avoir une juste idée de la forme & de la disposition des cellules qui les contiennent ; connoissance, dit-il, très utile pour fixer le diagnostic de certaines maladies des yeux, & sur lesquelles on ne trouve rien dans les Auteurs ; car il ne perd pas de vue le motif principal de ses recherches.

Il a observé 1. Que les glaçons qui sont situés vers la surface du Corps vitré, sont les plus gros de tous, & que les autres diminuent de grosseur à mesure qu'ils s'en éloignent.

gnent. 2. Que les plus gros de ces glaçons sont aplatis , plus longs que larges , assez régulièrement disposés en manière de rayons autour du centre de la partie postérieure du Cristallin , & plus épais par leur extrémité extérieure que par celle qui est tournée vers le Cristallin. 3. Que les glaçons qui sont situés à la partie antérieure du Corps vitré , sont les moins gros de tous , & paroissent sous la forme de petits polyèdres , ou solides taillés à plusieurs faces , dont la figure n'est point régulière , non plus que celle de tous les autres.

C'est d'abord sur des yeux de Bœuf & de Mouton que Mr. Demours fit cette observation en 1734 , & il la répéta quelques jours après sur des yeux Humains. Toute la différence qu'il remarqua dans ces derniers , c'est que les glaçons * qui étoient situés vers la partie antérieure de l'Humeur vitrée , étoient à proportion beaucoup plus petits que dans l'œil de Bœuf , & qu'ils n'excédoient pas la tête d'une très petite épingle : il aperçut aussi une grande quantité de bulles d'air d'inégale grosseur , répandues parmi les glaçons. Ces bulles d'air peuvent servir à démontrer bien facilement les productions cellulaires de la lame interne de la Tunique vitrée. Il n'y a pour cela qu'à comprimer la membrane qui retient l'air , ou l'ouvrir avec la pointe d'une aiguille à cataracte.

Pour bien observer toutes ces choses il faut avant que d'ouvrir un œil gelé , le tenir pendant une demi-heure ou une heure dans un air tempéré , ou ne le difféquer que lorsqu'

* Pag.
65. in 4.

que le dégel commence ; si l'on vouloit l'ouvrir pendant qu'il est fortement gelé , on auroit plus de peine à observer la forme des glaçons de l'Humeur vitrée , parce que la pression de ces glaçons les uns contre les autres étant alors très grande, ils ne se séparent pas si facilement.

Mr. Demours finit ce premier Mémoire par un aveu fort ordinaire aux vrais Savans , c'est qu'il y auroit encore bien des connoissances à desirer pour perfectionner sa découverte, & qu'il ignore si les cellules du Corps vitré communiquent ou ne communiquent pas entre elles ; mais nous allons voir que de nouvelles recherches le mirent bientôt en état de s'éclaircir sur cet article qui fait le sujet de son troisième Mémoire.

On sait que le Corps vitré tiré de ses enveloppes laisse échapper la liqueur qu'il contient, la même chose arrive lorsqu'on l'écrase entre les doigts ; mais la première de ces expériences est équivoque, puisqu'on peut soupçonner que dans ce cas le Corps vitré ne laisse échapper sa liqueur que parce qu'en le tirant hors du globe de l'œil , on en a déchiré la membrane ; & si la seconde avoit lieu, on en pourroit aussi conclurre que les grains d'une grappe de raisin qu'on auroit écrasé entre ses mains, & dont on auroit exprimé la liqueur, communiquoient entre eux.

Mr. Demours ayant regardé sans dessein quelques Corps * vitrés qui lui restoient dans un vase, avant que de les jeter comme inutiles, fut surpris de la mollesse d'un de ces corps qu'il avoit mis dans une liqueur acide.

* Pag.
66. in 4.

Il se rappella qu'il l'avoit tiré la veille d'un œil de Bœuf sans en détacher le cristallin, & qu'après en avoir ouvert superficiellement la tunique, il avoit poussé de l'air dans cette ouverture par le moyen d'un tuyau à souffler, pour tâcher de soulever quelque portion de la lame externe de la membrane hyaloïde, ce qui lui avoit réussi quelquefois. Ce Corps vitré lui parut beaucoup plus mou que ne doivent l'être ceux qu'on met tremper dans une liqueur acide sans en ouvrir la tunique, c'en étoit assez pour faire soupçonner que ce qui s'en étoit perdu, pouvoit s'être échappé par l'ouverture faite à la membrane hyaloïde, & pour supposer la communication des cellules du Corps vitré; mais ce n'étoit encore là qu'une conjecture, & quoiqu'elle ne fût pas sans fondement, elle ne suffisoit pas pour prouver cette communication des cellules entre elles. Il falloit de nouvelles expériences qui ne laissassent là-dessus aucun doute. Mr. Demours en a donc fait un grand nombre, parmi lesquelles nous choisirons celles qui paroissent les plus décisives. Il répéta d'abord celle dont nous venons de parler, & qui a donné lieu à toutes les autres.

Pour cet effet il tira avec beaucoup de précaution le Corps vitré d'un œil de Bœuf sans en détacher le cristallin, & il le mit dans une liqueur acide après avoir ouvert superficiellement la Tunique vitrée; au bout de 24 heures de macération il le trouva considérablement plus mou. En supposant que la membrane ne fût ouverte que dans un endroit, il étoit naturel de conclurre de la mollesse de
ce

ce corps , qu'il avoit non seulement perdu une partie de l'humeur contenue dans ses cellules , mais encore que ce qui s'en étoit échapé , étoit sorti par l'ouverture faite à sa tunique , ce qui suppose nécessairement une communication des cellules du Corps vitré entre elles.

Il ne manquoit à ce raisonnement que d'être confirmé par des expériences dans lesquelles on ne pût pas soupçonner * que le Corps vi-^{in 4.}tré fût ouvert en plus d'un endroit; celle qui ^{Pag. 67.}suit est de nature à ne laisser là-dessus aucun sujet de doute. Mr. Demours a tiré d'un œil de Bœuf très frais , le Corps vitré enveloppé de la Rétine & de la Choroïde sans en détacher le Cristallin , & ayant ouvert dans un seul endroit toutes les membranes, c'est-à-dire , la Choroïde , la Rétine & la Tunique vitrée , il a mis cette masse dans de l'eau rendue acide par le moyen de quelques gouttes d'huile de Vitriol ; après 24 heures de macération il a trouvé cette masse diminuée d'environ un sixième de son poids , d'où il conclut que ce qui s'étoit échapé de la liqueur contenue dans ses cellules , étoit sorti par l'ouverture faite à sa tunique. Mais comme les cellules qui répondoient à l'endroit qui avoit été ouvert , ne pouvoient pas contenir cette quantité de liqueur , il s'ensuit que les cellules voisines de celles qui avoient été ouvertes, s'étoient aussi vidées , ce qui suppose nécessairement une communication entre elles.

Il restoit encore une expérience à faire , c'étoit de voir si le Corps vitré contenu dans
ses

ses enveloppes , & mis dans l'eau commune fans en ouvrir la Tunique , diminueroit de poids , & l'expérience a fait voir que le poids de ce corps demeurait le même.

Dans toutes les expériences que nous venons de rapporter , l'Auteur a toujours préféré des yeux d'animaux aux yeux humains ; car ces derniers sont ordinairement trop flétris lorsqu'ils parviennent entre les mains des Anatomistes , & ils sont par-là peu propres à des expériences où il faut que le Corps vitré n'ait rien , ou presque rien perdu de son poids.

Nous passons , pour abrégé , plusieurs observations accessoiress qui n'ont aucun rapport à la communication des cellules du Corps vitré entre elles ; mais il y en a une qui mérite quelque attention.

L'on fait que le Corps vitré plongé dans une liqueur acide y perd quelque chose de sa transparence. Mr. Demours a toujours remarqué que l'opacité qui survenoit à ce Corps étoit plus grande à la partie antérieure , & sur-tout vers le * centre du chaton qui reçoit le Cristallin , que dans tout le reste de la masse.

Pour rendre raison de ce fait particulier , il faut se rappeler ce que nous avons dit ci-dessus dans l'Extrait du premier Mémoire , savoir , que les cellules du Corps vitré sont beaucoup plus petites vers la partie antérieure de la Masse vitrée , & sur-tout aux environs du chaton , que par-tout ailleurs. Cela posé il n'est pas difficile de comprendre pourquoi , quand on plonge le Corps vitré dans une

une liqueur propre à lui faire perdre sa transparence, l'opacité qui lui survient, est toujours plus grande vers la partie antérieure de ce Corps. Les cellules y étant beaucoup plus petites, les portions membraneuses qui forment ces cellules y sont en plus grand nombre, & comme c'est la Tunique vitrée qui perd sa transparence par l'action de la liqueur acide, l'endroit où cette membrane est plus multipliée & où elle présente plus de surfaces, doit réfléchir une plus grande quantité de rayons de lumière, & paroître par conséquent plus opaque.

II.

Observations sur la Cornée.

Voici maintenant un précis du second Mémoire de Mr. Demours sur la structure de l'Œil.

Les Anatomistes donnent le nom général de Cornée ou de Sclérotique, à cette membrane dure & épaisse qui forme la coque de l'œil, & qui sert d'enveloppe commune à toutes les parties qui concourent à la formation de cet organe; mais ils la distinguent en deux portions inégales, l'une desquelles, & qui est la plus petite de beaucoup, ils nomment Cornée transparente. C'est l'antérieure, & celle à travers laquelle on voit la Prunelle & l'Iris. Ils appellent l'autre Cornée opaque, & ils s'accordent tous à regarder la Cornée transparente comme une continuation de celle-ci. Cependant pour plus
de

• Pag. 69. de briéveté & de clarté, nous ne qualifions
in 4. du nom de Cornée que la première, savoir,
la Cornée *transparente, & nous réserverons
celui de Sclérotique pour la seconde.

Frappé des différences sensibles qu'on aperçoit entre ces deux membranes, Mr. Demours s'est toujours défié du sentiment généralement reçu sur ce sujet; & il penche à croire que Mr. Winslow a eu le même doute, lorsqu'il s'est exprimé ainsi dans son Exposition Anatomique, *La Cornée transparente paroît être une continuation de la Sclérotique ou Cornée opaque, quoique d'un tissu différent.*

La Cornée en effet est aussi diaphane que le cristal le plus pur, & ne reçoit que des Vaisseaux lymphatiques: la Sclérotique au contraire est opaque & parsemée de Vaisseaux sanguins.

La Cornée peut se diviser en plusieurs lames, il n'en est pas de même de la Sclérotique; & ce qui fait encore une différence considérable, la première se gonfle beaucoup & promptement par la macération, ce qui n'arrive point à la seconde.

La Cornée dans l'Homme & dans la plupart des animaux est un segment de sphère ou approchant, dont le diamètre est plus petit que le diamètre de la Sclérotique.

Dans les Oiseaux la Sclérotique est formée par l'assemblage de plusieurs lames osseuses, longues, étroites, disposées selon la direction de l'axe du globe, & artistement ajustées les unes à côté des autres: elle est cartilagineuse dans les gros Poissons; la Cornée au contraire est membraneuse, & ne sauroit être une continuation

tinuation de ces lames osseuses ou de ce dur cartilage.

Enfin on peut ajouter à tous ces différens caractères , que si la Cornée n'étoit que la Sclérotique même devenue transparente à la partie antérieure du globe de l'œil , l'endroit qui en sépare la partie opaque de la partie diaphane souffriroit plus de variation qu'on n'en observe entre ces membranes; c'est-à-dire, que la Cornée n'auroit pas aussi constamment à peu de chose près le même diamètre dans tous les Sujets de même espèce. D'ailleurs quelle seroit la cause mécanique * qui rendroit, ^{*Pag. 70.} toujours aussi transparente que le cristal une ^{in 4.} portion régulière & déterminée de la Sclérotique, qui est une membrane opaque?

Ces raisons ont toujours fait douter Mr. Demours que ces deux parties fussent une continuation l'une de l'autre , & diverses expériences qu'il a faites , l'ont enfin convaincu que la Cornée & la Sclérotique sont deux membranes distinctes , mais fortement unies ensemble par un tissu fibreux très fin & très serré.

Il a fait macérer pendant longtemps des yeux d'Hommes & de différens Animaux dans l'eau commune, où il les a laissés jusqu'à ce qu'il commençassent à se corrompre ; & les ayant ensuite suspendus à un fil , il les a plongés pendant un demi-quart d'heure dans l'eau bouillante. Par le moyen de cette préparation, il a séparé sans peine & avec le manche du scalpel , la Cornée d'avec la Sclérotique ; & il a apperçu le tissu fibreux qui unit ces deux membranes. Il a remarqué aussi que le

biseau

biseau que forme la Sclérotique à l'endroit où elle s'unit à la Cornée, se trouve après cette préparation creusé en gouttière. Le racornissement survenu à cette membrane par la chaleur de l'eau bouillante, produit cette différence.

Du reste Mr. Demours remarque fort bien que la Cornée ne représente point à la rigueur un segment de sphère, comme on le dit communément, mais qu'elle fait portion d'un sphéroïde un peu allongé, ce qui est, dit-il, une suite nécessaire de la disposition des muscles droits qui compriment l'œil selon la direction de son axe, & qui le tirent en même tems vers le fond de l'orbite, conformément aux observations & au sentiment de feu Mr. Petit Médecin, qui avoit beaucoup travaillé sur la figure & sur les dimensions des parties de l'œil. Le savant P. Scheiner a connu il y a plus d'un siècle, que la Cornée n'étoit pas sphérique; mais il la compare au sommet d'un sphéroïde parabolique ou hyperbolique.

* Pag. 71. Mr. Demours ajoute encore ici ses réflexions sur les * lumières qu'on peut tirer de tous ces faits pour le traitement des maladies des Yeux, mais c'est un détail qu'il ne fait que toucher succinctement, en attendant que les exemples lui en apprennent davantage.

III.

Sur les Noyés.

Depuis que Becker, & après lui Mrs. Lit-
tre

tre (a) & Senac (b), ont fait voir que ce n'est point à force d'avaler de l'eau que les Noyés périssent, il n'est plus question que de savoir comment ils sont suffoqués. Becker veut que ce soit par la raréfaction de l'air dans le Poumon ; Mr. Littre par le défaut d'air seulement, ne comptant pour rien le peu d'eau écumeuse qu'on y trouve, puisque selon lui les Pulmoniques, les Asthmiques & les Hydropiques ont le poumon bien plus embarrassé qu'il ne peut l'être par cette petite quantité de liqueur, & ne laissent pas de vivre. Mr. Senac croit aussi que c'est par le défaut d'air & de respiration que les Noyés meurent ; mais il conçoit en même tems que la trachée-artère qui ne peut recevoir que de l'air, s'irrite à l'approche de l'eau, entre en convulsion, & cause à l'animal qui se noie des ruptures de vaisseaux pulmonaires, comme on voit qu'il arrive aux Patients qui meurent de la question telle qu'on la donne à Paris.

Le fait une fois constaté que les Noyés ne périssent point par l'eau qu'ils avalent, mais par la suffocation, il seroit également curieux & utile de savoir en combien de tems un Homme qui se noie, peut perdre la vie.

C'est sur quoi Mr. Petit Bachelier en Médecine, fils de Mr. Petit Médecin dont on trouvera l'Eloge à la fin de cette Histoire, est venu lire ses expériences & un Mémoire à l'Académie. Il a retenu sous l'eau des Animaux de différente espèce, & même des Insectes

(a) Voyez l'Histoire de 1719, page 32.

(b) Voyez l'Histoire de 1725, page 16.

fectes à l'imitation de Mr. de Réaumur , & il en a trouvé de ces derniers, tels que les Hannetons , qui sont revenus après une pareille épreuve de 40 à 50 heures.

*Pag. 72.
in 4.

* Il n'en est pas de même à beaucoup près des Oiseaux & des Quadrupèdes. Les Poules, les Poulets, les Pigeons, les Moineaux mis en épreuve, y perdent la vie en moins de 3 ou 4 minutes. Les Canards y ont vécu jusqu'à 8 ou 10 minutes, & même jusqu'à un quart d'heure, ce qui n'est pas difficile à comprendre, quand on fait que leur trachée-artère à l'endroit où elle se divise en bronches, devient osseuse, & y forme une poche remplie d'air. Les Quadrupèdes tels que les Chiens & les Chats ont expiré en deux minutes, ou tout au plus tard en 2½.

De ces expériences répétées & faites avec soin, & de la conformité qu'il y a des parties de la respiration dans l'Homme & dans les Quadrupèdes, Mr. Petit se croit en droit de soupçonner qu'à la rigueur l'Homme ne vivroit pas plus longtems sous l'eau que les Animaux dont nous venons de parler, s'il y étoit retenu de la même manière. Mais s'ensuit-il delà qu'il soit inutile de secourir les Noyés, de les retirer de l'eau lorsqu'ils y ont été plusieurs minutes ou même plusieurs heures ? C'est ce que Mr. Petit n'a garde de conclure, & voici les raisons qu'il en donne.

1. Les Hommes qui se noient se donnent toujours machinalement des mouvemens qui les font révenir à la surface de l'eau, où ils respirent par reprises, & où ils se remettent pour des instans à peu près dans l'état naturel,

rel. Mr. Petit a imité ces respirations momentanées, & en a fait l'essai sur des Chiens qu'il retenoit sous l'eau pendant une minute, & qu'il laissoit alternativement revenir au-dessus & s'y débattre. Il en a trouvé qui vivoient encore fort bien après 10 à 12 minutes qu'ils avoient été ainsi plongés & re-plongés.

2. On sait que les Plongeurs employés à la pêche des Perles, restent quelquefois jusqu'à 15 minutes & plus au fond de la mer sans perdre la vie, & que c'est vraisemblablement parce qu'ils font avant que de plonger une grande inspiration, & qu'ils retiennent ensuite cet air aussi longtems qu'il leur est possible; ce qui leur facilite le passage du sang du ventricule droit au ventricule gauche du cœur, * en quoi consiste principalement la mécanique de la respiration. Or ne peut-il pas se faire que les Noyés en revenant à la surface de l'eau, & en retenant ainsi de l'air dans leur poitrine, la dilatent par ce moyen, & y facilitent de même la circulation du sang? * Pag. 73; in 4.

3. Enfin il y a des adultes dans lesquels le trou ovale ou botal, qui supplée à la respiration dans le fœtus, & le canal de communication sont encore ouverts. On lit dans l'Histoire de l'Académie de 1700 & 1701, que Mr. Littre avoit trouvé le trou ovale ouvert dans deux Sujets, dont l'un étoit âgé de 20 à 22 ans, & l'autre de 40. En 1724 Mr. Petit Médecin fit voir à l'Académie le cœur d'un Homme âgé de 40 à 45 ans, qui avoit de même le trou ovale & le canal artériel ouverts. C'est apparemment le cas où se trou-

voit ce Sicilien nommé Colas, qui au rapport de Cardan, pouvoit refter trois ou quatre heures fous l'eau, le même que Jovien Pontanus avoit célébré avant lui dans fon Poème intitulé *Uranie*.

Ces remarques font autant de motifs de fe-courir promptement les Noyés. Des faits tout récents & qu'on ne peut révoquer en doute, nous apprennent qu'on en a fauvé plusieurs qui avoient été des heures entières dans l'eau. Eh que ne doit-on point tenter en leur faveur après la fameufe Thèse de Mr. Winslow sur l'incertitude des fignes de la mort! Auffi Mr. Petit n'a-t-il pas oublié d'ajouter dans fon Mémoire tout ce que la Médecine pouvoit pratiquer de plus efficace sur les vrais ou prétendus cadavres des Noyés, pour les rappeler à la vie. Mais nous nous difpenferons de rapporter ici ces préceptes, parce qu'ils font à peu-près les mêmes que ceux que l'Académie fit imprimer sur ce fujet l'année dernière 1740, dans un avis particulier que Mr. le Comte de Maurepas Miniftre de la Marine, Mr. d'Argenson Intendant de Paris, & Mr. de Marville Lieutenant de Police, firent répandre dans tous les lieux de leurs diftricts. Ce même avis fera mis encore à la fuite d'une traduction françoife de la Thèse de Mr. Winslow, accompagnée de favantes * & utiles additions que Mr. Bruhier Docteur en Médecine nous a communiquées, & qu'il donnera inceffamment au public (a).

* Pag.
74. in 4.

(a) Donné en 1742.

I V.

Histoire d'une maladie singulière de la Matrice.

On a vu plusieurs fois se détacher des escarres du Vagin & de la Matrice, par des maladies & des accidens survenus à ces parties, sans que la malade en mourût; mais il n'y a point d'exemple d'une séparation totale de la Matrice, à laquelle le Sujet ait pu survivre. Cependant Mr. Vacher Correspondant de l'Académie, Chirurgien-major des armées du Roi & des Hopitaux de Besançon, nous a rapporté un fait d'après lequel, & à la suite de divers accidens que nous supprimons, il pense que ce Viscère est entièrement tombé par le Vagin, sans que la malade en soit morte, ni même qu'elle ait cessé de jouir d'une parfaite santé.

Ce sera peut-être un moyen de tirer de Mr. Vacher des éclaircissemens utiles sur ce sujet, que d'ajouter ici quelques difficultés qui m'ont été communiquées sur sa relation par un savant Anatomiste de la Compagnie.

Quoique cette partie que rendit la malade & qu'on crut être sa Matrice, fût fort épaisse, il ne semble pas cependant qu'elle le fût assez pour cela, ni que ce fût autre chose qu'une simple exfoliation de ce viscère. Les raisons que notre Anatomiste allègue pour en douter, sont 1. Qu'une Matrice malade pouvoit avoir considérablement augmenté de volume. 2. Que la portion du Vagin qui tenoit à la partie de la Matrice que Mr. Va-

cher nous fit voir , & qu'il avoue n'être qu'une exfoliation du Vagin , étoit d'une plus grande épaisseur que tout le Vagin en état de santé, & que par proportion la partie de la Matrice qu'il prit pour la Matrice entière, n'en seroit pas peut-être la moitié ou le quart. 3. Que l'extérieur de cette portion n'avoit point l'apparence d'une membrane; apparence qu'elle auroit eue si tout le corps de la Matrice étoit tombé. 4. Que le corps de la Matrice ne se seroit point * détaché sans avoir emporté avec lui quelques portions des trompes, des ligamens, &c. dont on n'a pourtant pas vu de vestige. 5. Si tout le corps de la Matrice étoit tombé, il seroit difficile que quelque intestin n'eût pas posité de l'ouverture qui se seroit faite alors dans la cavité du bas ventre, pour venir se loger dans le Vagin, ou pour sortir même au-delà. 6. Que l'exfoliation qui est arrivée au Vagin, nous indique qu'il en a pu arriver une pareille dans le corps de la Matrice; & enfin que ce n'est que la partie interne de ce viscère qui s'est détachée par la pourriture gangréneuse qui l'a attaquée ainsi que le Vagin.

Quoi qu'il en soit, l'observation de Mr. Vacher nous présente un fait très singulier, & qui confirme parfaitement ce qu'on a vu dans quelques autres occasions, que des parties où la moindre blessure est presque toujours mortelle, & où l'Art ne sauroit porter son secours, peuvent quelquefois se trouver percées d'outre en outre, déchirées ou entièrement détruites, sans que le Sujet en perde la vie, lorsqu'il

* Pag.
75. in 4.

lorsque la Nature a eu le tems d'y ménager elle-même ses ressources.

V.

Cure extraordinaire d'une Paralyse.

Mr. Gros Médecin de la ville d'Arles, nous a fait part de la guérison d'un Paralytique, très prompte & très parfaite, qu'il a opérée dans cette ville, en faisant frapper à diverses reprises & pendant quelques jours les parties affectées du malade, avec des Orties piquantes.

Sans prétendre rien ôter à la sagacité que Mr. Gros a marquée dans cette rencontre, nous observerons que la flagellation des Orties, quoique peu connue, & dont nous ne savons pas que d'autres Médecins modernes aient fait usage, n'a pas été ignorée des Anciens. Celse la conseille pour la guérison de la même maladie (a), & recommande aussi l'application de la Moutarde sur la partie paralytique. C'est ce qu'ils appelloient *Urticatio*, *Sinapismus*, ou en général *Phœnigmus*, * nom qu'ils donnoient à tous les remèdes qui irritent la peau jusqu'à la rougeur, pour rappeler le sang & les esprits à l'habitude du corps. On peut voir ce qu'en a dit Rolfiacius (b), savant Médecin Allemand qui vivoit vers le milieu du siècle passé.

* Pag. 76. in 4.

(a) *Lib. III. cap. 27.*

(b) *Ordo & Method. Medicin. specialis, &c. page 438.*

VI.

Relâchement des Muscles des Bras & de la Tête.

Mr. Martin Docteur & Professeur de Médecine à Lausanne, Correspondant de l'Académie, a mandé à Mr. de Réaumur, qu'un jeune garçon de 10 ans, après une chute dont il ne ressoit aucune marque extérieure, a les bras, les mains, & certains muscles de la tête sans action, de manière que la tête lui tombe tantôt sur le dos, & tantôt sur la poitrine. Cependant par un jeu habituel du dos, il la place droite & en équilibre; mais elle retombe lorsqu'il penche le tronc par mégarde. Du reste le jeune garçon se porte bien, & la sensation dans ces parties flasques lui est restée comme à l'ordinaire.


VII.

Conformations singulières.

Mr. Morgagni a envoyé à Mr. Morand plusieurs observations anatomiques sur des conformations singulières de parties, telles que des Uretères doubles à un des Reins, deux Reins unis ensemble de façon à n'en faire qu'un, treize Côtes de chaque côté, la treizième formant plutôt un bout de côte entière; & Mr. Morgagni bien informé que l'Académie avoit déjà rapporté des faits pareils, présentés par Mrs. Morand & Hunauld, cite les siens seulement comme des exemples à joindre

dre à ceux qui étoient déjà connus. Mais il y ajoute des choses plus rares, savoir, 1. Six Vertèbres lombaires dans un Sujet qui avoit 26 Côtes, dont la première soutenoit les petites Côtes surnuméraires, & la dernière étoit continue à la première de l'Os *sacrum*. 2. Il a trouvé dans un * autre Sujet la Veine iliaque droite revenant à son origine, après avoir fait quelque chemin au dessous du tronc de la veine cave, & formant une espèce d'Ile. 3. Dans une Femme de 39 ans morte d'une Hernie, quatre Valvules au-lieu de trois, à l'orifice de l'artère pulmonaire. Ces Valvules étoient semblables à celles qui se trouvent dans l'état naturel, excepté qu'il y en avoit une fort grande & trois plus petites. C'est une chose digne de remarque que tant de singularités ayent été fournies par quatre Cadavres, de cinq que Mr. Morgagni avoit disséqués en quarante jours dans l'hiver de 1740.

* Pag.
77. in 4.



* Pag. 78.
in 4.

* C H Y M I E.

MOYENS DE CONGELER L'ESPRIT DE VIN,

*Et de donner aux Huiles grasses quelques-uns
des caractères d'une Huile essentielle (a).*

LE fameux Remède Anglois pour la Pierre, donné au public par M^{lle}. Stephens, a produit plusieurs Mémoires dans l'Académie, soit pour en constater & en discuter les effets, soit pour en établir & en examiner la composition. Mr. Morand qui pratique depuis longtems la Taille avec succès, & qui donna en 1728 un Traité sur celle qu'on nomme du *Haut-appareil*, n'en a pas été moins porté à saisir le moyen d'épargner aux Malades une si dangereuse opération. Il nous a lu des dénombremens raisonnés & bien circonstanciés des effets merveilleux que le Remède de M^{lle}. Stephens a déjà opérés en Angleterre & en France, & il prépare là-dessus un plus grand Ouvrage à mesure que les faits & les observations s'accroissent. On sent de quel poids doit être en pareille occasion le

suf-

(a) Voyez les Mémoires, page 14.

suffrage d'un habile Lithomiste. Mr. Geoffroy qui travaille aussi sur ce Remède, & conjointement avec Mr. Morand, mais qui l'envisage plus particulièrement du côté de la Pharmacie & de la Chymie, nous en donna il y a deux ans (a) l'analyse par décomposition & récomposition ; & il a tâché non seulement de le rendre plus sûr & plus simple, mais encore moins dégoutant. Le principal agent de ce Remède, parmi les différens ingrédiens qui le composent, est le Savon d'Alicante, qui n'est, comme on fait, autre chose qu'une espèce d'Amalgame durci d'huile d'Olive & du sel alkali de la Soude. Ces deux substances & la plupart de celles qui leur sont analogues, les * Huiles grasses & essentielles, & différentes sortes de Sels soumis aux opérations Chymiques, modifiés & combinés de mille façons différentes, & selon toutes les finesses de l'Art, font encore le sujet du Mémoire que nous indiquons ici, & qui indépendamment du Remède, contient plusieurs observations Physiques très curieuses. * Page 79. in 4.

THEORIE CHYMIQUE

DE LA TEINTURE DES ETOFFES (b).

LA Théorie des Teintures n'est pas moins intéressante pour la Physique, & surtout pour la Chymie, que pour le Commerce.

(a) Voyez les Mémoires de 1739, pages 374. & 398.

(b) Voyez les Mémoires, page 49.

ce. Mr. Hellot qui avoit déjà commencé il y a un an de traiter cette matière en Chymiste Physicien , & en homme instruit des pratiques de l'Art , & de l'importance de cet Art pour le commerce du Royaume , a continué cette année de nous donner ses réflexions & ses expériences sur ce vaste sujet , dans le même esprit & selon la même méthode. Son Mémoire de 1740 , après quelques préliminaires, traitoit du Bleu; celui-ci qui en est une suite, traite du Rouge & du Jaune. Comme ce sont toujours des recherches & des détails de même nature , & exposés avec beaucoup de clarté, nous renvoyons le Lecteur au Mémoire même.

C'est proprement à Mr. Colbert & aux Réglemens faits sous son Ministère, que sont dus les grands succès des Teintures en France. Les Réglemens donnés en 1667 , & l'Instruction publiée deux ans après par ses ordres , pour procurer aux Etoffes de nos manufactures des couleurs qui résistassent à l'air, commençoient à n'être plus exécutés, & à causer un préjudice sensible dans cette partie de notre Commerce, lorsque Mr. Orry Controleur Général crut qu'il étoit nécessaire de charger un Physicien de l'Académie des Sciences du soin de revoir cet Art, d'en rétablir les pratiques conformément aux vues de Mr. Colbert, & de le porter , s'il est possible, à un plus haut point de perfection. L'art de * la Teinture avoit été jusque-là entre des mains mécaniques , qui ne s'avoient faire communément que ce qu'elles ont déjà fait, la tête qui les doit conduire manquant presque toujours
des

des connoissances accessaires & des principes fondamentaux, seuls capables d'en varier & d'en étendre les opérations. Mr. du Fay fut nommé en 1731, par Arrêt du Conseil, pour travailler sur ce plan, & pour fournir au sage Emule de Mr. Colbert, toutes les instructions dont il auroit besoin pour le faire exécuter ; car la réforme des abus qui s'étoient introduits dans les Teintures, demandoit qu'on y portât une double lumière, celle du Magistrat & du Ministre, & celle du Physicien & de l'Artiste même, ou d'un Physicien capable d'entrer dans tous les détails de l'Artiste. Mr. du Fay avoit déjà fait en 1733 un assez grand nombre d'observations & d'expériences sur ce sujet, & il procura dès-lors un Règlement utile à la fabrique des Tapisseries, & concernant la Teinture des laines filées qu'on y emploie. En 1737 il en occasionna un autre pour la Teinture des laines servant à la fabrique des étoffes, ou à la Teinture des étoffes mêmes déjà fabriquées. Il n'étoit plus question que de décrire l'Art en général ; mais la mort nous enleva en 1739 ce digne Académicien. Mr. Helot nommé à sa place en 1740, a répété avec soin presque toutes les expériences de son prédécesseur, & y a ajouté les siennes. Il s'est attaché particulièrement à expliquer par des principes reçus de tous les Chymistes, la cause de la ténacité des couleurs qu'on appelle de *bon teint*, & de la non ténacité de celles qu'on nomme de *mauvais teint*, ou qui ne résistent ni à l'air ni à l'action des sels qu'on emploie à leurs épreuves. Les deux Mémoires qu'il nous a lus sur ce sujet, & dont nous venons

de parler , sont le premier fruit de ses travaux , & seront suivis de l'art entier des Teintures.

* Pag. 81.
in 4.

* *SUR UN ETAIN*

PRESENTE A L'ACADEMIE.

ON n'admet guère de nouvel établissement de quelque importance dans le Royaume, touchant les Manufactures & les Arts , sans que l'Académie ne soit consultée auparavant sur les utilités qu'on en peut attendre , & sur la protection qu'il convient d'accorder à ceux qui le proposent. Mais si l'Académie se sent honorée par cette confiance de la part du Gouvernement, nous pouvons assurer que de son côté elle n'oublie rien pour tâcher de la mériter de plus en plus , par le soin qu'elle prend de s'instruire à fond des matières sur lesquelles on lui demande de prononcer. Il y a telle de ses décisions que l'on trouve rapportée ici en peu de mots, & qui a coûté des recherches & des discussions immenses aux Commissaires qu'elle nomme à ce sujet, & sur le rapport desquels elle doit régler son jugement. Mrs. Geoffroy & Hellot nous fournissent de quoi en donner un exemple , dans le Mémoire qu'ils ont lu à la Compagnie, sur un Etain présenté à Mr. le Comte de Maurepas , pour en établir une nouvelle fabrique de vaisseaux avec privilège exclusif, & dont ce Ministre avoit renvoyé l'examen à l'Aca-

l'Académie. Il s'agit de savoir si ce métal, que le Sr. Jean-Baptiste-Nicolas de Kemerlin dit être de sa composition, „ est dépouillé „ de son alliage ; s'il est véritablement plus „ pur & d'un meilleur usage que celui dont „ on se sert ordinairement ; & si , pour le „ dépouiller de cet alliage , on n'emploie „ point quelque composition capable de nuire „ à la santé de ceux qui se serviroient de „ vaisselle faite de cette matière”.

On ne peut douter que pour se mettre en état de donner ces éclaircissemens, il n'ait fallu employer différens moyens, & faire bien des opérations sur le métal qui en est l'objet. Ce n'est que par une longue suite d'expériences qu'on peut parvenir à connoître ce qui entre dans la composition des *mixtes ; les substances métalliques sur-tout, étant d'un tissu plus serré, plus lié, plus ténace que les végétaux & les animaux, exigent un travail plus long & plus obstiné. Mais entre les métaux, l'Étain est un des plus difficiles à traiter lorsqu'on veut en reconnoître la pureté. L'Or & l'Argent, par exemple, sont aisés à éprouver, en ce que leur parfaite décomposition ayant été jusqu'ici impossible, on peut toujours séparer aisément de leurs parties propres les matières hétérogènes qui s'y mélangent.

Un des meilleurs moyens de s'assurer de la pureté de l'Étain, est de le calciner ; car on fait que la chaux de l'Étain, ou la *Potée*, cette espèce de cendre qui reste à la place de ce métal après la calcination, est d'autant plus blanche qu'il est plus pur. L'Académie a vu
des

des preuves de cette vérité, lorsque Mr. Geoffroy l'un des deux Commissaires nommés à l'examen dont il s'agit, lut il y a trois ans un premier Mémoire sur l'Analyse de l'Etain (a). Les chaux qu'il fit voir alors à la Compagnie, & qu'il a conservées à l'abri des impressions de l'air, ont servi aujourd'hui de pièces de comparaison.

Outre la calcination de l'Etain du Sr. de Kemerlin, Mrs. Geoffroy & Hellot en ont fait la preuve par la *Pierre d'Essai* des Potiers d'Etain, espèce de petit moule de pierre de Tonnerre, où l'on fait couler ce métal fondu, pour examiner la couleur qui lui vient à la superficie après son refroidissement. Cet essai, le seul qui soit en usage chez les Potiers d'Etain de Paris, quoique fort douteux, a indiqué cependant à nos deux Chymistes la route qu'ils devoient tenir pour imiter l'Etain du Sr. de Kemerlin, & par conséquent pour donner leur avis sur sa pureté.

Ils se sont aussi servi du marteau des Plaqueurs pour savoir si l'Etain proposé se forge aussi bien ou mieux que l'Etain fin des Potiers qui est en usage pour la vaisselle ; & de la lime pour connoître quelle couleur il perd à l'air, après ce simple déchirement de sa surface, avant qu'on lui donne un poli plus parfait.

* Pag.
83. in 4.

* Le même Etain a été pesé dans l'air & dans l'eau, à l'imitation de ce que pratiqua Archimède sur la fameuse Couronne du Roi Hieron, pour l'indication de son alliage, au cas

(a) Voyez les Mémoires de 1738, page 148.

cas que ce metal en eût , en comparant son poids à celui des Etains connus.

On l'a dissout dans une eau régale affoiblie , pour savoir s'il ne s'en précipitoit rien de sale , comme cela arrive aux Etains communs & alliés de plomb , & cette même dissolution appelée *Composition* dans l'art de la Teinture , a été employée ensuite avec un bain de Cochenille fait à l'ordinaire , pour juger par la vivacité de la couleur écarlate qu'elle donneroit à du drap , si cet Etain est plus pur que tout autre : car ce n'est qu'avec une pareille dissolution d'Etain le plus pur qu'on peut faire le bel écarlate.

On a mis tremper de cet Etain dans de la dissolution d'Or , pour voir aussi par la couleur pourpre que l'Etain fait prendre à la dissolution de ce métal , si l'Etain dont il s'agit , est aussi pur qu'un Etain qu'on savoit l'être beaucoup.

Il a été fondu dans un même vaisseau & au même feu avec trois autres Etains , l'un reconnu pour être pur , l'autre simplement pour bon , & l'autre pour mauvais , afin de savoir combien il résistoit plus que les autres à l'action du feu.

On n'a pas dédaigné de consulter quelques Potiers d'Etain des plus habiles , & de faire en leur présence une partie des opérations dont nous venons de parler.

Enfin Mrs. Geoffroy & Hellot ont assez bien imité l'Etain du Sr. de Kemerlin pour se déterminer sur ce qu'ils avoient à en dire.

Toutes ces épreuves , ces diverses expériences , & plusieurs autres faites & répétées plusieurs

fleurs fois , accompagnées de toutes les pré-
 cautions, & même de tous les calculs dont el-
 les étoient susceptibles, ayant été rapportées
 à l'Académie dans le plus grand détail , la
 Compagnie a jugé que l'Etain présenté à Mr.
 le Comte de Maurepas par le Sr. de Kemer-
 lin, bien loin * d'être comme l'Etain d'Angle-
 terre en larme, dépouillé de tout alliage , en
 a même plus que l'Etain fin des Potiers , puis-
 qu'il pèse davantage ; car on fait que l'Etain
 est de tous les métaux le plus léger. La cou-
 leur de ses chaux apportées à l'Assemblée par
 les Commissaires , démontre aussi qu'il n'est
 pas pur , puisqu'elles n'ont pas la blancheur
 de l'Etain d'Angleterre non allié. Cependant
 l'Académie croit qu'il peut être employé uti-
 lement à fabriquer de la vaisselle , sans que
 ceux qui s'en serviroient en aient rien à crain-
 dre pour la santé, & qu'il a encore cet avan-
 tage sur l'Etain fin des Potiers , de ne point
 laisser appercevoir de cuivre, & d'être un peu
 plus difficile à fondre.

* Pag. 84.
 in 4.



* BOTANIQUE. * Pag. 85. in 4.

SUR UNE ESPECE D'OUATE

*Ou de MATIERE COTONNEUSE
trouvée au fond d'un Etang.*

UN amas d'eaux dormantes qu'on nomme l'*Etang de Petre*, à une lieue & demie de Metz, s'étant trouvé desséché par des accidens qu'il seroit inutile de rapporter, les habitans des environs furent extrêmement surpris d'en voir le fond tout couvert d'une matière blanche & cotonneuse, tout-à-fait semblable à de l'Ouate: il fut fait là-dessus quantité de raisonnemens, & l'on ne manqua pas d'en concevoir de grandes espérances pour le commerce du pais. Mr. Lamy de Bezanges Commissaire d'Artillerie, qui étoit sur les lieux; en écrivit à Mr. de Valliere, & lui envoya une description exacte du phénomène & du local, avec des échantillons de la matière en question, pour être communiqués à l'Académie. Ces échantillons ayant été considérés attentivement, même avec le Microscope, on a reconnu que la matière blanche qui les compose, observée pour la première fois sur le fond de l'étang de Petre, au mois d'Avril de cette année, & consistant en des filets

filets très déliés, n'est autre chose que la plante appelée *Conferva*, commune dans les eaux dormantes, dont elle tapisse ordinairement le fond. Cette plante n'est en effet qu'un amas prodigieux de filets noueux & déliés qui demeurent verts tant qu'ils sont dans l'eau, mais qui blanchissent plus ou moins à l'air ou au Soleil, dès qu'ils sont à sec. Mrs. Bernard de Jussieu & Hellot ont observé soigneusement la même plante après l'avoir tirée des bassins du Jardin du Roi, ils l'ont fait dessécher & blanchir à l'air, & l'ayant examinée * au Microscope, & comparée avec l'Ouate de l'étang de Petre, ils l'ont trouvée entièrement semblable à celle-ci. Quant aux espérances que cette découverte avoit fait naître, elles ont paru peu fondées, les filets de la *Conferva* étant trop fragiles & trop friables pour être employés avec succès à aucune sorte de manufactures.


* Pag. 86.
in 4.

R E C E T T E

Pour garantir les Chevaux de la Pique
des Mouches.

L'ACADEMIE ne dédaigne jamais de descendre des spéculations les plus sublimes jusqu'aux plus petits détails lorsqu'ils sont utiles. Mr. d'Ons-en-Bray nous a fait part d'une recette aisée, & qui lui a fort bien réussi pour préserver les Chevaux en voyage de la Pique des Mouches. Prenez des feuilles

les de Noyer ou des écales de Noix , emplissez-en un chauderon , mettez de l'eau par dessus , & faites bouillir le tout pendant un bon quart d'heure. Il faut avant que de partir & de harnacher les Chevaux, soit le matin , soit l'après-midi , les bien bouchonner avec ces feuilles ou ces écales , ou avec une éponge trempée dans cette décoction , qu'on ne peut faire trop forte. Les Mouches qui viendront sur ces Chevaux y resteront peu & ne les piqueront pas.



* ARITHMETIQUE.

* Pag.
87. in 4.

SUR LES ECHELLES

ARITHMETIQUES (a).

IL est évident que la Progression décuple ou *dénaire* qui règne dans notre Arithmétique & dans la manière de compter de tous les peuples connus de la Terre, n'a d'autre fondement que les dix doigts de nos mains, & que si nous avions eu plus ou moins de dix doigts, douze, par exemple, ou huit, la numération se feroit faite selon la progression *duodénaire* ou *octoénaire*. Aristote qui a touché quelque chose de cette recherche dans ses Problèmes, nous apprend cependant qu'il y avoit dans la Thrace

(a) Voyez les Mémoires, page 300.

Thrace un peuple qui ne comptoit que par la Progression *quaternaire* ; c'est-à-dire, qu'après avoir compté 1, 2, 3 jusqu'à quatre, exprimé dans ce cas & en chiffres Arabes, par l'unité avec le zéro, on reprenoit la Progression, & on comptoit autant de fois quatre qu'il le falloit pour exprimer tout nombre qui ne passoit pas quatre fois quatre ou seize, & ainsi de suite jusqu'à quatre fois seize, &c. de la même manière que nous en usons à l'égard des unités, des dizaines, centaines, mille, &c. ce qui, réduit à nos chiffres, seroit écrit de cette manière, 10 pour quatre ; 100 pour quatre fois quatre ou seize ; 1000 pour quatre fois seize ou soixante-quatre ; 13 pour 7 ; 122 pour vingt-six ; 2312 pour cent quatre-vingt-deux : car ce dernier exemple exprime deux fois soixante-quatre, plus trois fois seize, plus une fois quatre, plus deux unités, ce qui fait en tout cent quatre-vingt-deux ; comme il seroit deux fois mille, trois fois cent, une fois dix & deux unités, & en tout deux mille trois cents douze selon l'Arithmétique dénaire. Que si au-lieu de la Progression *quaternaire* on ne vouloit employer que la *binai-*
re, il * n'y auroit alors dans la numération par chiffres que des unités & des zéro. Ainsi 10 ne seroit que deux, 11 trois, 100 quatre, 101 cinq, 1000 huit, 1010 dix, 10000 seize, &c. Cette Progression dans l'Arithmétique, la plus simple de toutes les Progressions possibles, auroit selon Mrs. Leibnitz & de Lagny (a), de fort grands avantages pour cer-
taines

* Pag.
88. in 4.


(a) Voyez l'Histoire de 1703, page 75.

taines recherches curieuses & difficiles; mais elle seroit très incommode dans l'usage ordinaire, par la quantité de caractères qu'elle exigeroit pour de petits nombres. La duodénaire seroit peut-être, toutes compensations faites, la plus utile par le nombre de ses diviseurs, deux, trois, quatre, six; mais pour s'en servir avec nos chiffres, il faudroit nécessairement y ajouter deux nouveaux caractères pour les nombres dix & onze qui seroient dès-lors au rang des unités. Au-dessus de la Progression duodénaire, il n'y a que celle de vingt-quatre qui eût un diviseur de plus, savoir, huit; mais celle-ci devient embarrassante par le nombre de caractères qui entreroient dans son rang des unités. Cependant il n'y a aucune de ces Progressions qui, à certains égards, ne puisse être préférable à toutes les autres, & qui n'ait son utilité particulière de théorie ou de pratique. Parmi les propriétés qui leur sont communes, on doit compter celle qui a été d'abord remarquée du nombre neuf, savoir, que tous ses multiples exprimés à la manière ordinaire, le sont toujours par des chiffres dont l'addition fait neuf, ou un multiple de neuf, & que ces chiffres transposés de plusieurs manières différentes redonnent encore des nombres multiples de neuf (a). Car il est clair que ces propriétés n'appartiennent au nombre neuf dans l'Arithmétique dénaire, qu'entant qu'il est le pénultième de la Progression ou de la suite naturelle des nombres jusqu'à dix. De ma-
nière

(a) Voyez l'Histoire de 1726, page 49.

nière que dans la Progression quaternaire ce ne seroit plus neuf qui auroit ces propriétés, mais trois; & que dans celle de douze ou de vingt-quatre, ce seroit onze ou vingt-trois. Il seroit donc tres commode pour de semblables recherches, & sur-tout lorsqu'il s'agit de grands nombres, d'avoir une Formule, * par le moyen de laquelle on pût ramener promptement ces nombres à l'Algorithme ou à l'expression de l'espèce d'Arithmétique, de Progression ou d'Echelle dont on veut faire usage. C'est ce que Mr. de Buffon a cherché, & qu'il nous donne ici sous le titre de *Formule sur les Echelles Arithmétiques*.

* Pag. 89.
in 4.



ALGÈBRE.

SUR LE CAS IRREDUCTIBLE DU TROISIEME DEGRE (a).

IL y a grande apparence que les Arabes, qu'on croit être les inventeurs de l'Algèbre, n'ont pas connu l'extraction des racines des Equations passé le second degré; du moins est-il certain que Lucas Pacioli, dit *del Burgo*, qui tenoit l'Algèbre des Arabes, & qui l'a fait connoître en Europe dans un Livre intitulé, *Summa de Arithmetica, proportioni e propor-*

(a) Voyez les Mémoires, page 33.

portionalité, imprimé à Venise en 1494, n'a pas été au-delà du second degré. Cardan est vraisemblablement le premier qui, environ 70 ans après Lucas del Burgo, ait poussé l'extraction des racines jusqu'aux Equations cubiques ou du troisième degré; mais ce qui est remarquable, & qui fait honneur à Cardan, c'est qu'il ne fut arrêté dans cette recherche que par une difficulté qui arrête encore les plus subtils Algébristes: cet écueil est le cas où l'Equation à trois racines réelles, toutes trois inégales & venant sous une forme incommensurable.

Ce Cas appelé Irréductible, quoiqu'on n'en puisse pas démontrer l'irréductibilité, est donc devenu en Algèbre ce qu'est en Géométrie la Quadrature du Cercle. On voit clairement qu'il y a dans l'Etendue, dans le Monde intelligible qui fait l'objet immédiat des Géomètres, un carré égal à la surface du Cercle, une ligne droite de même longueur que * la circonférence qui termine le Cercle; mais on ne sauroit assigner la valeur exacte de ce carré ni de cette ligne. * Pag. 90. in 4. On n'est pas moins certain qu'une Equation du troisième degré, qui tombe dans le Cas irréductible, a trois racines réelles; mais on n'a fait jusqu'ici que de vains efforts pour exprimer ces racines en termes connus, on n'a pu changer en réelles assignables les grandeurs imaginaires que présente sa formule, & sous lesquelles les racines réelles de l'Equation se cachent. On a trouvé cependant des résolutions si approchantes, & de la Quadrature du Cercle, & du Cas irréductible, que les Ma-

thématiques mixtes & pratiques en tirent presque le même avantage qu'on pourroit attendre d'une détermination rigoureuse. Ce n'est que dans leur partie spéculative que la Géométrie & l'Algèbre en souffrent, mais on voudroit bien enfin leur ôter cette espèce de tache. Eh que ne doit-on point tenter en effet, pour procurer toute leur perfection à deux Sciences par elles-mêmes si utiles à l'esprit, la clef de tant d'autres, & si chères à ceux qui les cultivent!

Une des plus belles méthodes qu'on y ait employé de nos jours, est celle des Series ou Suites infinies de termes croissans ou décroissans, sous une certaine loi, & qui approchent de plus en plus de la grandeur inconnue qu'on cherche. Mrs. Leibnitz & Newton, & avant eux Mercator & Jaques Gregory, ont enseigné la manière de réduire sous une pareille forme les quantités quelconques qu'on ne peut connoître autrement, &, dans certains cas favorables, de *sommer* tous les termes de ces suites, ce qui donneroit la valeur complète de l'inconnue. L'art de découvrir ces sortes de cas, ou d'y ramener ceux qui en paroissent les plus éloignés, par le moyen de quelque transformation qui les présente sous une nouvelle face sans en changer la nature, soit en elle-même, soit relativement à quelque rapport connu, est tout ce que l'Algèbre moderne peut pratiquer de plus ingénieux, & souvent de plus difficile.

Mr. Nicole a essayé de résoudre le fameux Cas irréductible par cette dernière méthode.

* La Formule de Cardan est composée de ^{*Pag. 91.} deux parties: la première partie est la racine ^{in 4.} cubique de la somme de deux grandeurs, dont l'une est réelle & l'autre imaginaire, & la seconde partie est la racine cubique de la différence de ces deux mêmes grandeurs. Il avoit toujours paru surprenant qu'une grandeur qui doit être réelle, fût exprimée par un composé de quantités réelles & de quantités imaginaires; on sentoît bien qu'il falloit que les quantités imaginaires se détrussissent mutuellement, mais personne que nous sachions, n'avoit montré la manière de faire évanouir ces quantités imaginaires. C'est-là cependant le premier pas qu'a fait Mr. Nicole dans cette recherche, en deux Mémoires qui furent imprimés dans le Volume de 1738 (a). Il y étoit parvenu par le moyen d'une formule algébrique, qui ne contient plus à la vérité de quantités imaginaires, mais où il entre une suite composée d'une infinité de termes dont il n'a pu trouver la somme par aucune des méthodes connues. Ce qu'il donne cette année est la manière de trouver des formules qui expriment ces sommes de termes pris de quatre en quatre. Le Problème est résolu par-là, mais seulement dans un cas particulier, dont nous tâcherions vainement de donner ici une plus ample intelligence aux Lecteurs qui ne sont pas en état de s'en instruire dans le Mémoire même. Il nous suffit d'avoir fait entrevoir ce premier rayon de lumière, qui nous conduira peut-être à un plus grand jour. La

re-

(a) Pages 136. & 346.

recherche dont il s'agit , est également délicate, longue & pénible par les détails de calcul qu'elle entraîne , elle ne demande pas moins de courage que de génie & de savoir; mais heureusement Mr. Nicole y apporte tout ce qu'elle demande, & nous fait espérer qu'il la suivra sur le même plan.

* Pag. 92. * *SUR UNE REGLE D'ALGEBRE,*
In 4.

Que Descartes nous a donnée dans sa Géométrie, & qui a été critiquée par quelques Auteurs (a).

IL s'agit dans cette Règle de déterminer le nombre de Racines positives & négatives que contient une Equation, par l'inspection des Signes *plus* & *moins* qui en séparent les termes, de manière qu'autant de fois que ces deux différens Signes s'y trouveront placés alternativement , autant y aura-t-il de Racines vraies ou positives; & au contraire, autant de fois que le même Signe *plus* ou *moins* s'y trouvera répété consécutivement , autant y aura-t-il de Racines fausses ou négatives.

La Géométrie de Descartes est de tous ses ouvrages celui qu'on eût cru devoir être le plus à l'abri de la critique , par les rares & sublimes découvertes qu'il renferme, toutes démontrées ou susceptibles de démonstration. Mais on ne s'élève pas impunément au dessus

(a) Voyez les Mémoires, page 96.

sus de ses contemporains, on n'excite point
 l'admiration sans faire naître l'envie, & l'en-
 vie qui a les yeux ouverts sur les moindres
 défauts, fait toujours les fermer ou s'aveugler
 à propos, pour ne par voir des qualités émi-
 nentes qui la forceroient d'admirer. Inven-
 teur & Réformateur, Descartes auroit-il évi-
 té les traits de la jalousie ? Il est vrai qu'il
 les a bravés, & qu'à l'égard de sa Géométrie,
 il s'est même attiré à dessein la critique de ses
 jaloux, par la manière succincte & peut-être
 un peu obscure dont il a traité cette Science,
 lui qui dans tous ses autres écrits a donné
 l'exemple d'une méthode & d'une clarté jus-
 que-là inconnues. Mais par un raffinement
 d'amour propre dont les plus grands-hommes
 ne sont pas toujours exemts, il voulut en
 cette occasion préparer des tortures à ses
 adversaires, les égärer & leur faire sentir sa
 supériorité. Cependant il se proposoit quel-
 quefois, comme il l'avoue dans ses Lettres, de
 refaire cet excellent Ouvrage, & de l'éclair-
 cir en * faveur des Lecteurs ; *mais je vois, di-*
soit-il ensuite, qu'ils sont la plupart si malins,
que j'en suis entièrement dégoûté.

* Pag.
 93. in 4.

Si cette disposition d'esprit fut peu louable
 dans un Philosophe tel que Descartes, il en a
 été puni durant sa vie & après sa mort. Les
 progrès de sa Géométrie, de son Algèbre sur-
 tout, & de son Analyse, comprises sous le
 même titre, en ont été plus lents, & des
 Géomètres dont il n'auroit pas dû mépriser le
 suffrage, se sont fondés sur son obscurité pour
 le taxer d'erreur. Les uns ne l'ont pas en-
 tendu, les autres ont affecté de ne le pas en-

tendre, & tous ont été copiés & suivis sans examen, par la foule ignorante & peu attentive.

Il n'est pas jusqu'à Mr. de Fermat qui n'ait fait quelquefois d'assez mauvaises objections à Descartes, & particulièrement sur la Règle qui apprend à connoître le nombre des Racines positives & négatives d'une Equation. Mais parmi les Savans du siècle passé, nul n'a montré plus d'ardeur pour ôter à Descartes la gloire de l'invention dans cette partie, que le fameux Wallis Professeur de Géométrie à Oxfort, & Auteur d'un Traité Historique d'Algèbre qu'il fit paroître vers la fin de ce même siècle. Si l'on en croit Wallis, c'est à Harriot son compatriote que sont dues presque toutes les découvertes d'Analyse & d'Algèbre qu'on attribue communément à Descartes. Il n'est sorte d'inductions forcées qu'il ne mette en œuvre pour nous le persuader; & cette fameuse Règle qui donne ici matière à nos réflexions, il la trouve clairement contenue dans celles de l'Algébriste Anglois, qui avoit écrit quelques années auparavant: c'est delà, dit-il, que Descartes l'a tirée. Cependant comme il s'en faut beaucoup que cela ne soit clair, & qu'en effet on ne trouve rien dans l'Ouvrage du prétendu Inventeur qui puisse favoriser cette pensée, Wallis passe quelques chapitres après, de ses conjectures sur l'Auteur de la Règle, à l'examen de la Règle même; & alors oubliant tout ce qu'il en avoit dit, & ne doutant plus qu'elle ne soit de Descartes, reconnoissant même formellement qu'elle n'est point dans Harriot, il

ne s'attache plus qu'à la contredire, & à montrer qu'elle est fautive * & erronée. La rai-[†] son qu'il en donne, est que cette Règle n'aⁱⁿ point lieu lorsque l'Equation contient des Racines imaginaires; ce qui est très vrai, mais qui par malheur pour le Critique avoit été visiblement sousentendu, & suffisamment indiqué dans l'endroit où elle est énoncée, sans compter que les Racines imaginaires étant d'une toute autre espèce que celles dont il étoit question, il n'est pas étonnant que les Equations qui en contiennent, sortent de la Règle. Quand un homme comme Descartes a voulu n'être pas clair, on pourroit présumer qu'il en a assez dit pour ne laisser aucune prise contre lui, & l'on devroit du moins peser soigneusement toutes ses paroles avant que de le critiquer. Mais c'est ce que Wallis, Ecrivain d'ailleurs très estimable & d'un profond savoir, n'a point fait; & voila vraisemblablement où l'a conduit un zèle national qui l'animoit dans cette recherche, & qui se manifeste en toute occasion dans son Ouvrage.

Une émulation plus éclairée & l'amour de la vérité engagent aujourd'hui Mr. l'Abbé de Gua à prendre la défense de Descartes contre Wallis, & contre tous les autres Auteurs anciens & modernes qui ont attaqué la Règle dont il s'agit. Ce n'est pas la première fois que Mr. l'Abbé de Gua se déclare en faveur de ce Philosophe & sur pareille matière: il avoit déjà publié un Ouvrage qui a pour objet l'excellence de l'Analyse Cartésienne, & un grand nombre d'usages inconnus auxquels

cette Analyse peut être appliquée, même avec plus de succès que les nouveaux calculs de l'Infini. Ce qu'il donne présentement en est comme une suite, & une suite d'autant plus utile qu'il ne s'est pas borné à justifier la Règle de Descartes par de simples inductions tirées des paroles de ce Philosophe & du fond de la chose : quelques Auteurs tels que Schooten, le P. Prestet de l'Oratoire, & le P. Rabuel Jésuite l'avoient déjà fait avant lui, quoiqu'avec moins de force ; mais Mr. l'Abbé de Gua la développe, il la rappelle à ses principes, &, ce que personne n'avoit encore fait, il la démontre en rigueur. Il en donne même deux démonstrations différentes ; la première qui est la plus étendue & la

* Pag. 95.
324

* plus directe, contient des divisions & des subdivisions de cas, poussées plus loin qu'elles ne le sont communément dans les démonstrations Algébriques. La seconde dépend en partie d'une application singulière de la Géométrie à l'Algèbre. Mais l'une & l'autre exigent un appareil de Lemmes & de Théorèmes dans le détail desquels nous nous dispenserons d'entrer.


SUR LE NOMBRE DES RACINES

Réelles ou Imaginaires, Réelles positives ou Réelles négatives, qui se trouvent dans les Equations de tous les degrés (a).

MR. l'Abbé de Gua qui nous a encore donné ce Mémoire sur les Racines Algébriques

(a) Voyez les Mémoires, page 582.

ques des Equations, y embrasse, comme on voit par ce titre, un champ beaucoup plus vaste que dans le précédent. Il le divise en deux parties dont la première est purement historique, la seconde contient ses propres recherches. Non seulement Mr. l'Abbé de Gua continue dans la première à relever la gloire de Descartes en matière d'Algèbre & d'Analyse, mais il s'attache encore à faire sentir tout ce que ces Sciences doivent à Viète digne précurseur de Descartes dans cette partie, & à quelques autres Auteurs, tant François qu'Italiens & autres, auxquels Wallis toujours animé du même esprit pour sa patrie, n'avoit pas rendu plus de justice qu'au Philosophe François. C'est un morceau d'Erudition Mathématique qu'on peut opposer à l'Histoire de Wallis sur ce sujet. Mr. l'Abbé de Gua y prend l'Algèbre dès sa naissance en Europe, c'est-à-dire, vers la fin du quinzième siècle, & il en suit de là tous les progrès jusqu'à nos jours. La seconde partie du Mémoire renferme des éclaircissmens utiles & curieux sur les Règles d'Algèbre déjà connues, & des idées nouvelles sur l'application qu'on en peut faire aux Equations du 3 & du 4 degré.



* GEOMETRIE.

• Pag.
96. in 4.

SUR DIVERS ELEMENS DE GEOMETRIE,

Publiés cette année par des Membres de l'Académie.

LEs premiers principes de la Géométrie sont si analogues à l'esprit humain, & si près de ce qu'on appelle le sens-commun, qu'il ne faut qu'un peu d'attention pour les découvrir, ou du moins pour les saisir dès qu'ils sont présentés d'une manière intelligible. Ainsi tous les Livres d'Elémens de Géométrie ont fait des Géomètres, ou en ont pu faire, de quelque manière qu'il fussent conçus, & cela dans tous les tems, à compter depuis Euclide jusqu'à nos jours. Parmi ce grand nombre de propositions élémentaires que renferment ordinairement les Traités qu'on en donne, il n'y en a guère qu'une douzaine qui soient comme la clef de toute la Géométrie, & qui étant une fois bien comprises & retenues, sous quelque aspect & dans quelque ordre que ce puisse être, fournissent de quoi s'élever par degrés jusqu'aux vérités géométriques les plus composées. Cependant l'ordre le plus naturel & l'enchaînement des principes dans une Science aussi conséquente que la Géométrie, ne sauroient être négligés sans qu'il n'y

n'y ait à perdre pour ceux qui veulent l'acquérir ; & ne fût-ce que pour en donner le spectacle à l'esprit dès l'entrée , il sera toujours utile d'en rédiger les Elemens sous la forme la plus simple qu'il soit possible , & la plus approchante du progrès ordinaire de nos idées. Aussi les plus grands Géomètres n'ont-ils jamais dédaigné de cultiver la partie élémentaire de la Géométrie , & d'en donner des Traités selon la méthode qu'ils ont jugé la plus conforme à leurs vues , & selon le but qu'ils se sont proposé en faveur des commençans , soit pour la simple théorie , soit pour la pratique , soit par rapport * à la conduite de l'esprit dans la recherche de la vérité. Les 97. in 4.

Géomètres qui sont venus après le renouvellement des Lettres en Europe , n'ont donné pour la plupart que les Elémens d'Euclide traduits , expliqués & commentés ; ce qui , indépendamment de tout ce qu'on peut dire en faveur de l'ordre qu'Euclide y a observé , se trouve encore avoir cela de commode , que comme les Auteurs ne citent presque jamais qu'Euclide lorsqu'ils ont à citer quelque proposition élémentaire , on peut s'en rappeler d'autant plus aisément l'énoncé , qu'on a étudié dans des élémens plus conformes aux siens. Barrow , Tacquet , Deschales , & plusieurs autres beaucoup moins anciens que les premiers Restaurateurs des Sciences Mathématiques , & aussi recommandables par la clarté de leurs Ecrits que par leur savoir , ont aussi adopté la distribution des Elémens d'Euclide. Mais enfin l'ordre des idées qu'on a cru fort différent de celui d'Euclide , a pré-

valu sur la commodité des citations & sur les avantages attribués à l'ancienne méthode, & l'on n'a fait aucune difficulté de suivre de nouvelles routes. Sans compter que la Géométrie étant beaucoup plus répandue aujourd'hui & d'un plus vaste champ, & les propositions élémentaires qui reviennent le plus fréquemment, se réduisant, comme nous avons dit, à un fort petit nombre, tout Géomètre est censé les avoir présentes, & la citation du livre où elles sont démontrées devient superflue. Les Elémens de Géométrie se sont donc multipliés, & ont pris une infinité de formes différentes, selon l'espèce de système que chaque Auteur s'est fait sur cette matière. Il y a des Elémens dans lesquels on a joint au Théorème ou au Problème fondamental, les applications qu'on en peut faire à diverses parties des Mathématiques mixtes, à la mesure du Terrain & aux Arts. Mais nous n'en connoissons point dont la méthode consiste à remonter des applications, de l'usage, & des besoins au Théorème ou au Problème fondamental, & delà aux Axiomes ou premières vérités qui font la base de la démonstration.

C'est sur ce dernier plan que Mr. Clairaut a donné cette année des Elémens de Géométrie au Public. Il a suivi en cela * sans doute le procédé des premiers Inventeurs. Les Hommes ont eu des besoins, & ils ont tâché d'y satisfaire longtems avant que de remonter aux vérités de pure spéculation. Les connoissances secondaires les plus immédiates ont fait d'abord leur objet, & les succès ayant excité leur curiosité, autre besoin à satisfaire,

&

* Pag. 98.
in 4.

& qui n'est pas le moins pressant pour les esprits d'une certaine trempe, la Géométrie & la plupart des Sciences qui en dérivent ou qui la supposent, ont avancé & ont enfin été réduites en corps & en règle. Dans les Elémens ordinaires on débute, dit Mr. Clairaut, par un grand nombre de définitions, de demandes, d'axiomes & de principes préliminaires, qui semblent ne promettre rien que de sec au Lecteur. Les propositions qui viennent ensuite ne fixant point l'esprit sur des objets plus intéressans, & étant d'ailleurs difficiles à concevoir, il arrive communément que les commençans se fatiguent & se rebutent avant que d'avoir aucune idée distincte de ce qu'on vouloit leur enseigner. La nouvelle méthode de Mr. Clairaut sauve ces inconvéniens par sa facilité, & en tenant toujours l'imagination du Lecteur remplie de quelque objet curieux ou utile. Le plan en est exécuté d'une manière très propre à en faire sentir les avantages.

Mr. l'Abbé de Molières a pris une route fort différente, & qui est comme l'inverse de celle qu'on vient de voir, dans les Elémens de Géométrie qu'il a publiés sous le titre de *Traité Synthétique des lignes du premier & du second genre, ou Elémens de Géométrie dans l'ordre de leur génération*. Ces lignes sont la Ligne droite, le Cercle, l'Ellipse, la Parabole & l'Hyperbole. Ce qui caractérise cet Ouvrage est l'attention que Mr. l'Abbé de Molières a eue de ne point s'écarter de cet ordre qu'il annonce. On ne voit encore ici qu'un premier Tome, qui doit être suivi de plusieurs

autres, & qui contient sept leçons dans lesquelles il ne considère que ce qui peut être conçu & démontré par le seul secours de la Ligne droite. & sans l'intervention d'aucune courbe, non pas même du Cercle. C'est apparemment le premier Ouvrage de cette nature avec cette étendue qui ait jamais paru, & où, parmi * plus de deux cens figures qu'il contient, on ne trouve pas un arc de Cercle, si l'on en excepte une seule, où il nous semble que l'Auteur auroit pu s'en passer. Il le pousse cependant jusqu'aux Plans & aux Polygones, jusqu'aux Solides, aux Cubes, aux Prismes, aux Pyramides & aux Polyèdres. Mr. l'Abbé de Molières est si rigide sur la méthode qu'il s'est prescrite, qu'il ne veut pas même admettre d'abord cette demande énoncée ou supposée dans la plupart des Livres d'Elémens de Géométrie, savoir, qu'il soit permis d'imaginer une Ligne droite tracée sur le papier ou sur un plan, moyennant quoi on se propose d'en déduire toutes les autres propositions, & de résoudre toutes les questions qu'on peut faire sur ce sujet. La seule idée d'un fil tendu lui donne tout ce dont il a besoin pour démontrer les propositions élémentaires de la Ligne droite indépendamment du plan. On peut voir dans sa Préface les raisons qu'il a eues de s'en tenir ainsi à l'ordre de génération, ou, comme il l'appelle encore, à l'ordre généalogique. Il y examine en même tems plusieurs autres questions importantes sur la méthode qu'on doit suivre dans ces sortes d'Ouvrages; par exemple, s'il convient d'appliquer le calcul algébrique

* Pag.
99. in 4.

brique aux Propositions & aux Problèmes élémentaires de Géométrie. Il n'y a pas de doute qu'on ne le puisse dans plusieurs cas , & que cet exercice ne soit utile, pourvu qu'on se soit fait auparavant une habitude de la méthode géométrique proprement dite , par la seule inspection des figures, & sur l'idée simple de l'étendue : mais il n'est nullement convenable que des Elémens de Géométrie, destinés par conséquent à donner les premières notions de cette Science , soient démontrés autrement que par la Géométrie même , & qu'avec toute la rigueur & la précision possibles.

L'Analyse de Descartes si universellement & si justement applaudie, eut bientôt le sort des choses les plus excellentes , on en abusa. Tout, jusqu'aux Elémens de Géométrie , fut réduit en Analyse spéculative , & la Synthèse tomba presque dans le mépris. Cet abus est connu aujourd'hui , grâce aux grands maîtres qui l'ont attaqué ; mais l'on trouveroit peut-être encore plus d'un Géomètre, qui, faute Pag. 100. d'habitude, ne sauroit suivre ou donner une in 4. démonstration purement synthétique, sans beaucoup de difficulté. Ceux qui sont dans le cas pourroient en convenir sans honte après le grand Newton : il se plaignoit, dit un de ses amis & de ses plus fameux Disciples (a), de ce que dans ses premières études de Mathématique, & avant que de s'être assez familiarisé la manière de démontrer des Anciens,

(a) Pemberton , *A view of sir Isaac Newtons Philosophy.*

ciens, si belle & si lumineuse, ils s'étoit appliqué à l'Algèbre & à la lecture des Auteurs qui l'ont employée en Géométrie, & il avouoit en avoir souvent senti les inconvéniens dans la composition de ses Ouvrages.

Enfin Mr. l'Abbé de la Caille, Professeur de Mathématique au Collège Mazarin, nous a aussi donné des Elémens de Géométrie dans les *Leçons élémentaires de Mathématique*, qu'il a fait imprimer à l'usage de ses Ecoliers. Ces Elémens sont précédés d'un petit Traité d'Arithmétique & d'Algèbre, le tout fort succinctement, & relativement aux explications que Mr. l'Abbé de la Caille doit y joindre de vive voix.

On peut dire en faveur de ce nombre & de cette diversité d'Elémens de Géométrie qu'on voit paroître, qu'il règne aussi tant de variété dans les esprits, dans leur manière de concevoir & de retenir, dans leurs vues & dans leurs dispositions actuelles, qu'on ne sauroit leur présenter les mêmes vérités sous trop de formes différentes.

SUR LA JAUGE DES TONNEAUX.

UNE des parties de la Géométrie des plus difficiles est la Stéréométrie ou la mesure des Solides, sur-tout lorsqu'ils sont terminés par des surfaces courbes. C'est principalement de ceux-là que nous allons parler ici. La difficulté de cette mesure participe non seulement de celle des surfaces planes curvilignes,

lignes, souvent impossible en rigueur, lorsque les courbes qui les renferment ne sont pas quarrables, comme, par exemple, le Cercle, l'Hyperbole, &c. mais * elle a encore ses difficultés particulières. Tel Solide peut être engendré par la révolution d'une courbe quarrable, dont la cubature sera impossible à cause de cette révolution ou de la rotation qui le fait participer du Cercle. Ainsi un Conoïde parabolique ne peut être *cubé* exactement, quoique la Parabole sa génératrice puisse être quarrée. La Stéréométrie exige aussi dans la résolution de ses Problèmes & dans ses démonstrations, des lignes & des plans tracés ou imaginés dans le Solide, dont l'assemblage est lui-même quelquefois assez difficile à imaginer, & encore plus à rapporter ou à projeter sur le papier qui n'est qu'un plan. Cependant lorsque les Solides sont ou réguliers ou renfermés par des surfaces dont les courbes génératrices sont connues, on en vient sûrement à bout, c'est-à-dire, qu'on en a la valeur exacte ou approchée, & aussi approchée que l'on veut, soit par la Géométrie ordinaire, soit par celle de l'Infini & par le calcul Différentiel & Intégral. Mais si les Solides sont irréguliers & renfermés par des surfaces curvilignes dont les génératrices soient inconnues, il vient alors outre les difficultés précédentes, celle d'imaginer un assemblage de plans, ou la surface courbe, ou les diverses surfaces courbes capables de produire la figure la plus approchante qu'il est possible de celle du Solide donné. C'est dans ce choix & dans cette espèce d'arbitraire que l'adresse & la sa-

* Pag.
101. in 4.

gacité du Géomètre peuvent se montrer. Ce n'est pas tout encore, il faut le plus souvent & lorsque les besoins ordinaires de la vie s'y trouvent intéressés, que cette manière de déterminer la valeur & le contenu du Solide qu'on demande, soit réductible à quelque méthode facile, ou à des Formules, ou à des Tables dont l'usage soit à la portée de gens qui sont pour l'ordinaire très peu Géomètres.

C'est-là l'objet de ce qu'on appelle la Jauge ou le Jaugeage en général, dont celui des Navires, tant par rapport à leur charge qu'aux droits du Roi & de l'Amirauté, & celui des Tonneaux par rapport au commerce des Vins, des Huiles, &c. sont les principales branches. On peut voir dans * l'Histoire & dans les Mémoires de 1721 (a) & de 1724 (b), ce qui fut décidé par l'Académie sur le jaugeage des Navires, lorsque S. A. R. M. le Régent & le Conseil de Marine lui firent l'honneur de la consulter sur ce sujet ; & dans l'Histoire de 1726 (c) il est fait mention d'une méthode de Jauge pour les Tonneaux, présentée par Mr. de Gamaches frère de l'Académicien, où cette matière est traitée avec beaucoup d'exactitude & de savoir.

La jauge des Tonneaux qui est celle dont il s'agit présentement, ne roule pour l'ordinaire que sur leur capacité totale, & les suppose entièrement pleins. Il seroit cependant commode & utile en bien des occasions de con-

* Pag. 102.
in 4.

(a) Voyez l'Histoire, page 54.

(b) Voyez les Mémoires, page 335.

(c) Page 101.

connoître la quantité de liqueur qu'ils contiennent lorsqu'ils n'en sont pleins qu'en partie, ce qui fait un cas difficile par les différens Segmens dont il exige la Cubature. Képler le propose ce cas, dans une *Stéréométrie des Tonneaux* qu'il fit imprimer en 1615 : il exhorte tous les Géomètres à le résoudre, & nommément Snellius qui étoit un des plus fameux de ces tems-là. Mais nul ne l'ayant encore résolu d'une manière satisfaisante pour la pratique, le P. Pézéas Jésuite, Professeur d'Hydrographie à Marseille, a travaillé sur ce sujet, & a envoyé à Mr. le Comte de Maurepas un Mémoire intitulé, *Solution d'un Problème proposé par Képler sur les proportions des segmens d'un Tonneau coupé parallèlement à son axe*. Ce Ministre m'ayant fait l'honneur de me le communiquer & de m'en demander mon avis, je crus cet Ouvrage digne d'être présentée à l'Académie, tant par l'utilité dont il peut être, que par la manière savante dont il est écrit. En voici le précis tel qu'il résulte du rapport que les Commissaires nommés en ont fait, & le jugement qu'en a porté la Compagnie.

Le P. Pézéas suppose avec la plupart des Géomètres qui ont traité de la Jauge, que la moitié du Tonneau coupé perpendiculairement à son axe, ne diffère pas sensiblement d'un Conoïde parabolique tronqué. Mais si l'on coupe un Conoïde parabolique par un plan parallèle à son axe, la section sera toujours une parabole qui aura le même paramètre * que la parabole génératrice du Conoïde : donc un segment de Tonneau pris parallèlement à son axe, ou le vuide que laisse une moitié de Tonneau

* Pag.
103. in 4.

neau couché selon sa longueur, & qui n'est pas entierement plein, pourra être considéré comme rempli par les plans d'une infinité de portions de paraboles, qui toutes ont le même paramètre que celle qui auroit engendré par sa révolution le Conoïde tronqué qui représente la moitié du Tonneau. Ces portions de paraboles décroîtront depuis le plan qui passe par l'axe jusqu'à celui qui touche le sommet de la courbure du Tonneau ou le bondon; & ce sont ces suites de paraboles décroissantes que le P. Pézénas emploie pour trouver la solidité des différens segmens d'un Tonneau. De manière que connoissant la longueur du Tonneau, les diamètres des fonds & du *bouge*, c'est-à-dire, du milieu ou de la partie la plus enflée, & la partie du diamètre du bouge occupée par le liquide, ce qu'on peut toujours très aisément connoître, on aura par le moyen d'une Table dressée sur cette théorie, la solidité du segment vuide que l'on cherche. Il a joint ici cette Table en trois colonnes calculées pour des Tonneaux dont les dimensions auroient différens rapports.

On juge bien que tout ceci n'a pu se faire sans y employer bien de la Géométrie & du calcul. Aussi s'en trouve-t-il beaucoup dans ce Mémoire, & du calcul Différentiel & Intégral dont l'usage paroît être très familier au P. Pézénas.

Il ne s'est pas contenté de démontrer la solution du Problème & sa méthode aux yeux des Géomètres, il a voulu en faire voir la certitude aux plus ignorans. Pour cela il a fait plusieurs expériences, deux desquelles sont rap-

rapportées ici. Dans la première les différences qui se trouvent entre l'épreuve & le calcul sont fort petites, & dans la seconde elles le sont encore davantage ; de sorte qu'il n'est pas douteux que par ce moyen on n'approche extrêmement, & même autant qu'on voudra, de la cubature ou de la valeur du Paraboloïde proposé. On a douté seulement si la pratique qui en résulte, quelque facile qu'elle paroisse avec le secours * des Tables, le seroit ce-
 pendant assez pour ceux qui sont chargés de
 jauger les Tonneaux ; & ce doute communiqué au P. Pézénas nous a valu un second Mémoire de sa part, où, par le moyen d'un quartier de réduction très ingénieux, il lève les difficultés qui pouvoient arrêter les Jaugeurs les moins instruits sur la pratique de sa méthode.

Du reste rien ne prouve mieux l'importance du Problème & la nécessité d'une réforme sur ce sujet, que ce que le P. Pézénas rapporte d'un riche Négociant de Marseille à qui les erreurs du jaugeage causèrent 30 ou 40 mille francs de perte sur des Huiles qu'il avoit fait venir du Levant l'année du grand hiver. Il n'y a rien là dont on doive être surpris quand on fait en quoi consiste la Jauge de Marseille : on voit au contraire par l'examen qu'en a fait le P. Pézénas, qu'elle ne peut être que très fautive, & par-là très ruineuse dans le commerce, soit pour l'acheteur, soit pour le vendeur. Elle est fondée sur la supposition que les Tonneaux sont des cylindres qui ont pour base le grand cercle qui passe par le bondon, ce qui est visiblement faux, & qui peut causer une telle
 erreur

erreur dans leur mesure, que faisant les deux diamètres du milieu & des bouts en raison de 10 à 8, proportion ordinaire des Tonneaux de Marseille, le premier segment trouvé par la Table des Jaugeurs de cette ville, est à celui qu'on auroit dû trouver comme 17 est à 1. Il est vrai que quelques-uns de ces Jaugeurs plus intelligens, voyant que leur Table s'écartoit si énormément de l'expérience, ont pris le parti de diminuer d'un tiers les premiers segments, & d'agir par estime d'après différentes épreuves qu'ils en ont faites; mais leur estime manque absolument à l'égard des segments qu'ils n'ont pas éprouvés. Ainsi il en faut nécessairement venir ou à un nombre presque infini d'expériences, ou à une méthode fixe & lumineuse, telle que nous a paru être celle du P. Pézéas. Combien y a-t-il à faire encore dans les Villes & dans les Etats les mieux policés, pour remédier aux abus que l'esprit de routine & une coutume aveugle entretiennent!

* Pag.
105. in 4.

* Quelques mois avant que le P. Pézéas nous envoyât ses recherches sur la Jauge des Tonneaux pleins & vuides en partie, l'Académie avoit été consultée sur le Tarif de la Jauge des Tonneaux en général, & telle qu'on la pratique à Paris. Mr. Camus l'un des Commissaires nommés par la Compagnie à cet examen, conçut dès-lors l'idée d'un *Instrument propre à jauger les Tonneaux & les autres vaisseaux qui servent à contenir des liqueurs* (a), dont il nous a donné la description & les usages. Les figures qu'on a attribuées jusqu'ici
à nos

(a) Voyez les Mémoires, page 513.

à nos Tonneaux par voie d'hypothèse, peuvent être réduites à trois espèces de Solides connus.

On a regardé le Tonneau comme l'assemblage de deux Cones tronqués qui se joignent par leurs grandes bases.

Ou comme deux Troncs de Paraboloïdes assemblés de même par leurs plus grandes bases; c'est la manière dont nous avons vu que le P. Pézéas le considère.

Ou enfin comme un Spéroïde elliptique allongé & tronqué par ses deux bouts ou sommets, pépendiculairement à son axe, qui est la figure sous laquelle Mr. de Gamaches le considère dans le Mémoire dont nous avons parlé ci-dessus.

Mr. Camus n'admet aucune de ces figures. Il rejette la première, celle qui résulte des deux cônes tronqués, comme s'éloignant trop sensiblement de la figure des Tonneaux; la seconde qui en approche davantage, lui paroît défectueuse en ce qu'elle représente le Tonneau comme tranchant par son milieu; & la troisième pêche selon lui, en ce que les douves du Tonneau y auroient leur plus grande courbure à leurs extrémités, au-lieu que c'est à leur milieu qu'elles sont le plus courbes.

Il a recours cependant à la Parabole comme le P. Pézéas; mais il prend cette courbe en un sens tout différent. Il suppose qu'elle portée par son sommet sur le bondon, d'où il imagine que ses deux branches s'étendent de part & d'autre jusque vers le milieu de chaque moitié du Tonneau, après quoi elle se
termine

* Pag.
106. in 4.


termine comme droite ou tangente jusqu'à chacun des fonds; & c'est par la révolution de cette ligne mixte sur l'axe* même du Tonneau, qu'il imagine que ce vaisseau est formé, comme s'il résulroit d'une infinité de douves de cette figure.

La Verge ou la Bazquette Pithométrique, ou, comme on l'appelle communément, *la Jauge* ou *le Bâton de jauge* est l'instrument dont se servent les Jaugeurs - jurés pour mesurer la contenance des Tonneaux. Ce bâton, qui est ordinairement de bois, & quelquefois de fer, est quarré ou à quatre faces, de 4 à 5 lignes de largeur, & de 4 pieds 2 ou 3 pouces de longueur, qui est la longueur de la Pipe, le plus grand des vaisseaux en usage pour contenir des liqueurs. L'une de ses faces est divisée selon sa longueur en pieds, pouces & lignes; les autres sont marquées de divisions relatives aux différentes espèces de Tonneaux les plus usités dans les païs du commerce: de manière que le Jaugeur ayant pris avec sa jauge une, deux ou trois des principales dimensions du Tonneau d'espèce donnée, par exemple, sa profondeur ou son diamètre vis-à-vis le bondon, & sa longueur, il peut déterminer la capacité de ce Tonneau.

L'instrument ou le Bâton de jauge de Mr. Camus est d'une construction très différente, & d'un usage plus sûr & plus universel. Il sert à mesurer la capacité des Tonneaux supposés, non seulement de la figure que nous avons vu ci-dessus que Mr. Camus leur attribue, mais de figure connue quelconque, Coniques, Paraboloides à deux Conoïdes opposés,

posés, Ellipsoïdes, Cylindriques, Parallélipèdes, &c. & cela avec beaucoup d'exactitude & d'expédition. Aussi est-il chargé de divisions fondées sur une hypothèse moins variable & plus générale.

Il servira également à mesurer la liqueur renfermée dans les vaisseaux qui ne sont pas tout-à-fait pleins; ce qui manque de la liqueur pour les rendre pleins, ou le vuide qui en résulte pouvant aisément être réduit à quelqu'une des figures tronquées dont il est parlé ci-dessus. Par exemple, si le Tonneau qui n'est pas plein est posé verticalement sur un de ses fonds, il est clair que la partie vuide qui se trouvera au-dessus vers l'autre fond, fera un Cone ou un Conoïde tronqué, &c. Tous détails qu'il convient mieux de lire dans le Mémoire même que dans un Extrait.



* ASTRONOMIE.

* Pag. 107.
in 4.

SUR LA HAUTEUR APPARENTE DU TROPIQUE DU CANCER,

Et sur la détermination du Solstice d'Eté (a).

QUELQUE rapport qu'ayent entre eux ces deux Problèmes, & quoique l'un puisse beau-

(a) Voyez les Mémoires, pages 152, 172 & 537.
Hist. 1741. G

beaucoup aider à la solution de l'autre, ils sont pourtant très différens. Dans le premier il s'agit de déterminer en degrés la distance du Tropique à l'Equateur, & d'avoir par-là l'inclinaison ou l'obliquité de l'Ecliptique. Dans le second il faut trouver en parties de tems le moment où le Soleil arrive au Solstice, c'est-à-dire, l'instant où la déclinaison du Soleil qui augmentoit auparavant, cesse d'augmenter & commence à diminuer; ce qui fournit l'époque des mouvemens solaires, la grandeur de l'année, & fait la base des Tables solaires. Ces deux Problèmes ont cela de commun, & ils sont l'un & l'autre d'autant plus importans, que ce qui en fait l'objet est devenu le terme de comparaison, & la mesure de tout ce qu'on a remarqué de semblable dans les autres corps célestes; car c'est à l'Ecliptique qu'on rapporte les inclinaisons des orbites des Planètes & la déclinaison des Fixes, & c'est par la révolution annuelle du Soleil ou de la Terre, qu'on mesure la plupart des autres révolutions ou Périodes Astronomiques.

Il seroit donc étonnant que depuis tant de siècles que les plus fameux Astronomes travaillent à perfectionner ces deux Elémens de la science du Ciel, on ne fût point parvenu à les bien connoître. Et en effet, si l'on vouloit se contenter de la précision que nos pères y desiroient, il semble qu'on pourroit s'en tenir à ce que les observations modernes nous

* Pag. 108.
in 4.

* en ont appris, sur-tout depuis qu'on a trouvé l'art d'appliquer les Lunettes & le Micro-mètre au Quart-de-cercle. Mais ce qui pour-
roit

roit passer en un tems & à certains égards pour une précision scrupuleuse & superflue, ne se trouve être souvent dans la suite & sous d'autres aspects, que l'ébauche grossière de ce qu'exigeroient les nouvelles vues que cette précision a fait naître. C'est-là le progrès naturel des Sciences ou plutôt de l'esprit humain.

L'obliquité de l'Ecliptique nous en fournit un exemple remarquable. On est sûr aujourd'hui de connoître cette obliquité à une demi-minute près ; mais que sera-ce s'il s'agit d'y découvrir une variation qui ne va pas à une seconde par an ? Combien d'années, ou quelle finesse d'observation ne faudra-t-il pas pour la constater ? On sait que Mr. le Chevalier de Louville après avoir comparé les déterminations qui avoient été données de l'obliquité de l'Ecliptique depuis environ deux mille ans, en avoit conclu qu'elle diminueoit d'une minute en 100 ans, de manière qu'en moins de 140000 ans l'Ecliptique se confondroit avec l'Equateur (a). Un système si hardi ne pouvoit manquer de trouver des contradicteurs : il en trouva aussi dans des Astronomes du premier ordre. Mrs. Cassini & de la Hire alléguèrent d'assez fortes raisons pour le rejeter, ou du moins pour le rendre douteux. Les Anciens, disoient-ils, n'avoient que des instrumens fort imparfaits, ils ignoroient totalement les Réfractions Astronomiques ; que conclurre après cela de leurs observations sur un mouvement si lent, si imperceptible, & qui ne peut se

mani-

(a) Voyez l'Histoire de 1716, page 59.

manifester que par une différence angulaire d'une minute en 100 ans ? Cependant cette différence prise sur de grandes masses de tems ou sur un grand nombre de révolutions , & entant qu'elle tombe toujours du même côté , & qu'elle donne presque toujours la diminution d'obliquité de l'Ecliptique , n'a pas laissé de former un puissant préjugé en faveur du systême de Mr. le Chevalier de Louville ; sans compter que plusieurs observations modernes ont paru depuis le confirmer. Mais cette diminution d'obliquité est-elle * continue ? n'y auroit-il pas une espèce de libration qui la feroit varier tantôt en un sens & tantôt dans l'autre ? ou enfin ne seroit-elle pas accidentelle & plutôt physique qu'astronomique ?

*Pag. 109.
in 4.

C'est ce qui vraisemblablement ne pourra être décidé de longtems , & qu'après un grand nombre d'observations. En attendant , Mr. Cassini de Thury nous donne les siennes sur ce sujet , & sur la détermination du Solstice d'Été pour l'année 1740. Elles ont été faites avec un excellent instrument de 6 pieds de rayon , & elles concourent à lui persuader que l'obliquité de l'Ecliptique augmente depuis quelques années , après avoir diminué , & après avoir été , pour ainsi dire , stationnaire pendant quelques autres. Elle étoit il y a dix à douze ans de $23^{\circ} 28' 20''$, & Mr. de Thury l'a trouvée de $23^{\circ} 28' 32''$ en 1740.

A l'égard du Solstice d'Été de la même année , il a dû arriver le 21 Juin vers les 11^h 51 ou $51\frac{1}{2}$ du matin. Mr. de Thury ne se contenté pas de rapporter là-dessus ses propres

pres observations, quoique faites avec grand soin, il y ajoute celles de Mr. Cassini son père, & celles de Mr. le Monnier fils; il les compare toutes avec les résultats de l'excellente méthode que Mrs. Plamstéed & Manfredi ont publiée sur ce sujet, & il laisse ensuite au Lecteur à juger de la préférence qu'on peut donner aux unes plutôt qu'aux autres.

Mr. le Monnier qui avoit travaillé sur la même matière en 1738, & qui s'étoit servi de l'ascension droite des fixes, comparée avec celle du Soleil avant & après le Solstice, pour en conclurre le moment, nous a donné cette année ses remarques, & de nouvelles observations sur l'*Ascension droite d'Arcturus* & de quelques autres Etoiles, en réponse à quelques réflexions qu'on avoit faites à l'Académie sur ses observations de 1738.

La difficulté de déterminer le moment solsticial, vient de ce que la différence en déclinaison & les différentes hauteurs du Soleil quelques jours avant & après le Solstice est presque insensible, & à plus forte raison l'est-elle quelques heures ou * quelques minutes avant & après, autour du Solstice: c'est ce qui oblige d'avoir recours à diverses méthodes indirectes. Il y a grande apparence que les Anciens se contentoient d'observer simplement ces hauteurs, & qu'ils ne pouvoient les avoir que fort imparfaitement par le moyen de leurs *Armilles* ou anneaux Astronomiques. La plus célèbre & la plus ancienne de ces observations dont nous ayons connoissance, est celle qui fut faite à Athènes par Méton & Euctémon, & qui étant réduite à nos épo-

ques, répond au 27 Juin de l'an 432 avant l'Ere Chétienne, &, comme on le conjecture d'après quelques circonstances, vers les cinq heures du matin; car l'heure n'est pas marquée dans les Mémoires qui nous en restent, il est dit seulement que c'étoit le matin; ce qui pouvoit passer alors pour une assez grande exactitude. Du moins est-il certain que du tems de Ptolomée (a), c'est-à-dire, près de six cens ans après, on ne pouvoit, de l'aveu de cet Astronome, s'assurer d'avoir l'heure solsticielle qu'à environ un quart de jour plus ou moins. L'erreur seroit considérable aujourd'hui, avec tous les secours anciens & modernes que nous avons, si l'on s'y trompoit d'un quart d'heure.

SUR LE TROISIEME SATELLITE

DE JUPITER (b).

LEs Satellites des Planètes telles que Jupiter & Saturne, indépendamment de leurs utilités astronomiques & géographiques, en ont encore de purement physiques, & sont peut-être de tous les corps célestes, ceux qui ont le plus servi à nous faire connoître le vrai système du Monde. Leurs révolutions périodiques autour de leur Planète principale, leurs Eclipses ou Immersions dans son ombre, tout-à-fait semblables aux Eclipses de la Lune par l'om-

(a) *Ptol. Alm. Lib. III. cap. 2.*

(b) Voyez les Mémoires, page 1.

l'ombre de la Terre, ont achevé de nous convaincre mieux que n'auroient pu faire tous nos raisonnemens, que la terre & les Planètes ont * à peu-près le même sort dans l'Univers, & que par conséquent il y a plusieurs Terres comme la nôtre, qui roulent selon les mêmes loix autour du Soleil, & la plupart plus vastes, &, à plusieurs égards, mieux partagées que celle que nous habitons. * Pag. III. in 4.

Mais un des plus grands avantages que nous ayons retirés de la découverte des Satellites & du calcul de leurs Eclipses par rapport à la Physique, a été de nous assurer que la propagation de la lumière n'est pas instantanée comme l'avoient pensé les plus célèbres Philosophes des derniers tems, & de déterminer par leur moyen la vitesse de cette propagation.

La propagation non instantanée de la lumière se déduit de l'accélération & du retardement apparens des Eclipses d'un même Satellite, par le tems que la lumière emploie à traverser l'orbe annuel, selon que la Terre est en conjonction ou en opposition avec Jupiter & le Soleil; car il est évident que si la lumière ne se répand pas en un instant indivisible lorsque nous sommes plus éloignés de Jupiter de tout le diamètre de l'orbe annuel, l'immersion & l'émergence du Satellite doivent se faire sentir plus tard à notre œil, de tout le tems que la lumière emploie à parcourir ce diamètre, ce qui va à environ 22 minutes. L'irrégularité qui en résulte dans le retour des Eclipses des Satellites, est ce qu'on appelle leur seconde Inégalité, qu'on peut nom-

mer aujourd'hui à juste titre , l'Inégalité ou l'Equation de la lumière ; car l'Equation en Astronomie est la quantité additive ou soustractive , ou la correction qu'exigent les lieux où les mouvemens observés des Astres , pour être réduits en moyens ou en réels par rapport au centre de la Terre ou à celui du Soleil. Ainsi voila une Equation astronomique d'une espèce toute nouvelle & absolument inconnue aux Anciens.

Mr. Roëmer, qui en est regardé comme l'inventeur , parce qu'il l'a toujours constamment soutenue, en fit part au Public dans le Journal des Savans du 7 Décembre 1676, après en avoir lu une Dissertation à l'Académie le 22 Novembre précédent. Il paroît cependant par l'Histoire * Latine de Mr. Duhamel (a), que feu Mr. Cassini en avoit eu l'idée avant ce tems-là, & qu'il en avoit publié dès le 22 Aout 1675 un petit Ecrit devenu très rare, & dont Mr. Duhamel rapporte la teneur.

C'est le premier Satellite de Jupiter , le mieux connu de tous, qui fut d'abord l'occasion & presque toujours l'objet principal de l'Equation de la Lumière: car quoique la même théorie doive s'étendre à tous les Satellites, les difficultés & les irrégularités particulières que l'on trouva dans les trois autres, empêchèrent qu'on n'y reconnût l'Equation de la Lumière: le second sur-tout y parut si contraire , que Mr. Cassini & après lui feu Mr. Maraldi, se crurent fondés à la rejeter,

ou

(a) Page 148.

*Pag. 112.
in 4.

ou à la tenir du moins pour très douteuse ; ils aimèrent mieux en attribuer l'effet à des causes purement astronomiques , telles , par exemple , que l'inclinaison ou l'excentricité des orbites de ces Planètes secondaires. Mr. Maraldi écrivit même formellement & à diverses reprises contre l'idée de Mr. Roëmer sur ce sujet (a).

Mais Mr. Maraldi neveu du précédent , & petit neveu de feu Mr. Cassini , ayant repris le fil de leurs observations , & y ayant ajouté les siennes , n'a pas jugé comme eux de la seconde Inégalité des Satellites. La juste réputation que ces deux grands Astronomes se sont acquise & les liens du sang n'ont pu le retenir dans un sentiment qui se trouve démenti aujourd'hui par les observations les plus ingénieuses & les plus exactes. L'*Aberration* des Fixes (b) , découverte par Mr. Bradley de la Société Royale de Londres , & constamment attribuée à la propagation successive de la Lumière , s'accorde si parfaitement avec la théorie de Mr. Roëmer sur le retardement & l'accélération des Eclipses des Satellites , qu'il n'est pas possible d'y méconnoître la même cause. Mr. Maraldi donna l'année dernière un Mémoire sur la durée des Eclipses du second & du troisième Satellite de Jupiter , d'après les observations qu'il en avoit faites en 1739 & au commencement de 1740 , avec des réflexions sur le mouvement du second Satellite.

(a) Voyez les Mémoires de 1727, page 32, de 1727, page 493, de 1729, page 551.

(b) Voyez l'Histoire de 1737, page 104.

tellite. Il donne présentemet de nouvelles
 * Pag. * observations sur les Eclipses & sur le mou-
 113, in 4. vement du troisième.

Le premier Satellite de Jupiter, par cela même qu'il en est le premier ou le plus proche, ne permet jamais d'observer qu'une des phases de ses Eclipses, son Immersion dans l'ombre, ou son Emerision, & par conséquent nous n'en saurions observer la demeure; car l'ombre de Jupiter nous étant toujours opposée, tantôt plus & tantôt moins, tantôt d'un côté & tantôt de l'autre, nous ne saurions voir la partie de cette ombre ou de la base du cône qu'elle forme tout proche du disque éclairé de la Planète. Or le premier Satellite est toujours renfermé dans les limites de cette partie de l'ombre qui nous est cachée; ainsi nous ne voyons que ses Immersions pendant que la Terre parcourt une moitié de l'orbe annuel, & ses Emerisions lorsque la Terre parcourt l'autre moitié. Il seroit cependant très avantageux d'avoir la durée des Eclipses, non seulement parce qu'elle double le nombre de ces sortes d'observations, mais encore parce que c'est en comparant la plus longue & la plus courte durée des Eclipses d'un Satellite, que l'on en conclut l'inclinaison de son orbe sur l'orbe de sa Planète principale: élément de calcul très important dans la matière dont il s'agit.

Ce que nous venons de dire du premier Satellite de Jupiter, a lieu pour le second, si l'on en excepte quelques cas particuliers qui sont très rares.

Mais le troisième offre à l'observateur tout
 ce

ce qu'il y a de plus favorable pour éclaircir les difficultés qu'on a faites contre l'Equation de la lumière. Ses Eclipses ne sont pas à beaucoup près aussi fréquentes que celles du premier & du second, mais il y en a un grand nombre dont on peut voir le commencement, la fin & la durée. Il est vrai que le quatrième l'emporteroit sur celui-ci par cet avantage qui lui vient de son plus grand éloignement de Jupiter, mais ses Eclipses sont plus rares. Pour se faire une idée du résultat de cette compensation, il n'y a qu'à voir que dans cette année 1741, par exemple, on trouve 45 Eclipses du troisième, * parmi lesquelles il y en a 33 qui donnent l'immersion & l'émerſion, & 12 seulement qui ne donnent que l'une ou l'autre de ces deux phases. Il est vrai que le 4 Satellite n'a dans toute l'année que deux Eclipses qui soient dans ce dernier cas, mais aussi n'en a-t-il que 18 en tout. A quoi l'on peut ajouter que la demeure dans l'ombre ou la durée des Eclipses du 3 Satellite étant ordinairement plus courte que la durée des Eclipses du 4, parce que son mouvement est plus prompt, & plus prompt en plus grande raison que les grandeurs des diamètres du cône d'ombre, qui répondent à leurs orbites, l'observateur doit avoir plus souvent la faculté de voir sur un même horizon ou dans une même nuit, le commencement & la fin des Eclipses du 3 Satellite de Jupiter que du 4. Ainsi Mr. Maraldi est fondé à dire que le 3 est de tous les Satellites de Jupiter celui qui fournit le plus de moyens d'éclaircir & de constater la théorie dont il s'agit.

* Page
114. in 4.

La difficulté est de démêler le retardement qui appartient à la propagation successive de la Lumière, & celui qui n'a pour cause que l'inclinaison des orbites ou quelques autres irrégularités. Le peu d'inclinaison de l'orbite du premier a rendu d'abord le retardement de la Lumière très sensible & non équivoque. La grande inclinaison du second au contraire a fait confondre les deux causes, & a donné lieu de soupçonner quelque chose d'équivalent, mais d'inconnu à l'égard du premier. Mr. Maraldi fit voir l'année dernière que le second Satellite est sujet à une inégalité synodique, qui monte à 24 minutes de tems, tantôt additive, tantôt soustractive, & que la variation de l'inclinaison de son orbe pouvoit produire dans ses Eclipses une inégalité de 22 minutes, qui est, comme nous l'avons dit, le plus haut point où puisse aller le retardement causé par la propagation successive de la Lumière. Une compensation si juste de la nouvelle Equation & qui n'avoit pas échappé à feu Mr. Maraldi, étoit sans doute très capable de le confirmer dans ses idées contre l'Equation de Mr. Roëmer. C'est à-travers toutes ces difficultés, qui se compliquent encore

* Pag. avec quelques * apparences purement opti-
 115. in 4. ques, telles que l'étendue & l'intensité de Lumière des Satellites dans leurs phases, dont Mr. de Fouchy donna la théorie en 1732, que Mr. Maraldi a entrepris de démêler & de constater l'Equation de la Lumière. Il a calculé à ce dessein près de 300 observations d'Eclipses du troisième Satellite de Jupiter, & c'est d'une partie de ces observations qu'il nous

nous donne ici la Table relativement à l'inclinaison de l'orbe de ce Satellite, ses nœuds étant supposés à $14^{\text{d}} 30'$ du Lion & du Verseau, & le demi-diamètre de l'ombre vu du centre de Jupiter à la distance de l'orbe, de $3^{\text{d}} 44'$.

Si la propagation successive de la Lumière est réelle & sensible à la distance de Jupiter, comme on ne peut plus en douter aujourd'hui par l'observation des Fixes, il faut nécessairement que ses effets se mêlent dans les Eclipses des Satellites vus de la Terre, & toute théorie où ces effets n'entreront pour rien, sera défectueuse; mais l'art de les indiquer sûrement & de les évaluer dans tous les cas parmi ce grand nombre d'autres circonstances qui se confondent avec eux & qui les font souvent disparoître, ne sera le fruit que d'une infinité d'observations & de travaux.

SUR LE CALCUL INFINITESIMAL.

Des différences dans la Trigonométrie sphérique, par rapport à l'Astronomie (a).

DANS les Mathématiques mixtes, telles que l'Astronomie, il se présente à tout moment des recherches très délicates à faire pour en rectifier ou pour en simplifier la pratique; ce sont autant de nouvelles théories qui se confondent avec la science même par leur commun objet qui est la justesse, la facilité

(a) Voyez les Mémoires, page 324.

facilité & la promptitude des opérations. Les opérations astronomiques consistent dans les observations immédiates, & dans les calculs qui en donnent les résultats. *On voit assez que quelque exactes que soient les observations, il n'est pas possible qu'il ne s'y glisse quelque erreur, soit par l'imperfection des instrumens qu'on y emploie, soit par la foiblesse de nos organes, pour qui même des instrumens trop parfaits & poussés jusqu'à un certain degré de finesse pourroient devenir inutiles. A l'égard des calculs ils sont par eux-mêmes & spéculativement parlant, infail-
 *Pag. 116.
 in 4.

libles, entant qu'ils dérivent des opérations arithmétiques; mais leur résultat est plus ou moins susceptible d'erreur, par la nature des cas auxquels on les applique, par les hypothèses sur lesquelles ils sont fondées, par le différent aspect sous lequel on considère les observations qui en font la matière, & enfin par la méthode plus ou moins lumineuse qui en conduit les pas.

L'art de démêler les sources d'erreur, d'en évaluer les effets, & d'assigner les cas & les circonstances où l'erreur est plus ou moins grande, &, s'il est permis de le dire, plus ou moins commissible, seroit presque l'art de nous en affranchir s'il pouvoit arriver jusqu'à un certain degré de perfection & être appliqué à toutes les Sciences. Mais ce n'est guère que dans les Mathématiques qu'on peut se flater de l'introduire avec quelque succès.

Il y a environ 30 ans qu'un des plus profonds Géomètres d'Angleterre (a), composa

dans

(a) Roger Cotes, mort en 1716, à l'âge de 34 ans.

dans cet esprit & principalement en faveur des Astronomes, un Traité qui a été imprimé avec ses Œuvres posthumes, & qui a pour titre, *Estimation des erreurs dans les Mathématiques mixtes, par les variations des parties des Triangles plans & sphériques*. Mais outre que ce Livre est assez rare, il est peut-être encore plus difficile à entendre, par la manière concise, pour ne pas dire obscure, dont il est écrit. Ainsi Mr. l'Abbé de la Caille que son application à l'Astronomie théorique & pratique met tous les jours en état de sentir les besoins des Calculateurs en cette science, a jugé avec raison que ce seroit rendre un grand service à plusieurs d'entre eux, d'extraire, d'éclaircir & d'étendre toutes les formules du Traité dont nous venons de parler, qui ont rapport à l'Astronomie, ou, ce qui revient au même, à la * résolution des Triangles sphériques, & dont il a aussi fait voir l'usage & l'utilité par des exemples choisis. ^{*Pag. 117. in 4.}

On imagine ici que deux côtés du Triangle ou deux de ses angles, ou un angle & un côté demeurant constans, un autre côté ou un autre angle varie continuellement & à chaque instant d'une quantité, ou par une différence infiniment petite; ce qui appartient au calcul différentiel, & qui fait le fond de la méthode & de la théorie; mais la pratique sera dispensée d'avoir recours à ce calcul, par les formules ou simples analogies que Mr. l'Abbé de la Caille y a substituées, & qu'il a réduites à la forme ordinaire du calcul purement trigonométrique, communément plus familier aux Astronomes. C'est-là véritablement travailler

vailler pour le Public, & perfectionner l'art, qui ne sera jamais si parfait que quand il exigera moins d'industrie & de savoir de la part de l'Artiste.

NOUS renvoyons aux Mémoires

L'Eclipse de Lune observée le 13 Janvier 1740, à l'Hermitage qui est sur la montagne de Sainte-Victoire, à trois lieues vers l'Orient d'Aix en Provence, par Mr. l'Abbé de la Caille, lorsqu'il travailloit avec Mr. de Thury à la vérification de la Méridienne de l'Observatoire prolongée jusqu'aux extrémités de la France (a).

PARAL-
LAXE de la
LUNE.

MR. de Maupertuis a donné cette année son *Discours sur la Parrallaxe de la Lune*. C'est en partie le fruit & la suite des fameuses observations du Nord. Cet Ouvrage a pour but, 1. L'usage qu'on peut faire de la mesure de quelques arcs de la surface de la Terre, pour perfectionner la Géographie & la Navigation; 2. L'utilité qu'on peut tirer des expériences du Pendule, pour déterminer les quantités & les directions de la Pesanteur sur différens points de la Terre; 3. Et enfin la manière dont on doit se servir des dimensions du Globe terrestre pour perfectionner la théorie de la Lune. Mr. de Maupertuis y ajoute un abrégé ou extrait des opérations qui ont été

(a) Voyez les Mémoires, page 579.

été faites à Torneà pour la mesure * du degré du Méridien auprès du cercle Polaire, & de quelques expériences sur la Pesanteur, telle qu'on la déduit des différentes longueurs du Pendule à différentes Latitudes.

* Pag.
118. in 4.

La Parallaxe de la Lune n'est autre chose que l'angle sous lequel seroit vu le demi-diamètre de la Terre observé du centre de la Lune, ou, ce qui revient au même, l'angle que formeroient les rayons visuels dirigés au centre de la Lune par deux observateurs, dont l'un seroit sur la surface, & l'autre au centre de la Terre. De ces deux lignes, de l'angle compris & du demi-diamètre de la Terre qui en est la base, résulte un triangle dont deux côtés quelconques, & un des angles étant donnés, on aura le troisième côté & les deux autres angles. D'où il est clair que la distance de la Lune, le demi-diamètre de la Terre & l'angle Parallaxique sont trois quantités réciproques, qui étant connues deux à deux, fourniront toujours de quoi connoître la troisième qu'on cherche. Aussi confond-t-on quelquefois dans le langage astronomique la distance de la Lune, soit optique, soit réelle, avec sa Parallaxe, entant que celle-ci renferme la supposition ou la connoissance du demi-diamètre terrestre.

- Tant qu'on a considéré la Terre comme une Sphère sensiblement parfaite, on n'a point cru que la Parallaxe de la Lune pût recevoir d'autre variation que celle qui lui survient par les différentes distances de cet Astre à la Terre, selon qu'il est à son Apogée, à son Périgée ou à ses distances moyennes; parce qu'alors

qu'alors le demi-diamètre terrestre est une grandeur constante. Mais dès que la sphéricité parfaite n'a plus lieu, & que la Terre devient, comme on le pense aujourd'hui, un Sphéroïde, soit oblong, soit applati vers les Poles, il est évident que la Parallaxe lunaire variera encore à raison des différens demi-diamètres terrestres qui soutendront l'angle Parallactique, & qui doivent être pris depuis le centre jusqu'au point de la surface du Sphéroïde où est placé l'observateur : car ces demi-diamètres ne sauroient être égaux entre eux si ce n'est sous l'Equateur, ou de part & d'autre sous de semblables Parallèles ; ils varient sur tous les autres points.

* Pag. 119. in 4. * On voit par-là combien l'observation de la Parallaxe lunaire exige aujourd'hui de nouvelles attentions, & combien les conclusions qu'on en peut tirer par rapport aux distances de la Lune, ou à la grandeur & à la figure réciproques de la Terre, supposent de finesse dans la théorie & dans les calculs. A peine cependant s'appercvra-t-on de cette complication dans l'Ouvrage dont il s'agit, par la brieveté & la netteté des démonstrations qu'il contient. Mr. de Maupertuis y considère la Terre sous la forme du Sphéroïde applati qu'il s'est si bien aquis le droit de préférer à tout autre ; & c'est à la suite & en conséquence de cette hypothèse qu'il résout les principaux Problèmes que renferment les trois objets qu'il s'étoit proposés.

QUOIQUE depuis le renouvellement des HISTOIRE
CÉLESTE. Sciences en Europe on ait vu paroître une infinité de Recueils d'observations astronomiques, il n'y en a que trois ou quatre qui, par le nombre & l'importance des observations qu'ils contiennent, ayent mérité le titre d'*Histoire Céleste*. Le premier Ouvrage qui ait été donné sous cette forme est un Recueil des observations de Tycho-Brahé : il ne manque à la *Machine Céleste* d'Hévélius, que le nom d'Histoire pour faire le second; l'*Histoire Céleste Britannique* de Flamstéed sera le troisième; & enfin nous aurons le quatrième dans l'*Histoire Céleste ou Recueil de toutes les observations astronomiques faites par ordre du Roi*, & qu'on pourroit justement qualifier d'Histoire Céleste François, dont Mr. le Monnier vient de nous donner le premier Volume.

Il y embrasse tout ce qui fait l'objet de ces sortes d'Histoires, Passages des Planètes par le Méridien, Eclipses de Soleil & de Lune, Immersions & Emerfions des Satellites, Diamètres apparens des Astres, Occultations des Fixes par la Lune, Longitudes, Latitudes, Ascensions droites & Catalogues d'Etoiles, &c. depuis l'année 1666, qui est celle de l'établissement de l'Académie, jusqu'en 1685 inclusivement, où se termine ce premier Volume.

* La plupart de ces observations, quoique *Pag. 120.
in 4. employées peut-être sous différens points de vue par les Auteurs qui les ont faites, demeuroient éparfées & comme ensevelies dans des

des Recueils informes ou dans les anciens Registres de l'Académie. C'étoient les pièces justificatives de plusieurs résultats auxquels elles avoient servi de base, & qu'on reservoit en même tems pour d'autres besoins à venir. Mrs. Picard, Auzout, Cassini, Roëmer, de la Hire, & en dernier lieu le Chevalier de Louville, nous ont laissé des richesses immenses dans ce genre, mais qu'il n'étoit pas aisé de recueillir d'une manière utile pour la postérité, sans beaucoup de travail, de choix & de lumières. C'est ce que l'on verra dans le Discours préliminaire qui est à la tête, & encore mieux par l'exécution de ce vaste projet.

D I V E R S E S
O B S E R V A T I O N S
A S T R O N O M I Q U E S.

I.

Sur la Théorie de Saturne.

LA Théorie d'une Planète consiste dans la connoissance de tout ce qui peut servir à déterminer ses mouvemens vrais ou apparens, en quelque tems qu'on les demande; ses Conjonctions, ses Oppositions & ses Configurations quelconques par rapport à la Terre, au Soleil & aux autres Planètes; la durée de
ses

ses révolutions autour du Soleil & de la Terre ; ses différentes distances , & par conséquent la figure , la grandeur & l'excentricité de son orbite ; ses Anomalies ou Irrégularités , soit optiques , soit réelles ; le Lieu de son Aphélie & de son Périhélie , de son Apogée & de son Périgée , &c. autant d'articles de la Théorie de Saturne , sur lesquels Mr. l'Abbé de la Caille Professeur de Mathématique au Collège Mazarin , est venu lire ses remarques à la Compagnie.

* L'Opposition de Saturne avec le Soleil , ^{* Pag. 121 ;} arrivée le 24 Janvier de cette année , suivant l'observation que Mr. l'Abbé de la Caille en avoit faite lui-même à l'Observatoire Royal , a été l'occasion de tout ce qu'il nous a donné sur ce sujet.

Quoique la Théorie de cette Planète soit la plus facile de toutes à déduire immédiatement des observations , c'est celle cependant qui peut fournir le plus de doutes.

Cette facilité vient de ce que Saturne est de toutes les Planètes supérieures celle dont on peut avoir le plus souvent des positions indépendantes de la seconde Inégalité , c'est-à-dire , dont les Oppositions arrivent le plus souvent : car il n'y a guère plus de 378 jours d'intervalle entre deux de ces Oppositions , au-lieu qu'entre celle de Jupiter il y a 400 jours , & qu'il se passe 2 ans & 50 jours entre celle de Mars. On appelle première Inégalité d'une Planète , l'irrégularité apparente du mouvement qui naît de sa révolution autour du Soleil , entant qu'on imagine l'Observateur placé dans cet Astre ; & seconde Inégalité

égalité celle qui se complique avec son mouvement vu de la Terre. L'Astronomie n'est, à proprement parler, que la Science des apparences célestes réduites au calcul ; ce qui s'y mêle de causes réelles & mécaniques, n'est pas oublié par les Astronomes quand ils sont assez heureux pour le découvrir ; mais ce n'est, à la rigueur, que l'affaire de la Physique.

La facilité de déduire la Théorie de Saturne des observations immédiates, vient encore de ce qu'on peut observer 29 points de l'orbite de Saturne pendant une seule de ses révolutions, au-lieu qu'on n'en peut observer que 11 de Jupiter, & que Mars fait souvent une révolution entière sans qu'on puisse observer une seule de ses Conjonctions avec le Soleil ; car c'est par le moyen des Conjonctions, des Aphélies, & autres semblables points importants marqués sur la route de ces vastes corps, qu'on peut le mieux déterminer la nature & la quantité de leur mouvement.

Enfin cette plus grande facilité est fondée sur ce que Saturne ne parcourant d'une Conjonction à l'autre qu'environ * 13 degrés & 122. in 4 demi de son orbite, il est aisé de connoître soixant-trois points pour un instant quelconque compris entre plusieurs observations d'Oppositions consécutives ; ce qui donne l'équivalent de plusieurs observations immédiates qu'on auroit faites dans l'Aphélie & le Périhélie de cette Planète, dans ses distances moyennes, dans ses Nœuds, c'est-à-dire, aux points où son orbite coupe l'Ecliptique, & dans ses limites qui sont les points

* Pag.

points les plus éloignés de ses Nœuds & de l'Ecliptique.

Voici présentement les principaux doutes qu'on peut former sur la Théorie de Saturne, & dont la discussion fait le sujet du Mémoire de Mr. l'Abbé de la Caille.

1. Si la ligne qui joint les Nœuds de cette Planète passe par le Soleil, ou, ce qui est la même chose, si l'angle de l'inclinaison des Limites vu du Soleil est le même de part & d'autre vers l'un & l'autre Pole. Car la plupart des Physiciens qui ont appliqué la Géométrie à l'Astronomie, regardent cette égalité comme certaine; mais il semble que Mr. de la Hire ait observé le contraire, puisque dans ses Tables Astronomiques, il fait la distance ou l'angle d'inclinaison des Limites boréales vu du Soleil, plus petit de $3\frac{1}{2}$ que celui de l'inclinaison des Limites australes.

2. Si le mouvement de cette Planète n'est pas considérablement altéré lorsqu'elle approche de sa Conjonction avec Jupiter, comme il suit des nouvelles Théories physiques.

3. Si le mouvement de son Aphélie est uniforme comme dans les autres Planètes principales, soit qu'on le suppose réel, soit qu'on l'attribue à la Précession des Equinoxes.

Sur le premier de ces doutes Mr. l'Abbé de la Caille se détermine pour l'affirmative; il croit que l'hypothèse de Mr. de la Hire ne peut subsister, & que les angles d'inclinaison des Limites australes & boréales de Saturne sont égaux. Cependant comme le nom d'un si grand Astronome méritoit bien qu'on ne rejetât pas son opinion sans un examen approfondi

- fonda de tout ce qui pouvoit la favoriser ou la combattre , Mr. l'Abbé de la Caille s'est acquitté de ce devoir à l'avantage du Lecteur.

* Pag. 123.
in 4.

* Quant à la seconde difficulté sur le trouble que la Conjonction de Saturne avec Jupiter peut apporter à son mouvement, Mr. l'Abbé de la Caille pense qu'il est réel, & il le prouve par les observations. On fait que cette idée est due au célèbre Newton, & qu'elle est fondée sur l'attraction mutuelle que les deux Planètes doivent exercer l'une sur l'autre, avec d'autant plus de force qu'elles sont plus proches. Le plus important étoit de constater le fait, après quoi il sera permis à chacun, selon ses lumières, d'expliquer l'attraction, cet effort réciproque de deux corps l'un sur l'autre, ou par une vertu purement métaphysique, ou par une impulsion dont le mécanisme nous est encore inconnu. Cependant Mr. l'Abbé de la Caille croit pouvoir conclure de tout ce qu'il rapporte sur ce sujet, que cette cause d'altération au mouvement de Saturne est peu sensible, & qu'elle ne peut empêcher qu'on n'établisse des hypothèses exactes du mouvement de cette Planète.

Il ne pense pas de même sur le troisième doute qu'il s'étoit proposé d'examiner, savoir, si le mouvement de l'Aphélie est uniforme. Il croit qu'on ne peut absolument ni rejeter ni admettre cette uniformité, & que c'est-là en même tems le plus grand ou le seul obstacle à la perfection des Tables de Saturne.

Mais nous nous dispenserons d'entrer dans les

les curieux détails que Mr. l'Abbé de la Caille nous a donnés sur cet article comme sur tous les autres , & d'autant plus qu'ayant été reçu quelques mois après à l'Académie, il pourra lui-même , s'il le juge à propos, faire part au public de son Mémoire, en le joignant à ceux que l'Académie fait imprimer tous les ans; on peut avoir remarqué ci-dessus (a) qu'il a déjà joui de ce privilège dans ce même Volume.

Il est certain par les observations modernes comparées avec celles des Anciens depuis environ deux mille ans , que le mouvement de Saturne paroît sensiblement ralenti, tandis que celui de Jupiter s'est accéléré. Ce seroit matière à une grande & belle recherche que de savoir si cette circonstance * entre comme ^{* Pag. 124.} cause ou comme effet dans les irrégularités ^{in 4.} dont nous venons de parler.

II.

Sur un Satellite aperçu auprès de la Planète de Vénus.

La Terre a un Satellite qui est la Lune , Jupiter environ cinq fois aussi loin du Soleil que la Terre en a quatre, & Saturne près de deux fois aussi loin que Jupiter en a cinq, sans compter l'Anneau qui lui tient lieu de plusieurs Satellites , pour l'éclairer pendant la nuit. L'esprit systématique , la commodité des analogies & le penchant que nous avons à faire

(a) Pages 157, & 160.

faire agir la Nature selon nos vues & nos besoins, n'ont pas manqué là-dessus de persuader à bien des Philosophes que les Satellites avoient été donnés aux Planètes les plus éloignées du Soleil, comme un supplément à sa lumière affoiblie par l'éloignement, & qu'ils leur avoient été donnés en d'autant plus grand nombre qu'elles étoient plus éloignées de cet Astre. Mais la Planète de Mars vient rompre la chaîne de l'analogie, étant beaucoup plus loin du Soleil que nous, & n'ayant point de Satellite, du moins ne lui en a-t-on pu découvrir aucun jusqu'ici, quelque soin qu'on se soit donné pour cela. A l'égard des Planètes inférieures, Vénus & Mercure, on a cru qu'elles n'en avoient point & qu'elles n'en devoient point avoir, étant beaucoup plus proches du Soleil que la Terre; elles sont aussi le plus souvent confondues dans ses rayons, & cette circonstance n'augmente pas peu la difficulté de découvrir ce qui les environne.

Cependant feu Mr. Cassini aperçut en 1686 auprès de Vénus, quelque chose qui avoit toutes les apparences d'un Satellite; c'est dans son Traité de la Lumière Zodiacale qu'il le rapporte. Il venoit d'observer cette Lumière le 28 Aout à 4 heures 15 minutes du matin, lorsqu'en regardant Vénus par une Lunette de 34 pieds, il vit à trois cinquièmes de son diamètre vers l'Orient, une *lumière in-*
forme de toute autre * espèce, & qui sembloit imiter la phase actuelle de Vénus, dont le disque étoit échancré du côté de l'Occident. Le diamètre de ce *Phénomène* étoit à peu-près égal à la quatrième partie du diamètre de Vénus.

nus. Mr. Cassini l'observa pendant un quart d'heure, après quoi il ne le vit plus, sans doute par la clarté du jour ou du crépuscule, qui étoit grande. Il ajoute que le 25 Janvier de l'année 1672, il avoit vu une apparence toute semblable depuis 6 heures 52 minutes du matin jusqu'à 7 heures 2 minutes, où la clarté du crépuscule la fit évanouir, Vénus étoit de même en croissant & le *Phénomène* aussi; de manière que quelque réservé que fût Mr. Cassini sur les nouveautés astronomiques, il ne put s'empêcher après ces deux observations, de douter du moins si ce ne seroit point là un Satellite de Vénus, *d'une consistance moins propre à réfléchir la lumière du Soleil* que la Planète principale, & qui auroit à peu-près la même proportion avec Vénus que la Lune a avec la Terre. Mr. Grégori en parle plus affirmativement dans l'endroit de son *Astronomie Physique*, Liv. 6, où il examine quelles seroient les apparences du Ciel vu de Vénus, & il croit plus que vraisemblable d'après les deux observations de Mr. Cassini, que c'est en effet un Satellite de cette Planète.

Ce qui est surprenant, c'est que quelques recherches que Mr. Cassini ait faites depuis en divers tems, *pour achever une découverte de si grande importance*, il n'a jamais pu y réussir, & nul autre Astronome que nous sachions, dans l'espace de 54 ans, n'a pu voir ce Phénomène après lui, non pas même Mr. Bianchini célèbre par ses découvertes sur la Planète de Vénus, quoiqu'il y ait employé d'ex-

cellentes Lunettes de Campani de plus de 100 pieds de longueur.

Voilà où l'on en étoit sur le Satellite vrai ou apparent de Vénus, lorsque M. Short Ecossais, également habile à construire des Télescopes & à s'en servir pour les observations astronomiques, revit enfin l'année dernière ce Satellite, si c'en est un, dans les mêmes circonstances & avec les mêmes phases que M. Cassini a décrites. C'est ce que j'ap-

* Pag.
126. in 4.

pris au * commencement du mois de Janvier de cette année, par Mr. Coste Auteur de la Traduction du livre de l'Entendement Humain de Locke, & de plusieurs autres Ouvrages; j'en fis part à l'Académie, & cette Compagnie me chargea de m'informer plus particulièrement de cette observation & de ses suites, & de lui en rendre compte. Mais par malheur la nouvelle apparition du Satellite de Vénus, trop semblable en cela aux deux premières, n'a pas été plus constante. Mr. Short n'avoit pu encore le revoir au mois de Juin dernier. Son observation fut faite à Londres le 3 Novembre 1740 au matin, avec un Télescope par réflexion de 16½ pouces Anglois, & qui augmentoient 50 à 60 fois le diamètre de l'objet: Mr. Short aperçut d'abord comme une petite Etoile fort proche de Vénus, sur quoi ayant adapté à son Télescope un plus fort Oculaire & un Micromètre, il trouva la distance de la petite Etoile à Vénus de 10 minutes 20 secondes. Vénus paroissant alors très distinctement & le Ciel étant fort serein, il prit des Oculaires trois ou quatre fois plus forts, & il vit avec une agréable surprise que la

la petite Etoile avoit une phase , & la même phase que Vénus ; son diamètre étoit un peu moins que le tiers de celui de Vénus , sa lumière moins vive , mais bien terminée ; le grand Cercle qui passoit par le centre de Vénus & de ce Satellite, qu'il seroit difficile de qualifier autrement, faisoit un angle d'environ 18 à 20 degrés avec l'Equateur , le Satellite étant un peu vers le Nord , & précédant Vénus en Ascension droite. Mr. Short le considéra à différentes reprises & avec différens Télescopes, pendant l'espace d'une heure de tems, jusqu'à ce que la lumière du jour ou du crépuscule le lui ravit entièrement. Ces circonstances sont tirées d'une Lettre de Mr. Turner, écrite de Londres le 8 Juin à Mr. Coste.

Un Corps céleste si difficile à apercevoir de la Terre , ne paroît point être fait pour nous , & l'on ne sauroit guère se défendre d'en conclurre qu'il est donc destiné à éclairer un autre Monde & d'autres Habitans. L'analogie à cet égard, prise en général , ne laisse rien à désirer.

* Mais nous remarquerons ici qu'elle pour-
roit n'être pas si bien fondée cette analogie, à l'égard du nombre des Satellites , qu'on croit devoir être d'autant plus grand que la Planète principale est plus éloignée du Soleil. Nous avons déjà vu qu'elle se démentoit par rapport à la Planète de Mars plus éloignée que nous, & qui n'a pourtant pas de Satellite , & voila qu'elle se dément encore à l'égard de la Planète de Vénus moins éloignée que nous , & qui en a un aussi gros que notre Lune. Mais

* Pag.
127. in 4.

sans nous arrêter à des exceptions qui pourroient encore être douteuses , examinons la chose en elle-même. La nuit d'une Planète, toutes choses d'ailleurs égales, doit être censée d'autant plus profonde que son jour a été plus brillant ; car le passage de l'un à l'autre en sera d'autant plus marqué. Donc si les Planètes de Vénus & de Mercure ont des Habitans , & si nous jugeons de leurs besoins par les nôtres, comme le suppose l'analogie en question, une ou plusieurs Lunes leur sont d'autant plus nécessaires pendant la nuit, qu'ils sont plus proches du Soleil & qu'ils ont été plus éclairés pendant le jour. Ce sera, comme on voit, tout le contraire pour les Planètes plus éloignées, pour Jupiter, par exemple, qui est environ 5 fois plus loin du Soleil que nous; sa lumière ou son illumination pendant le jour étant en raison inverse du quarré de sa distance, se trouvera par-là environ 25 fois plus foible que celle que nous recevons. La nuit de Jupiter sera donc à cet égard 25 fois moins obscure que la nôtre ; car le jour & la nuit ou un moindre jour, sont pour les mêmes yeux des quantités purement relatives.

D'un autre côté les 4 Lunes de Jupiter, les 5 Lunes de Saturne & la partie éclairée de son Anneau ne feront point une compensation à la foible lumière du jour lorsqu'elles paroîtront pendant le jour; car leur lumière réfléchie étant, toutes choses d'ailleurs égales, proportionnelle à la lumière directe du Soleil, elle sera éteinte en présence du Soleil, comme l'est celle de notre Lune. Ainsi de quel-

quelque façon que l'on tourne la raison de convenance alléguée à ce sujet on y trouvera peu de solidité.

* Les analogies & les causes finales ont cela d'utile qu'elles sont un nouveau motif de curiosité & d'attention pour les observateurs. Hors delà , & vu notre ignorance dans les secrets & les intentions de la Nature, elles sont superflues & elles deviennent même nuisibles si elles nous empêchent d'observer ce qui peut les contredire. Combien est-il donc plus à propos de s'en tenir aux faits connus, & de ne partir que du mécanisme de la Nature, pour en constater ou pour en expliquer les Phénomènes? * Pag. 123. in 4.

Nous avons remarqué ailleurs que les Planètes inférieures, telles que Vénus & Mercure, devoient être toujours ceintes & enveloppées plus ou moins de la matière zodiacale ou atmosphère solaire. Or si cette matière est lumineuse par elle-même, l'obscurité des nuits de ces Planètes en sera beaucoup moindre. Mais si avec cela les Planètes inférieures ont des Satellites, cette même matière, lumineuse ou non lumineuse, dont leurs Satellites ne feront pas moins environnés qu'elles, pourra, selon toutes les vicissitudes d'étendue & de densité auxquelles on fait qu'elle est sujette, devenir pour nous une source d'erreur & d'incertitude dans les apparitions imparfaites ou peu durables de ces Satellites.

N'oublions pas encore en faveur de l'existence du Satellite de Vénus, qu'il pourroit bien y avoir ici quelque chose de semblable à ce qu'on remarque dans le 5 Satellite de Satur-

ne, auquel, après bien des observations, on a été obligé de reconnoître un période d'augmentation & de diminution de lumière qui le rendoit visible dans sa plus grande digression occidentale, & invisible dans l'orientale.

III.

Sur les Antipodes.

On appelle Antipodes les Habitans ou les lieux de la Terre diamétralement opposés, qui sont dans des parallèles également éloignés de l'Equateur, & dans deux moitiés opposées du Méridien. On ajoute communément que les

* Pag. 119. * Antipodes ont même vicissitude de saisons
in 4. en sens contraire, même longueur réciproque de jours & de nuits, & mêmes degrés de chaud & de froid de la part du Soleil en des saisons opposées; ce qui n'est pas absolument exact, en ce que le Soleil est plus près de la Terre lorsqu'il est dans l'hémisphère austral & que nous avons l'Hiver, que lorsqu'il est dans l'hémisphère boréal & que nous avons l'Eté; & de plus, en ce que l'année n'est pas partagée également par les saisons, le Soleil faisant 8 à 9 révolutions de plus dans l'hémisphère boréal que dans l'austral, ce qui peut produire en effet des saisons sensiblement différentes, quoiqu'univoques.

Ce qu'il y a de plus propre aux Antipodes & en quoi seulement nous les considérons ici, c'est d'être dans des lieux diamétralement opposés entre eux sur le Globe Terrestre; de manière

nière qu'ayant mené une perpendiculaire ou une verticale à un lieu quelconque, & qui par conséquent passe par le Zénith de ce lieu, l'endroit opposé de la surface du Globe que cette verticale prolongée ira couper, en soit l'Antipode. Tout le reste n'est qu'accessoire à cette idée, dans la supposition énoncée ou tacite de la Sphéricité de la Terre; car si la Terre n'est point une Sphère, si c'est un Sphéroïde elliptique, aplati, ou alongé vers les Poles, il n'y a plus d'Antipodes réciproques. C'est-à-dire, par exemple, qu'ayant mené une ligne par le Zénith de Paris & par le centre de cette Ville qui est dans l'hémisphère boréal, cette ligne ira couper l'hémisphère austral en un point qui sera l'Antipode de Paris, mais dont Paris ne sera pas l'Antipode; ainsi l'égalité réciproque de position, de latitude, de jours & de nuits dans les hémisphères opposés à six mois de différence, & tout ce qu'on a coutume de renfermer dans l'idée des Antipodes comme inséparable, ne l'est plus, & doit effectivement en être séparé dès que l'on déroge à la Sphéricité de la Terre. Il ne faut à la vérité qu'un peu d'attention pour s'en convaincre; mais enfin nous ne savons pas qu'on y eût pensé, & Mr. le Breton de Falaise en Normandie, qui nous a envoyé cette remarque, mérite qu'on lui en fasse honneur.

* Tout ceci est fondé sur ce que la Sphère, ou, pour simplifier cette Théorie, le Cercle est la seule figure régulière que tous les diamètres passans par son centre coupent à angles droits. Donc en toute figure terminée par

une autre courbe , dans l'Ellipse , par exemple , la perpendiculaire menée à un de ses points ou à sa tangente, excepté les deux axes qui répondent ici à la ligne des Poles , ou à un diamètre quelconque de l'Equateur , ne sauroit passer par son centre ni aller rencontrer la partie opposée du Méridien elliptique à angles droits. Donc le Nadir de Paris n'est pas le Zénith de son Antipode , & réciproquement ; & si l'on élevoit au milieu de Paris une colonne bien perpendiculaire à la surface de la Terre , elle ne seroit pas dans la même ligne que celle qu'on élèveroit pareillement au point Antipode de Paris ; mais elle en déclinerait par un angle plus ou moins grand , selon que l'Ellipse ou le Méridien elliptique différerait plus ou moins du Cercle. La latitude de l'un & de l'autre de ces deux points diffèrera donc en même raison , & conséquemment la longueur des jours & des nuits des mêmes saisons , &c.

Les lieux situés à l'un & l'autre Pole ou sur l'Equateur en sont exceptés , parce que dans le premier cas c'est un des axes de l'Ellipse qui joint les deux points , & que dans le second il s'agit toujours d'un Cercle dont l'autre axe de l'Ellipse est le diamètre ; le Sphéroïde quelconque applati ou alongé étant toujours imaginé résulter de la révolution du Méridien elliptique autour de l'axe du Monde.

Les nouvelles connoissances qui ne consistent le plus souvent qu'en des limitations ou des corrections des anciennes , entraînent nécessairement des distinctions délicates dont on ne

ne s'étoit pas avisé, & il est toujours utile d'attacher des idées exactes à des noms dont la signification étoit autrefois plus ou moins étendue.

* I V.

* Pag. 131.
in 4.

Projet pour l'invention des Longitudes.

L'Académie a examiné cette année un Ouvrage qu'elle connoissoit en partie depuis longtemps, par les tentatives dont il est le fruit. C'est un projet de Mr. de la Croix ancien Ecrivain principal des Vaisseaux du Roi, pour la découverte des Longitudes, tant sur mer que sur terre, par le moyen de l'inclinaison & de la déclinaison de l'Aiguille aimantée.

Les pratiques qu'on y propose pour la solution de ce fameux & important Problème, sont fondées sur un système magnétique, peu différent de celui de Mr. Halley, savoir, qu'il sort continuellement par deux points opposés du Globe Terrestre, souvent fort éloignés des Poles du Monde, une matière magnétique qui circule de l'un à l'autre de ces points, & qui décrit autour du Globe, par ce mouvement, des Méridiens tout semblables aux Méridiens Terrestres proprement dits; mais il y a cette différence entre les Poles magnétiques & les Poles du Monde, que ceux-ci sont immobiles, & que les autres changent de position.

Si l'on imagine que les Méridiens magnétiques soient coupés à angles droits par un grand

Cercle, qu'on pourra nommer leur Equateur, & par des parallèles à ce Cercle, comme les Méridiens Terrestres sont coupés par l'Equateur du Monde, & les Méridiens célestes par l'Ecliptique & ses parallèles; de cet assemblage de Cercles autour du même Globe, les uns appartenans à la Sphère céleste, & les autres à la Sphère magnétique, naitront nécessairement autant d'intersections réciproques. C'est par ces intersections & par les angles qu'elles font entr'elles, que Mr. de la Croix se propose de trouver les Longitudes, & qu'il les trouvera en effet, si son hypothèse est conforme à la Nature, & si les deux Boussoles dont il se sert, l'une d'inclinaison, l'autre de déclinaison, peuvent donner avec assez de justesse les angles sous lesquels ces deux différens ordres de Cercles se coupent, * & le lieu du Pole magnétique sur la Terre; car il ne faut plus pour cela que résoudre quelques Triangles sphériques, & employer à peu-près les mêmes opérations que s'il s'agissoit de déterminer l'ascension droite d'un Astre, sa latitude & sa déclinaison étant données.

* Pag.
132. in 4.

Les changemens & les variations que le mouvement des Poles magnétiques doit causer dans les inclinaisons de l'Aiguille aimantée, n'embarassent pas Mr. de la Croix, il prétend que ces inclinaisons sont constamment les mêmes à même distance du Pole magnétique; d'où il tire une manière assez aisée d'avoir la position de ce Pole par observation: car prenant l'inclinaison de l'Aiguille en plusieurs endroits différens, & choisissant deux à deux ceux où l'inclinaison se trouve la même,

le

le grand Cercle qui coupe perpendiculairement la ligne qui joint ces deux lieux, ira passer par le Pole magnétique, & plusieurs observations de cette nature étant répétées en différens lieux de la Terre, il en résultera nécessairement, selon l'hypothèse, une intersection commune de tous ces grands Cercles, qui déterminera le lieu du Pole qu'on cherche.

C'est donc aux observations réitérées à effectuer ce que promet l'hypothèse, & à justifier l'hypothèse même par leurs succès. Mais peut-on se flater d'avoir jamais des observations assez exactes, ou, ce qui revient ici au même, des Boussoles d'inclinaison susceptibles de toute la justesse requise pour cela? Mr. de la Croix a agi du moins comme s'il ne le révoquoit pas en doute; il a fait & refait des Boussoles de plus en plus conformes à ses vues & à ses principes. Mr. le Comte de Maurepas Ministre de la Marine, toujours prêt à seconder les vues utiles, a envoyé des ordres dans tous les ports du Royaume pour faire des épreuves de ces Boussoles, selon le plan qu'en avoit prescrit Mr. de la Croix. Ces épreuves ont été plus ou moins favorables au système, mais toujours assez pour ne pas rebüter l'Auteur. Enfin il a compté dans ce dernier Ouvrage avoir mis son projet & les instrumens qu'en exige l'exécution, au point de mériter l'approbation de * l'Académie; & l'Académie l'a accordée à ses travaux & à ses lumières, avec les sages restrictions que demandoit une matière si compliquée & si délicate.

* Pag.
133. in 4.

V.

Eclipse de Lune du 1 Janvier 1741.

Cette Eclipsé n'ayant pu être observée à Paris à cause du mauvais tems, nous donnerons ici un précis de l'observation qui en a été faite à Upsal, & qui nous a été communiquée par l'Observateur même, Mr. André Celsus Professeur en Astronomie, Secrétaire de la Société Royale de Suède, Correspondant de l'Académie Royale des Sciences, Pensionnaire du Roi, & ci-devant Adjoint aux Académiciens envoyés en Laponie pour les observations de la Figure de la Terre.

A $11^h 27' 15''$ la pénombre de la Terre commençoit à paroître sur le bord de la Lune à travers quelques nuages.

A $11^h 29' 39''$, commencement de l'Eclipsé, mais douteux à cause des nuages qui augmentèrent à tel point que le disque de la Lune en fut entièrement caché jusqu'à minuit $35' 57''$, où elle parut éclipsée de 6 doigts 29 minutes.

A $1^h 1' 55''$ après minuit la tache de Grimaldi commence à sortir de l'ombre.

A $1^h 31' 28''$ Mer des humeurs hors de l'ombre.

A $1^h 50' 46''$ Tycho dégagé de l'ombre.

A $2^h 12' 31''$ on voyoit confusément le bord de la Lune à travers l'ombre; & $1' 20''$ après il est douteux si c'est l'ombre ou la pénombre qui le couvrent.

La grandeur de l'Eclipsé a été jugée de 6 doigts 43 min. vers le Midi.

Dans

Dans toute cette Eclipsé l'ombre de la Terre a paru bien terminée, & si épaisse qu'on n'apercevoit aucune tache à travers.

L'observation a été faite avec une Lunette de 8 pieds de longueur, & à laquelle on avoit appliqué le Micromètre de Mr. Graham.

* V I.

* Pag. 134
in 4.

Soleil vu Elliptique à une hauteur considérable sur l'Horizon.

Le 10 Décembre de cette année, environ un quart d'heure avant midi, le Ciel étoit chargé d'une espèce de brouillard à travers lequel on voyoit le Soleil rougeâtre & dépouillé de ses rayons, mais fort bien tranché. Ce Phénomène ayant attiré mon attention m'en fit bientôt appercevoir un autre beaucoup plus extraordinaire. Le disque du Soleil étoit sensiblement elliptique quoiqu'à la hauteur de 17 à 18 degrés; hauteur où les Réfractions astronomiques connues & régulières sont toujours fort au dessous de ce qu'il faudroit qu'elles fussent pour produire une telle apparence. Le grand axe de l'Ellipse étoit parallèle à l'horizon, comme il l'est toujours en pareille rencontre; mais je ne saurois dire positivement de combien il pouvoit surpasser le petit axe qui lui étoit perpendiculaire, ne me trouvant pas dans ce moment en lieu propre ni avec les instrumens nécessaires pour m'en assurer. J'eus recours à une estime grossière: j'imaginai cet Astre partagé en six tranches égales parallèles à l'horizon, 3 au-dessus & 3 au-dessous du cen-

centre, & il me sembla par ce moyen que l'excès du grand axe sur le petit pouvoit bien aller à la moitié d'une de ces tranches. J'observai ainsi pendant près d'un quart d'heure à diverses reprises, selon que le brouillard qui s'épaississoit de tems en tems me le permettoit; après quoi le Soleil me fut entièrement caché par ce même brouillard. Un semblable Phénomène rapporté en 1733 (a), fut regardé comme très rare; mais celui-ci doit l'être bien davantage, car le Soleil n'étoit dans le premier qu'à environ 10 degrés au-dessus de l'horizon, & dans ce dernier le Soleil qui approchoit du Méridien, doit avoir été de 7 à 8 degrés plus élevé. Nous ne répéterons pas les Réflexions physiques & astronomiques qui ont été faites sur ce sujet dans le Volume cité ci-dessus.

(a) Voyez l'Histoire, page 32.



* GEOGRAPHIE ^{* Pag.} 135. in 4

ET

HYDROGRAPHIE.

CARTES GEOGRAPHIQUES ET HYDROGRAPHIQUES.

L'ACADEMIE est souvent obligée de porter son jugement sur des matières qui, sans sortir de la sphère des Sciences & des Arts qu'elle a pour objet, exigent cependant des connoissances de pratique peu communes dans une Compagnie de Savans. La Guerre & la Marine la mettent quelquefois dans ces cas. Aussi l'Académie a-t-elle eu grand soin de tout tems de se choisir des Sujets habiles dans ces professions, & qui joignant une longue pratique à la théorie, fussent en état de lever des difficultés pour la solution desquelles la théorie toute seule ne suffit pas. Mr. le Chevalier d'Albert Capitaine des Vaisseaux du Roi, outre ce qu'il peut nous communiquer de lumières sur la Navigation & la manœuvre des Vaisseaux, dispose d'un trésor dont il fait parfaitement se servir, & dont l'Académie
aussi

aussi bien que le public , peuvent tirer de très grands avantages; je veux parler du Dépôt des Cartes, Plans & Journaux de la Marine, qui lui fut confié en 1734.

Il employa d'abord des Pilotes intelligens au dépouillement des matériaux immenses qui étoient entre ses mains, & ayant partagé son travail avec Mr. Bellin Ingénieur du Roi & Hydrographe de la Marine, Commis au Dépôt, il ne tarda pas à faire paroître les fruits de ce travail. Dès l'année 1737 Mr. le Chevalier d'Albert présenta à l'Académie une Carte réduite de la Mer Méditerranée en trois feuilles * avec une analyse & une comparaison de celles dont on s'étoit servi jusqu'alors.

* Pag. 136.
in 4.

En 1738 il donna une Carte particulière de l'Archipel, d'autant plus utile qu'elle est en grand Point, & que cette partie de la Méditerranée se trouvant trop petite dans la Carte générale, ne pouvoit représenter dans le détail qu'exige la Navigation, le nombre prodigieux d'Iles qui s'y rencontrent.

L'année 1738 n'étoit pas finie, qu'on vit sortir du Dépôt une autre Carte sous le nom d'Océan Occidental, comprenant les côtes d'Europe sur l'Océan depuis le 52 degré de latitude septentrionale, celles d'Afrique jusqu'à l'Equateur, & celles de l'Amérique qui leur sont opposées.

En 1739 parut une suite de cette Carte que Mr. le Chevalier d'Albert nomma Océan Méridional, & qui renfermoit les côtes d'Afrique depuis le 6 degré de latitude septentrionale jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, & celles de l'Amérique depuis Cayenne jusqu'au dé-

détroit de le Maire & la Terre de Feu.

Il fit voir à l'Académie en 1740, un morceau plus considérable & peut-être moins connu que les précédens, quoiqu'en général il soit plus anciennement connu, une Carte réduite de l'Océan Oriental ou Mer des Indes, qui comprend les côtes d'Afrique depuis le Cap de Bonne-Espérance jusqu'à la Mer-rouge, avec les Iles de Madagascar, de Bourbon, de France, &c. & les côtes d'Asie depuis la Mer-rouge jusqu'à Canton dans la Chine; où l'on trouve les côtes intermédiaires des Péninsules en deça & au delà du Gange, & toutes les Iles adjacentes. Il accompagna cette Carte d'un Mémoire sur sa construction, où il fait sentir l'extrême différence qu'il y a de toutes les positions qu'il a adoptées, avec celles que les Cartes Hollandoises & Angloises donnent des mêmes parties. Le résultat de cette comparaison est que la Carte dressée sur les Mémoires du Dépôt de la Marine, tient un milieu entre celles des Hollandois & des Anglois; & toutes ces différences sont constatées par des observations *immédiates auxquelles il ne paroît pas qu'on puisse rien opposer.

* Pag.
137. in 4.

Par exemple, la Carte Hollandoise de Pieter Goos dont les Navigateurs font usage, met Canton au 134 degré 30 minutes de longitude, à compter du Pic de Ténérif; ce qui revient à 116 degrés 20 minutes à l'Orient du Méridien de Paris; mais les observations astronomiques faites à Canton ou à Pékin dont on connoit la position longitudinale par rapport à Canton, déterminent celle-ci à 110 de-

degrés 40 minutes ; d'où il suit que la Carte de Pieter Goos erre en excès de longitude, de 5 degrés 40 minutes sur cette position. Si l'on prend les Cartes Angloises qui passent aujourd'hui pour les meilleures, quoiqu'elles ne soient point réduites, & que par conséquent on ne puisse y prendre de justes mesures pour naviger dans les traversées un peu longues ; on trouvera après les réductions nécessaires, que ces Cartes placeroient Canton au 104 degré de Paris, ce qui diffère en défaut de la vraie situation, de 6 degrés 40 minutes. On voit donc que les Hydrographes Anglois, pour éviter l'erreur des Cartes Hollandoises, sont tombés dans une erreur contraire & encore plus considérable.

Enfin dans cette année 1741 Mr. le Chevalier d'Albert nous a donné une Carte réduite des Mers comprises entre les côtes occidentales de l'Amérique, & les parties les plus orientales de l'Asie, Mers qu'on désigne communément par le nom général de Mer Pacifique ou du Sud. Cette Carte ne demandoit pas de moindres éclaircissemens que les précédentes, & n'étoit pas moins susceptible d'instructions importantes & curieuses sur toutes les parties qui la composent. Il l'a donc accompagnée de même d'un Mémoire qui mérite l'attention des Navigateurs & de tous ceux qui s'intéressent à la perfection de la Géographie & de l'Hydrographie.

Après avoir rendu compte dans ce Mémoire des raisons qui l'ont empêché de changer la graduation usitée des Cartes Marines réduites dans la supposition de la Terre sphérique,

que , il passe à l'examen des connoissances qu'on a eues jusqu'ici * de la Mer du Sud. On * Pag. 138. sera surpris de voir combien les Cartes de ^{in 4.} cette Mer , publiées en différens tems & par les Navigateurs & les Géographes de différentes Nations , s'éloignent du vrai & sont peu d'accord entr'elles. Les Espagnols ont trop resserré la Mer du Sud , les Hollandois ont voulu l'étendre , mais ils l'ont encore renfermée dans des limites trop étroites , les Anglois l'ont trop étendue.

Herréra à qui nous devons l'Histoire du nouveau Monde dans la description Géographique qu'il en a donnée , & dans la Carte qui est à la tête de cette description , ne met que 125 degrés de Longitude entre Lima & Manille , au lieu de 162 degrés qu'il doit y avoir. Une erreur de 37 degrés paroît d'abord si peu possible, qu'on a cru qu'Herréra avoit sacrifié ses connoissances aux vues politiques de sa Nation, qui étoient de faire tomber les Philippines & les Moluques dans la partie de la Terre dont le Pape Alexandre VI avoit donné la concession au Roi de Castille par la Bulle de 1493 , en conséquence de la fameuse ligne de Démarcation qui régloit les prétentions des Rois de Castille & de Portugal au sujet des nouvelles découvertes. Mais il nous semble qu'on a fait tort à la bonne foi de l'Historien Castillan, en faisant trop d'honneur au savoir géographique de son siècle. Il n'y a qu'à voir à quel point on étendoit en ce tems-là le continent de l'Asie au delà de ses véritables bornes , pour comprendre qu'on a pu & même dû , en conséquence , rétrécir excessi-

cessivement les Mers de l'Amérique qui lui sont contigues , & où l'on avoit bien moins navigé que sur les Mers qui sont en deçà entre le double continent d'Amérique & ceux d'Afrique & d'Europe.

En voici un exemple frappant que nous emprunterons de Mr. de l'Isle. Avant ce fameux Géographe les Cartes ordinaires & surtout celles de Sanson , plaçoient la Terre d'Yéço au Nord de la Mer du Sud , & l'éten-
doient tellement vers l'Est qu'il restoit à peine delà jusqu'à la prétendue Ile de Californie , 5 à 6 degrés d'intervalle ; cependant on ne peut douter après toutes les preuves qu'en a données Mr. de l'Isle ^{*}(a), que la Terre nommée d'Yéço ne soit au Nord du Japon à environ 90 degrés de la Californie , c'est-à-dire , 85 degrés ou 1700 lieues plus éloignée que ne la donnoient ces Cartes. J'avoue que les positions & les bornes de la plupart des Terres & des Mers dont parle Herrera pou-
voient être moins incertaines de son tems que n'étoient les limites orientales de l'Asie ; mais aussi ne s'y est-il trompé que de 37 degrés , & cette erreur ne pouvoit guère manquer de naître de la précédente.

En général on a toujours attribué trop d'étendue aux parties connues de la Terre , & trop peu à celles qui ne l'étoient pas , & où l'imagination ne pouvoit se fixer sur rien de déterminé. La Géographie de Ptolomée en fournissoit mille exemples , & celle des siècles suivans jusqu'à la découverte des Satellites de Ju-

(a) Voyez les Mémoires de 1720 , page 494.

Jupiter , & à l'heureuse application qu'on a faite de leurs Eclipses à la recherche des Longitudes Terrestres , n'a pas été plus parfaite à cet égard. On sait aussi que lorsque Christophe Colomb aborda l'Île Espagnole ou de Saint-Domingue , il se persuada que c'étoit la véritable *Cipango* ou *Zipangri* de Marc-Paul Vénitien , qui n'est autre chose que l'Île du Japon ou *Nipon*. Car comme il comptoit avoir laissé cette Île bien loin derrière lui à l'Orient , il crut l'avoir retrouvée en navigeant vers l'Occident , & avoir fait le tour de cette partie du Globe qui la séparoit en ce sens du lieu de son départ : méprise énorme dont cet illustre Voyageur n'est peut-être jamais bien revenu , & fondée sans doute sur l'erreur des Géographes de son tems qui plaçoient le Japon infiniment plus loin vers l'Est qu'il ne devoit être. Une partie de ces préjugés qui subsistoient encore lorsque Herrera écrivoit son Histoire , & l'imperfection des Mappemondes qu'il avoit pu consulter , suffisoient , à mon avis , pour rendre cet Historien excusable d'avoir trop rétréci cette partie de la Terre aux dépens de laquelle on avoit trop élargi les autres , on devoit du moins le mettre à couvert du reproche de prévarication dont quelques Auteurs l'ont chargé.

* Pour revenir à la Carte de Mr. le Chevalier d'Albert , & à la comparaison qu'il en a faite avec celles des Espagnols , des Hollandois & des Anglois , nous remarquerons après lui que les seconds avoient encore fait la Mer du Sud trop étroite de 7 degrés , & que les derniers au contraire lui avoient donné trop d'étendue.

* Pag.
140. in 4.

d'étendue; ce que Mr. le Chevalier d'Albert justifie encore par les positions réciproques de Manille & de Lima. Manille, selon les Cartes de Tornton, l'un des meilleurs Hydrographes d'Angleterre, est située à 116 degrés 30 minutes à l'Orient du Méridien de Londres, ou 114 degrés 5 minutes du Méridien de Paris. La position de Lima sur la Carte d'Amérique publiée en 1700 par Mr. Halley, revient à 78 degrés 40 minutes de Longitude occidentale du Méridien de Paris. Comparant donc ces deux positions, il en résulte 167 degrés 20 minutes de différence en Longitude, entre Manille & Lima, ce qui fait une distance de 5 degrés 20 minutes de plus que celle que nous donne la Carte de Mr. le Chevalier d'Albert.

Tous les autres points de cette Carte & des précédentes, ont été ainsi placés par des observations immédiates, ou par le résultat de plusieurs observations indirectes. Cette espèce de critique, ce choix de positions entre toutes celles que donnent les divers Routiers ou Journaux des Navigateurs, ces combinaisons, ces compensations délicates de l'excès qu'on trouve d'un côté & du défaut qui se rencontre de l'autre, font tout ce qu'il y a de plus difficile en Géographie, & c'est malheureusement ce qui est le plus fréquemment nécessaire; car malgré tous les secours que nous avons aujourd'hui pour nous procurer des déterminations astronomiques, ces déterminations sont encore en trop petit nombre pour la description exacte de la Terre. C'est à la suite des tems de les multiplier, ou à la sagacité du Géographe

graphe d'en étendre la certitude sur tout ce qui n'est que de pure induction, par un enchainement de faits & de conséquences, dont l'assemblage & l'accord parfaits sont l'ouvrage de plusieurs siècles.

* *CARTES DES CÔTES MÉRIDIONALES DE TERRE-NEUVE, &c.* *Pag. 141.
in 4.

MR. Buache avoit présenté à l'Académie en 1736, une Carte des Côtes méridionales de l'Île de Terre-neuve, de l'Île Royale, de la partie du Grand-banc où se fait la pêche de la Morue, & de toutes les Côtes, Iles & Mers comprises entre le 43 & le 49 degré de Latitude Nord, & environ les 49 & 64 degrés de Longitude occidentale de Paris. Cette Carte faisoit partie de celle qui avoit été donnée en Angleterre par Mr. Popple trois années auparavant ; mais elle en étoit très différente dans cette même partie, par un nombre prodigieux de corrections qui en changeoient entièrement les positions. Ce sont ces changemens que Mr. Buache nous redonne cette année, d'une manière aussi abrégée qu'instructive, en traçant sur la Carte de 1736 ou sur une autre fort semblable, le trait de toutes les positions correspondantes de la Carte de Mr. Popple, qu'il a distinguées par la gravure, &, ce qui est peut-être nouveau en Géographie, par la couleur imprimée à-
Hist. 1741. I veg

vec la Carte même. On voit donc ici d'un coup d'œil ce qu'un long discours expliqueroit à peine. Mr. Popple a fait tous ces païs beaucoup plus occidentaux que ne les avoient supposés les autres Cartes données avant lui, sur-tout les Cartes Hollandoises, & plus qu'ils ne doivent l'être en effet. Par exemple, il a placé le Cap de Raz environ 8 degrés 20 minutes ou 120 lieues plus Ouest qu'il ne l'est dans les premières, & 4 degrés 10 minutes seulement ou 60 lieues plus loin que ne l'a fixé Mr. Buache d'après l'examen qu'il en a fait. Une telle variété sur la situation d'un point si important dans la navigation de cette partie de l'Amérique, doit engager les Navigateurs à le déterminer avec soin, & montrer en même tems la nécessité * d'en vérifier la position par de bonnes observations astronomiques. On en peut dire autant du Cap Bréton dans l'Ile Royale, & de quelques autres points de l'entrée du Golfe de Saint-Laurent. La position de l'Ile de Sable, plus célèbre par les naufrages qui s'y sont faits que remarquable par sa grandeur, ne diffère de celle de Mr. Popple que d'environ 1 degré 20 minutes. Ainsi l'on voit que ce transport général de Terres & de Mers vers l'Occident au-delà de leur véritable situation, par rapport aux Côtes d'Europe, varie encore ici infiniment dans ses parties, & ne devoit par-là que plus difficile à rectifier.

* Pag. 142.
in 4.



*MECHANIQUE. *Pag 143. in 4.

SUR UN PROBLEME DE DYNAMIQUE (a).

LE nom de *Dynamique* qui est depuis peu en usage parmi les Géomètres François, & dont Mr. Leibnitz s'est servi le premier, signifie cette mécanique spéculative & sublimé qui traite des forces motrices & actives des Corps. Selon Mr. Leibnitz le mécanisme de l'Univers & celui des ouvrages de l'Art ne diffèrent pas dans leurs principes. La Pesanteur, disoit-il, & l'Elasticité qui sont les deux grands moyens qu'emploie la Nature dans la production de ses divers phénomènes, peuvent être expliquées mécaniquement comme nos machines ordinaires, & le doivent être par le mouvement de la matière Ethérée; mais, ajoutoit ce Philosophe, le mouvement primitif des Corps, cette force qui leur a été imprimée par le Créateur, & qui agit constamment en eux, s'y trouve différemment limitée & modifiée par les circonstances de leurs chocs réciproques. L'art de démêler, d'évaluer toutes ces différences & d'en assigner les

(a) Voyez les Mémoires, page 379.

les effets, il le nomma *Dynamique*. Les Méchaniques, la Statique, & ce qu'on appelle communément la Science des Forces mouvantes, n'en diffèrent qu'en ce que les forces ou les puissances y sont quelquefois considérées en simple pouvoir d'agir, ou même comme passives; au-lieu que le véritable objet de la Dynamique est, comme nous l'avons dit, la théorie des Forces actuellement agissantes. A mesure que les Sciences s'étendent & qu'on vient à les envisager sous de nouveaux aspects, il est utile qu'on leur impose de nouveaux noms pour en mieux caractériser les parties. C'est ensuite aux Ecrivains sages & intelligens d'en user avec sobriété.

•Pag. 144.
in 4. Soit un anneau verticalement attaché à la surface d'une * table horizontale, par un point sur lequel il puisse tourner comme centre. Soit cet anneau enfilé par une baguette ou verge inflexible, qui y glisse librement selon sa longueur, & qui soit chargée à ses extrémités ou à tels autres points quelconques de chacun de ses bras, de part & d'autre de ce centre, d'un ou de plusieurs corps de masse connue, à l'infini. Si l'on imagine que cette baguette vienne à être frappée ou mise en mouvement de quelque manière que ce soit autour de l'anneau dans lequel elle peut glisser ou tourner, ou glisser & tourner tout ensemble, il est évident que chacune de ses extrémités, chacun de ses points, & par conséquent chacun des Corps dont elle est chargée, décrira ou des lignes droites, ou des cercles, ou des courbes d'une autre espèce; savoir, des lignes droites qui se confondront avec

avec son axe, si la direction du mouvement qui lui a été imprimé est selon sa longueur; des cercles, si l'impulsion lui étant perpendiculaire ou oblique, le mouvement communiqué aux Corps qu'elle porte ne produit en elle que la simple rotation sans la faire glisser dans l'anneau; car en ce cas, qui est celui où les forces centrifuges se balancent de part & d'autre, les rayons vecteurs ou les parties des bras de la baguette chargées de ces Corps demeureront constamment à même distance du centre du mouvement. Enfin tous les points de la baguette décriront des courbes différentes du cercle si elle glisse & tourne en même tems, selon toutes les combinaisons que peut recevoir ce mouvement composé. Il s'agit de déterminer les vitesses qu'auront tous ces Corps mis ainsi en mouvement, & les lignes droites ou courbes qu'ils décriront autour du centre immobile de la rotation.

On sent assez de quelle difficulté est ce Problème. Mr. de Montigny l'a résolu par le calcul différentiel & intégral, le seul vraisemblablement qui puisse atteindre à de pareilles questions, où les courbes mêmes qui en résultent ne sont guère exprimables que par des équations différentielles. Il s'est servi aussi du *Principe de la conservation des Forces vives*; Principe plus ancien que ces Forces, & que Mr. Huyghens a * mis le premier en * Pag. 145.
œuvre dans son *Traité des Pendules appliquées* ^{in 4.}
aux Horloges, mais qui a été depuis désigné sous ce nom par de fameux Géomètres, qui ont suivi la doctrine des Forces vives de Mr. Leibnitz, à laquelle il leur a paru favorable. Il

ne signifie autre chose , sinon que dans tous les cas où plusieurs Corps agissent les uns sur les autres, soit par le choc, étant supposés à ressort parfait, soit par des fils , ou par des verges inflexibles qui les tiennent attachés, & qui les tirent ou les entraînent, la somme des produits de leurs masses par les quarrés de leurs vitesses, fera toujours une quantité constante. Aussi ce même principe a-t-il été souvent employé par d'autres Géomètres fameux qui rejettent formellement les Forces vives , ou qui n'ont point voulu entrer dans la discussion de cette célèbre dispute, dont il peut être aisément séparé.

Du reste il seroit inutile d'avertir que dans l'énoncé du Problème de Mr. de Montigny on doit concevoir l'anneau autour duquel se font tous les mouvemens , comme un point, la baguette comme une ligne sans largeur, les masses qui y sont fixement attachées, comme autant de petits corps dont tout le volume seroit réuni au point de cette ligne où ils sont attachés , & que dans toute cette recherche on fait abstraction des frottemens. Ce sont les conditions ordinaires de ces sortes de Problèmes qu'il faut toujours commencer de résoudre sous ce point de vue simple & purement mathématiques, pour en venir ensuite , lorsque le cas le requiert, à l'examen des circonstances physiques qui les accompagnent.

SUR LES INSTRUMENS
QUI ASSORTISSENT
LA MACHINE PNEUMATIQUE(a).

LEs inventeurs dans les Sciences ou dans les moyens de les acquérir & de les perfectionner , jouissent à peu-près des mêmes honneurs. Le fameux Boyle n'est pas plus * connu par ses excellentes recherches de Physique , de Chymie & d'Histoire Naturelle, ^{*Pag. 146. in 4.} que par la Machine du Vuide ou Pneumatique qu'il a inventée ou seulement perfectionnée, & à laquelle plusieurs Savans ont donné le nom de *Machine Boyleenne*. En effet, combien de connoissances utiles & curieuses cette merveilleuse Machine ne nous a-t-elle pas procurées ? Mr. l'Abbé Nollet obligé par profession à faire un grand nombre d'expériences, & desirant donner aux instrumens qui servent à produire cette extrême raréfaction de l'air qu'on qualifie de Vuide , toute la perfection dont ils sont susceptibles , a remonté jusqu'à l'origine de la Machine Pneumatique , en a parcouru toutes les formes & examiné ce qu'il y a d'avantageux dans les unes & de défectueux dans les autres. Il rendit compte à l'Académie de cet examen l'année dernière(b) dans deux Mémoires , dont le premier traite

(a) Voyez les Mémoires, page 452.

(b) Voyez les Mémoires de 1740, pages 544, & 785.

traite en général des Instrumens propres aux expériences de l'air ; le second regarde particulièrement la construction d'une nouvelle Machine Pneumatique de raréfaction à deux corps de Pompe, & celui-ci roule sur les Instrumens dont il convient d'affortir la Machine Pneumatique, pour en rendre l'usage plus sûr & plus commode. Mais ces détails d'une mécanique industrieuse doivent être lus dans le Mémoire même. On y trouvera de nouveaux moyens pour opérer avec exactitude & avec facilité dans les expériences du Vuide qu'on connoissoit déjà, & de nouvelles vues sur quelques autres non moins importantes, qui n'ont pas encore été exécutées. Telle est celle qui a pour objet la nature & la quantité des matières hétérogènes dont l'air de notre Atmosphère est chargé. Il seroit difficile à la Physique expérimentale de s'exercer sur quelque chose de plus intéressant pour nous que l'Elément dans lequel nous vivons & que nous respirons sans cesse. Mr. l'Abbé Nollet ne se flatte pas qu'on puisse sitôt en avoir une connoissance parfaite ; mais les procédés qu'il indique pour cela doivent porter à l'essayer, & nous autorisent à ne pas désespérer du succès.

* *SUR LA CONSTRUCTION* * Pag.
147. in 4.
D'UN PENDULE

Qui ne puisse s'allonger par la chaleur, ni se raccourcir par le froid (a).

DEPUIS l'ingénieuse application du Pendule aux Horloges, due à Mr. Huyghens, la Mécanique sembloit n'avoir plus rien à faire pour donner à ces Machines toute la perfection dont elles sont susceptibles. En effet, à ne considérer que ce qu'elles tiennent du pur mécanisme, & abstraction faite des altérations que les causes physiques & accidentelles peuvent y apporter, on ne voit pas qu'il leur manquât rien pour nous procurer une exacte mesure du tems. Peut-être même n'osa-t-on d'abord y désirer rien au-delà. Mais comme les besoins & les desirs croissent à mesure qu'ils sont satisfaits, on n'a pas joui longtemps de ces admirables Horloges, déjà plus régulières dans leur marche que le Soleil même, sans leur demander quelque chose de plus. On a voulu que par un principe interne & mécanique elles fussent en état de prévenir tous les dérangemens que la chaleur ou le froid peuvent causer à leur mouvement: car on sait que la chaleur raréfie & dilate les métaux, que le froid au contraire les condense & en accourcit toutes les dimensions, & que les

(a) Voyez les Mémoires, page 485.

les vibrations du Pendule sont par rapport à leurs durées en raison inverse des quarrés de ses longueurs. D'où il suit que par cette seule circonstance physique l'Horloge ou la Pendule doit avancer en Hiver & retarder en Eté ; ce qui peut aller à plus d'un quart de minute de différence par jour entre ces deux saisons de l'année , dans un climat tel que le nôtre, & ainsi à proportion dans les saisons moyennes.

Mr. Graham fameux Horloger de Londres, Membre de la Société Royale, est le premier qui ait tenté avec quelque succès de remédier à cette cause d'irrégularité dans les * Horloges. Son idée qui est très ingénieuse & qu'on peut voir dans les Transactions Philosophiques, année 1726, n°. 392, doit être regardée comme la source de toutes celles qu'on a eues depuis sur ce sujet , quoique très différentes ; car il suffit souvent de savoir qu'il y a un moyen d'arriver au but , pour en imaginer bientôt de plus surs & de plus commodes.

Une expérience que le célèbre Mr. Muschenbroek a mise dans tout son jour , savoir, que le cuivre & sur-tout le laiton ou cuivre jaune, se dilate beaucoup plus par la chaleur que le fer , a fourni la manière , jusqu'ici la plus exacte & la plus facile , de procurer aux Horlogers cette rectification qu'on leur demande. Mr. Julien le Roy , l'un des plus habiles Horlogers de Paris , a déjà construit sur ce principe des Horloges très justes dont il présenta le modèle à l'Académie en 1738. Il applique au-dessus de la boîte qui en contient le rouage, un tuyau de laiton au haut duquel est

est fixement attachée une verge de fer où il suspend celle du Pendule, & qui, en vertu de la différente dilatation des deux métaux, sert à soulever & à raccourcir celle-ci lorsqu'elle est alongée par la chaleur, ou à l'abaisser & l'alonger lorsqu'elle est raccourcie par le froid. Sur le fronton de la boîte est un Cadran dont les divisions relatives aux impressions du froid & de la chaleur de l'air sur l'Horloge, sont parcourues par une aiguille qui en indique les changemens. L'Artiste semble avoir voulu nous mettre sous les yeux & la cause & les effets qu'il avoit en vue dans son travail; ce qui peut être utile, tant pour régler la machine, que pour s'en servir avec plus de connoissance. Mais voici la même invention projetée sur un autre plan.

Comme ce tuyau de cuivre qui s'élève perpendiculairement au-dessus de la Pendule, doit avoir plus de 4 pieds $\frac{1}{2}$ de hauteur, & pourroit causer quelque embarras ou quelque difformité dans les lieux où l'on souhaiteroit la placer, Mr. Cassini a imaginé une autre construction, qui est tout-à-fait exemte de cet inconvénient. C'est à la verge même du Pendule qu'il applique les deux métaux, par une ou deux * contre-verges de cuivre, dont les dilatations & les condensations agissent en sens contraire à celles de la verge de fer du Pendule, & y produisent le jeu que nous venons de décrire dans la Pendule de Mr. le Roy. Ainsi la caisse ordinaire qui soutient la boîte de l'Horloge, & qui en cache les poids & les cordes, cachera également la verge du Pendule & toute cette mécanique, qui

* Pag.
149. in 4.

ne devient par-là que plus conforme à l'ouvrage de la Nature qu'elle est destinée à combattre.

La construction que propose Mr. Cassini ne touchant qu'à la verge du Pendule, sans rien changer à sa suspension ni aux autres pièces de l'Horloge, a encore cet avantage, qu'on peut l'appliquer aisément & à peu de frais, aux Pendules toutes faites que l'on avoit auparavant.

NOUS renvoyons entierement aux Mémoires,

L'Extrait des Observations & Opérations qui ont été faites dans le Bas-Languedoc pendant les mois de Mai & de Juin de l'année 1740, par Mr. Pitot Directeur du Canal Royal de cette Province (a).

Les Expériences de Mr. de Buffon sur la force du Bois, qui font la suite d'un Mémoire qu'il donna l'année dernière sur le même sujet (b).

(a) Voyez les Mémoires, page 359.

(b) Page 394.

DIVERS MEMOIRES

ET

OBSERVATIONS DE MECHANIQUE.

I.

Sur les Forces Motrices des Corps.

NOTRE siècle, ainsi que les beaux siècles de Rome & de la Grèce, peut compter des Philosophes parmi ses plus grands Poètes. Mr. de Voltaire a présenté cette année à l'Académie un Mémoire intitulé *Doutes sur la mesure des* Forces motrices & sur leur nature*, où il paroît être fort au fait de la fameuse question des *Forces vives*, ce qui n'est pas commun, & avoir médité avec succès sur la nature du Mouvement, ce qui est encore plus rare. Ces deux points de vue, l'un plus particulier, l'autre plus général, font l'objet & la division de son Mémoire.

* Pag. 150. in 4.

La première partie contient une exposition abrégée des principales raisons qui ont été données, & qui prennent ici une nouvelle forme, pour prouver que les forces actuelles des Corps en mouvement sont comme leurs quantités mêmes de mouvement, c'est-à-dire, en raison de leurs simples vitesses multipliées par leurs masses. C'est ce qu'on appelle l'*Opinion commune* ou *Cartésienne*, & c'est aussi celle que Mr. de Voltaire a adoptée en op-

position à celle des *Forces vives* de Mr. Leibnitz , qui fait la force des Corps comme leurs masses multipliées par les quarrés de leurs vitesses. Sur quoi l'on peut voir l'Histoire de 1728 (a).

Une pression quelconque en un tems , ce sont les paroles de Mr. de Voltaire , peut-elle donner autre chose qu'une vitesse, & ce qu'on appelle une Force ? Si une pression en un tems ne peut donner qu'une force , deux pressions dans le même tems ne donneront-elles pas simplement deux vitesses & deux forces ? Donc en deux tems une pression produit ce que deux pressions égales font en un tems , elle donne deux de vitesse & deux de force ; car 2 multiplié par 1 , est la même chose que 1 multiplié par 2. Donc si de deux Corps égaux le premier fait le double d'effets de l'autre , c'est qu'il a double vitesse, & s'il fait le quadruple d'effets avec deux de vitesse , c'est qu'il agit en deux tems. Donc si l'on veut que la Force soit le produit du quarré de la vitesse par la masse , il faudra qu'un Corps avec double vitesse opère dans le même tems une action quadruple de celle d'un Corps égal qui n'auroit qu'une vitesse simple : ce qui est contradictoire , même selon la doctrine des *Forces vives*. Donc tous les cas où cette contradiction d'une vitesse double qui agit comme 4 paroît se trouver , doivent être * décomposés & ramenés à la simplicité de cette loi inviolable , par laquelle

* Pag.
251. in 4.

le 2 de vitesse ne donne qu'un effet double de 1 de vitesse, &c.

C'est en procédant ainsi par les idées les plus simples que Mr. de Voltaire passe aux cas plus composés & qui exigent plus de calcul. Le tems si inséparable de l'action des Forces, & que les partisans des Forces vives voudroient bien en séparer, fait la base de tous ses raisonnemens. C'est en vain qu'on ne feroit mention que de la vitesse, le tems y rentreroit nécessairement avec elle, puisque, selon la notion la plus simple qu'on puisse donner de la vitesse, ce n'est autre chose que l'espace divisé par le tems: c'est-là son essence réduite à ses moindres termes, c'est la Formule des Géomètres.

S'il y a un cas où la Force paroisse être comme le quarré de la vitesse, c'est sans doute dans le choc des fluides, qui agissent en effet en raison doublée de leur vitesse. Mais s'il est démontré, poursuit Mr. de Voltaire, que les fluides n'agissent ainsi que parce qu'en un tems donné chaque particule n'agit qu'avec sa masse multipliée par sa simple vitesse, restera-t-il quelque doute sur l'évaluation des Forces motrices? Or il ne faut qu'un peu d'attention pour s'apercevoir de cette vérité. Les parties d'un fluide en mouvement contre un plan se succèdent sans cesse, il agit donc & en raison de leur vitesse & en raison du tems; les vitesses sont comme les tems: donc il doit agir en raison doublée ou des vitesses ou des tems, de cela seul que chacune de ses parties agit à chaque tems donné, en raison de sa masse multipliée par sa simple vitesse.

Mr.

Mr. de Voltaire insiste encore beaucoup sur les pertes ou les extinctions successives de la Force dans les mouvemens retardés , où elles sont incontestablement proportionnelles aux simples vitesses , & dont il est évident que la somme ne peut être aussi que proportionnelle à la Force primitive même & totale , qui s'est enfin consumée par ces pertes contre les obstacles continuels qu'elle avoit à surmonter.

*Pag. 152.
in 4.

*La seconde partie du Mémoire consiste en des réflexions qui sous le nom modeste de doutes sur la nature de la force & du mouvement, ne laisseroient pas de fournir encore de très fortes preuves contre l'opinion que l'Auteur combat. Ce sont de ces observations lumineuses tirées du fond du sujet, & auxquelles toute démonstration bien ordonnée doit se rapporter, principalement lorsqu'il s'agit de questions Physico-Mathématiques.

Une méthode fort ordinaire aux Géomètres qui ont à résoudre un Problème , c'est de le considérer comme déjà résolu , & , par l'inspection des lignes, des quantités ou des rapports qui le constituent, d'en trouver réellement la solution. La Force motrice des Corps considérée ici en raison des simples vitesses multipliées par les masses, fournit de même à Mr. de Voltaire de quoi définir ce qu'elle est mathématiquement parlant ; c'est-à-dire, en tant que capable de plus & de moins ; car c'est sur sa quantité & non sur sa nature métaphysique, que roule la question des Forces vives. Cependant les réflexions générales & métaphysiques de Mr. de Voltaire s'appliquent

quent quelquefois fort heureusement à la théorie particulière.

S'il est bien prouvé, dit-il, que ce qu'on appelle Force motrice est le produit de la simple vitesse par la masse, ne sera-t-il pas moins mal-aisé de parvenir à connoître ce que c'est que cette Force ? D'abord si elle est la même dans un Corps qui n'est pas en mouvement, comme dans le bras d'une balance qui est en équilibre, & dans un Corps qui est en mouvement, n'est-il pas clair qu'elle est toujours de même nature, & qu'il n'y a point deux espèces de Force, l'une *morte* & l'autre *vive*, dont l'une diffère infiniment de l'autre ? à moins qu'on ne dise aussi qu'un liquide est infiniment plus liquide quand il coule, que quand il ne coule pas.

Il avoit remarqué que l'ancienne manière d'évaluer les Forces, l'hypothèse Cartésienne ou Newtonienne, car Newton, Descartes & toute l'Angleterre s'accordent ici parfaitement, rend une raison pleine & entière de tous les cas auxquels * la Force semble être le quarré du produit de la vitesse par la masse, tandis que la nouvelle manière ne peut en aucun sens rendre raison des effets proportionnels à la simple vitesse. * Pag. 1534
in 4.

Nous n'entrerons dans aucun détail sur les questions purement métaphysiques qui font le principal sujet de cette seconde partie du Mémoire ; leur liaison avec la question dont il s'agit dépend presque toujours de la connexion qu'elles ont dans leur totalité, & avec des systèmes de Philosophie dont l'explication nous meneroit trop loin. On en jugera par le simple

ple

ple énoncé de celles-ci; par exemple, si la masse & le mouvement fussent pour opérer la Force motrice des Corps? S'il n'y faut pas ajouter l'inertie de la matière? Si le principe de cette Force n'est pas dans la *gravitation*, soit que la gravitation ait elle-même une cause physique, soit qu'elle n'en ait point? Si la quantité de Force & de mouvement augmente ou diminue dans l'Univers, ou si elle est toujours la même? Si la permanence des Forces ne feroit pas une beauté de plus dans la Nature? &c. A l'égard de cette dernière question Mr. de Voltaire ne pense pas que les Philosophes soient plus fondés à dire que la permanence de la quantité de Forces est une beauté dans la Nature, que s'ils disoient que la même quantité d'espèces, d'individus, de figures, &c. est une beauté nécessaire.

I I.

Sur le jet des Bombes.

Mr. l'Abbé Deidier aujourd'hui Professeur Royal de Mathématique à l'Ecole d'Artillerie de la Fère, & connu par de savans Ouvrages de Mathématique qu'il a donnés au Public, a présenté à l'Académie une *nouvelle Méthode pour trouver quelle force on doit donner à une Bombe ou à un Boulet, & sous quel angle d'élévation ou d'abaissement on doit tirer pour atteindre un But situé au-dessus ou au dessous de la Batterie*. Cette Méthode qui consiste à faire

* Pag. 154. in 4. passer par deux points donnés * une Parabole dont l'axe soit vertical, réduit tout d'un coup les

les cas où le but est situé au-dessus ou au-dessous de la Batterie à ceux où il est dans le niveau ; après quoi Mr. l'Abbé Deidier se sert des Règles de Mr. Blondel pour les cas du niveau.

Mr. Blondel peu content de tout ce qui avoit été publié ou qu'il avoit publié lui-même sur ce sujet dans son Traité du Jet des Bombes, proposa autrefois le Problème à l'Académie. Mrs. Buot, Roëmer & de la Hire en donnèrent de fort belles solutions synthétiques ; mais comme ces solutions demandoient plusieurs analogies & la connoissance de plusieurs angles ou sinus, & qu'elles étoient par là trop embarrassantes pour la pratique, Mr. Guinée, le P. Reynaud & quelques autres Géomètres de la Compagnie venus longtems après, réduisirent ce Problème à des Formules par lesquelles la difficulté & le travail sont beaucoup diminués. On peut voir aussi la solution très concise que Mr. de Maupertuis en a donnée dans ce genre (a), & qui renferme cependant tout ce qu'on peut desirer sur cette matière. Mais Mr. l'Abbé Deidier voulant encore épargner aux Canonniers ou aux Bombardiers & à ceux qui les conduisent, le soin d'évaluer ces Formules, ou d'en avoir toujours des Tables avec eux, a réduit toutes leurs opérations à prendre le tiers d'une ou de deux grandeurs connues, moyennant quoi tous les cas du jet des Bombes ou du tir du Canon se trouvent ramenés à la pratique de Mr. Blondel pour le seul cas où le but est au niveau

(a) Voyez les Mémoires de 1731, page 419.

niveau de la Batterie. Et comme il n'y a point de Bombardier qui ne puisse prendre le tiers d'une quantité donnée, & à qui les pratiques de Mr. Blondel ne soient connues, la Méthode de Mr. l'Abbé Deidier ne peut que leur être utile, & devient d'un usage infiniment commode par son extrême simplicité.

* I I I.

Sur le roidissement & le relâchement alternatifs des Cordes qui tirent un Fardeau.

Parmi des éclaircissémens que Mr. Fénel Chanoine de Sens nous a envoyés sur sa pièce N^o. 27, qui a pour devise, *Quando non potest fieri id quod vis, id velis quod fieri possit*, & qui a eu l'*Accessit* pour le prix que l'Académie a distribué cette année sur le Cabestan, il se trouve une observation curieuse sur le relâchement & le roidissement alternatifs des cordes qui traient un fardeau. Comme cette observation peut être utile tant pour ceux qui voudront travailler à l'avenir sur le Cabestan, qu'en général pour ceux qui s'appliquent aux Forces mouvantes, l'Académie a jugé à propos qu'il en fût donné un Extrait dans son Histoire.

Mr. Fénel ayant fait faire un grand Cabestan sur lequel il employoit des cordes de 5 pouces de pourtour, ou d'environ 19 lignes de diamètre, & qui étoient très longues, on attachà à l'extrémité de ces cordes un grand Traineau chargé de pièces de fer & de plusieurs grosses pierres. Le Cabestan viré par
quatre

quatre hommes, amena le Traineau avec une si grande facilité, que les hommes couroient en tournant plutôt qu'ils ne marchaient. Et comme Mr. Fénéel vouloit éprouver toute la force de sa Machine, il engagea six ou sept personnes qui étoient avec lui, à monter sur le Traineau par dessus tous les poids dont il étoit déjà chargé. Ces personnes s'aperçurent que le Traineau n'avançoit que par accès ou par facades, & non d'un mouvement continu. Il monta alors lui-même sur le derrière du Traineau, & prenant une perche qu'il fichoit en terre à chaque fois que le Traineau s'arrêtoit, il remarqua, 1. Qu'en effet le Traineau n'avançoit pas d'un mouvement continu, mais par accès & par secousses, quoique le Cabestan tournât sans cesse & extrêmement vite; & afin qu'on ne croie pas que l'inégalité du terrain étoit l'unique cause de cet effet, il avertit que cela se passoit sur * une * Pag. 156. Pelouse verte, dans une grande allée de jar-^{in 4.} din très unie.

2. Que les facades qu'on éprouvoit sur le Traineau devenoient d'autant plus courtes que la corde diminuoit davantage de longueur.

3. Que pendant les plus grandes longueurs de la corde, le Traineau parcouroit sept à huit pouces à chaque accès, après quoi il s'arrêtoit sensiblement, & que cet espace diminuoit par degrés jusqu'à n'être que d'un pouce, & encore moins lorsque le Traineau approchoit du Cabestan.

4. Que les intervalles de tems qui se trouvoient entre les accès du Traineau, étoient
d'au-

d'autant plus longs , que les espaces parcourus pendant les accès étoient plus grands , & qu'ensuite ces intervalles diminuoient de manière qu'à la fin , & le fardeau étant tout proche du Cabestan , les accès ou les espaces parcourus se confondoient presque entièrement , & donnoient à ceux qui étoient sur le Traineau , la sensation d'un mouvement presque uniforme & continu.

Comme Mr. Fénel trouva cette Observation nouvelle & remarquable , il fit réitérer l'épreuve deux ou trois fois , & elle eut toujours le même succès.

Mais ce ne fut pas tout , ayant eu la curiosité d'examiner ce qui se passoit dans la corde pendant la marche du Traineau , durant ses accès & ses repos alternatifs , il trouva qu'elle étoit dans un trémoussement continu , plus sensible vers son milieu que partout ailleurs , & qui se faisoit horizontalement , verticalement & presque en tous sens avec beaucoup de variété. Il ne falloit qu'y appliquer la main pour s'en convaincre : mais on y remarquoit sur-tout un balancement de haut en bas , & de bas en haut , c'est-à-dire , de véritables vibrations verticales qui surpassoient de beaucoup tous les autres , & avec lesquelles on ne laissoit pas cependant de discerner tous ses petits tremblemens.

Ce qui étoit encore remarquable , c'est que le Traineau n'avançoit que dans le tems précisément que la corde baissoit , ou que sa vibration verticale s'approchoit de la Terre , & jamais quand elle haussait. Mr. Fénel réitéra
cette

cette expérience * plusieurs fois en présence * Pag. d'une personne très intelligente, & la fit re-157. in 4^e marquer à tous ceux qui lui aidoient à faire l'épreuve de son Cabestan.

Il ne put mesurer exactement la durée des vibrations, ni la distance des accès par lesquels le Traineau avançoit, ne s'étant point préparé pour cela en se transportant sur les lieux, & n'ayant pu recommencer depuis les mêmes expériences.

Quoique l'explication du fait ne soit pas à beaucoup près aussi importante à savoir que le fait même, nous ne laisserons pas de rapporter là-dessus ce que nous croyons de plus vraisemblable.

1. Le plan le plus uni en apparence n'est, physiquement parlant, qu'un tissu de rugosités sur lesquelles un Corps pesant quelconque ne peut glisser sans y éprouver un frottement qui exige une certaine force pour être surmonté. 2. Nul Corps ne peut être mis en mouvement avec toute la vitesse de celui qui le pousse ou qui le tire, que par un effort proportionné à sa masse ou à son poids. D'où il suit, dans le cas posé, que la corde souffrira une tension & une extension considérables, avant qu'elle puisse tirer du repos & mettre en branle le fardeau qu'elle doit trainer; car ce fardeau est comme engrainé par les inégalités de sa partie inférieure avec les inégalités & les petits monticules du terrain, & il ne sauroit s'en dégager sans les briser ou sans être soulevé en partie avant que de glisser par-dessus. Il commencera donc à se mouvoir & à marcher vers le Cabestan où il est tiré & qui

qui est fixe, par une espèce de saut & de facade, dès que l'équilibre sera rompu, c'est-à-dire, dès que la force du roidissement de la corde viendra à surpasser la résistance de tous ces obstacles, du poids & des frottemens. Or il est clair que cette espèce de saut ne peut se faire sans une accélération sensible du mouvement du fardeau vers le Cabestan, & d'autant plus sensible que la résistance aura été plus longue & plus forte. Il n'est pas moins évident que de cette accélération du fardeau vers le Cabestan doit naître un relâchement subit dans la corde, & de ce relâchement un prompt abaissement * de toute cette partie de la corde par son milieu, ou, comme on l'appelle, par son *ventre*. Et voila sa facade ou sa vibration de haut en bas, dont la vitesse multipliée par son poids doit favoriser le mouvement, &, pour ainsi dire, la chute du fardeau vers le Cabestan. La facade ou vibration de la corde de haut en bas sera naturellement suivie d'une vibration de bas en haut, à la manière des cordes qu'on a pincées sur un instrument de musique, & celle-ci, comme l'a fort bien remarqué Mr. Fénéel, doit être d'autant moins forte pour tirer le fardeau, qu'au-lieu d'agir en conséquence du poids de la corde, comme la précédente, elle est même retardée par ce poids qu'elle a à vaincre. C'est aussi dans l'intervalle de ces deux vibrations contraires & pendant la dernière qu'il y aura un repos ou un retardement dans le fardeau, & d'autant plus long que l'accélération avoit été plus grande. Mais le virage du Cabestan allant toujours, & la corde

* Pag.
158. in 4.

de venant à recevoir une nouvelle tension & une nouvelle extension, il s'ensuivra un accès semblable à celui que nous venons de décrire, & par les mêmes causes, & ainsi de suite. Les effets en seront seulement plus subits ou de moindre durée, parce que la longueur de cette partie de la corde comprise entre le fardeau & le Cabestan diminue toujours en approchant de ce point fixe, & que, comme on fait, les vibrations sont proportionnées en durée à la longueur des cordes qui en font le sujet.

J'ai souvent observé de semblables vibrations dans la corde d'un bac, lorsque par sa longueur & par son poids, ou que n'étant pas assez tendue, elle s'enfonce dans le milieu d'une rivière. Car quoique le mouvement d'un fluide tel que l'eau, semble devoir être uniforme au même endroit de son cours, il y a toujours cependant mille causes d'irrégularité qui font que la corde qu'il pousse & qu'il tend, ne sauroit demeurer précisément dans le même état de tension & d'équilibre. Ainsi les bouts de cette corde qui sont hors de l'eau depuis la surface de la rivière jusqu'aux poteaux où ils sont attachés sur ses rives, doivent être & * sont en effet * Pag. 159. in 4.
dans un branle & un mouvement perpétuel de vibration qu'il est très aisé de remarquer. Je ne fais pas même si un pesant fardeau suspendu en l'air pendant qu'on le soulève par des poulies ou des mouffles, ne laisseroit pas apercevoir quelque chose de semblable, quoique moins sensible, dans la corde qui le soutient.

Quant aux vibrations partiales ou aux fré-

missemens qui se font sentir dans la corde lorsqu'on y applique la main, elles sont un effet nécessaire de son élasticité & du tremblement général & en tous sens que les vibrations totales occasionnent dans les parties insensibles, ainsi qu'il arrive aux cordes Sonores des instrumens de Musique, où l'on croit même que ce frémissement est la principale cause du son.

I V.

Sur les différentes Matières dont on peut fabriquer du Papier.

Quoique le Mémoire dont nous allons rendre compte tienne à plusieurs connoissances d'Histoire Naturelle, & sur-tout de Botanique, nous le rangerons cependant sous la classe de la Mécanique & des Arts, en ce qu'il a pour but de perfectionner & d'étendre une Manufacture des plus importantes du Royaume. C'est Mr. Guettard Médecin de la Faculté de Paris, fort versé dans la Botanique & dans l'Histoire Naturelle, qui l'a présentée cette année à l'Académie.

Le Papier que l'on fabrique dans nos Manufactures, est fait ordinairement avec des *drapeaux* ou vieux haillons de toile de Chanvre ou de Lin, autrement appelés *Chiffons*. De la finesse, de la consistance plus ou moins grande de ces chiffons, & des préparations différentes qu'on leur donne, dépend la différence de nos Papiers, soit en finesse, soit en force, soit en blancheur.

On

On s'est appliqué jusqu'ici à perfectionner la fabrique du Papier fait avec des chiffons ; mais il ne paroît pas qu'on se soit mis en peine de s'en procurer avec d'autres substances.

* Depuis quelques années cependant d'habiles ^{* Pag. 160.} Physiciens ont tâché d'étendre les vues que ^{in 4.} l'on pouvoit avoir sur la Papeterie : ils ont proposé d'examiner si avec l'écorce de certains Arbres , ou même avec du Bois qui auroit acquis un certain degré de pourriture, on ne pourroit pas parvenir à faire du Papier ; mais nous ne savons pas que personne jusqu'ici eût entrepris ce travail. Mr. Guettard est le premier qui ait formé le projet de le suivre, & il s'y est porté d'autant plus volontiers, qu'après quelques légères tentatives il a cru pouvoir en attendre une utilité plus prochaine.

Avant l'invention de notre Papier, qui n'est pas bien ancienne, on en faisoit en Orient avec le chiffon de toile de Coton, & avant celui-ci les Egyptiens préparoient la seconde écorce d'une espèce de Chien-dent connu sous le nom de *Papyrus*, dont ils tiroient du Papier, & dont le nôtre a retenu le nom. Plusieurs Auteurs rapportent encore que l'on fabrique une espèce de Papier avec l'écorce de certains Arbres, dans quelques lieux de l'Amérique & au Japon. Mais de tous les Peuples de la Terre celui chez qui le Papier paroît être le plus ancien, & à qui l'on pourroit par conséquent en attribuer l'invention avec plus de fondement, ce sont les Chinois. Ils en ont de tems immémorial, & de très beau. Ils y emploient le Chanvre, le Coton, la Soie, & des écorces d'Arbre dont la prin-

principale est celle de *Bambou*. Le célèbre P. Parrenin qui a fait part à l'Académie de mille curiosités naturelles de la Chine, toujours accompagnées de ses judicieuses & savantes réflexions, n'a pas oublié de nous parler des Arts qu'on y cultive avec le plus de succès, & parmi lesquels celui de la Papeterie tient un des premiers rangs. Il y a dix à douze années qu'il m'envoya plus de quarante sortes de Papier Chinois, toutes curieuses par quelque circonstance particulière. On y voit des feuilles d'une très grande beauté, & sur-tout d'une grandeur à laquelle toute l'industrie de nos Ouvriers n'a pu encore atteindre. Le Papier de la Chine a aussi cet avantage, qu'il est plus doux & plus uni que celui d'Europe: le pinceau dont les Chinois se * servent pour écrire, ne pourroit couler sur un fond tant soit peu raboteux, & y finir certains traits délicats.

* Pag.
161. in 4.

Mr. Guettard a donc été obligé de faire entrer dans le plan de son ouvrage, l'examen de toutes les matières dont on a fait du Papier, soit en différens tems, soit en différens pays, ou de celles qui leur sont analogues, & qu'on trouve en France & dans les autres pays de l'Europe.

Le chiffon de toile de Chanvre ou de Lin, n'est qu'un tissu de fibres ligneuses de l'écorce de ces deux Plantes, que les lessives & les blanchissages ont débarassé de plus en plus de la partie spongieuse que les Botanistes appellent *Parenchyme*. Mr. Guettard a d'abord examiné si ces fibres ligneuses n'étant encore que dans l'état où elles portent le nom de *filasse*,

ne

ne donneroient pas du Papier ; car par-là on rendroit utiles les Chenevottes mêmes ou le tuyau de la Plante dont la filasse a été séparée, & il est plus que probable que les filasses d'Aloès, d'Ananas, de Palmiers, d'Orties & d'une infinité d'autres Arbres ou Plantes, seroient susceptibles de la même préparation. La filasse de Chanvre simplement battue a produit une pâte dont on a formé un Papier assez fin, & qui pourroit se perfectionner.

Mais il faut avouer que nous ne sommes pas aussi riches en Arbres & en Plantes dont on puisse aisément détacher les fibres ligneuses, que le sont les Indiens de l'un & l'autre Hémisphère. Nous avons cependant l'Aloès sur certaines Côtes : en Espagne on a une espèce de *Sparte* ou de Genêt qu'on fait rourir pour en tirer la filasse, & dont on fabrique ces cordages que les Marins appellent *Sparton* ; on en pourroit donc tirer du Papier. Mr. Guettard en a fait avec nos Orties & nos Guimauves des bords de la Mer, & il ne désespère pas qu'on n'en puisse faire avec plusieurs autres de nos Plantes ou de nos Arbres même, sans les réduire en filasse.

Le raisonnement qui l'avoit conduit à fabriquer du Papier immédiatement avec la filasse, lui a fait essayer d'en tirer de même du Cotton, & il y a réussi. Il vouloit s'assurer par-là * si le duvet des Plantes étrangères pouvoit donner par lui-même une pâte bien conditionnée, pour travailler avec plus de sûreté sur les duvets de celles qui croissent chez nous, telles par exemple, que les Chardons, ou sur celles qui, quoiqu'étrangères, viennent fort

* Pag.
162. in 4.

bien dans notre Climat ; comme l'Apocyn de Syrie, &c.

La Soie de nos vers à Soie est d'un usage trop précieux , & n'est pas encore assez abondante chez nous pour être employée immédiatement à la fabrique du Papier ; mais nous avons une espèce de Chenilles qu'on nomme *commune* , & qui ne mérite que trop ce nom , qui file une très grande quantité de Soie. C'est sur cette Soie , tout au moins inutile jusqu'à aujourd'hui , que Mr. Guettard a fait ses expériences , & avec plus de succès qu'il n'eût osé l'espérer. Le Papier qu'elle lui a donné , a toute la force & toute la beauté qu'on pourroit désirer ; il ne lui manque qu'un peu plus de blancheur , qu'il ne sera peut-être pas impossible de lui procurer par d'autres préparations. Que ne fournit point la Nature quand on fait mettre en œuvre ses moindres présens , & tirer parti de ce qu'elle sembloit n'avoir fait naître que pour nous nuire ! Rien ne distingue mieux les Peuples policés des Peuples barbares.

Du reste Mr. Guettard ne s'est pas proposé d'avoir toujours par ces moyens & avec toutes ces matières , d'aussi beau Papier que celui dont nous nous servons pour nos écritures & pour l'imprimerie : on en fabrique tous les jours dans nos Manufactures qui lui est fort inférieur , & qui ne laisse pas d'être de grand usage dans le commerce. Il a voulu seulement nous faire sentir les avantages que nous pourrions retirer à cet égard , d'une infinité de substances que nous rejetons comme inutiles.

*MACHINES ET INVENTIONS *Pag. 163.
in 4.

APPROUVEES PAR L'ACADEMIE

EN M. D C C X L I.

MR. de Gensane déjà connu de l'Académie & du Public par plusieurs Ouvrages de Méchanique qui ont eu du succès, a présenté cette année à la Compagnie un Mémoire contenant la description des quatre Machines suivantes, savoir:

I.

Un Niveau construit de manière que ses pièces essentielles sont à l'abri de l'action du vent. Il consiste principalement en un Perpendicule chargé de deux miroirs un peu inclinés à la verticale, & sur lesquels les objets de dehors viennent se peindre à travers deux ouvertures garnies de glaces qu'on a ménagées à une boîte bien close qui renferme le tout, &c. Quoique les Niveaux à miroir ne soient pas une invention nouvelle, celui-ci a paru cependant fort bien imaginé par rapport au but que l'Auteur s'y propose; & l'on a cru en même tems que ce Niveau pourroit être aussi exact qu'aucun autre de pareil volume.

II.

Une Machine destinée à mesurer par une seule station, de petites distances inaccessibles.

K 4

III.

III.

Une manière d'employer sans roues, & par le moyen d'un tuyau garni d'un piston & d'une double soupape, l'eau d'une source qui auroit une certaine chute, pour faire mouvoir des Pompes. L'idée a paru nouvelle, & pouvoir être mise utilement en pratique.

IV.

Un moyen de substituer aux Manivelles coudées, des espèces de Lanternes qui, avec
 * Pag. 164. in 4. des aiguilles garnies de plans * inclinés qu'on leur oppose, font jouer alternativement, également & sans aucun saut les Pompes auxquelles on les applique, comme Mr. de Genfane l'a exécuté avec succès aux Mines de Pontpéan en Bretagne. Cette Machine pourra principalement être employée toutes les fois que les Manivelles coudées auxquelles on la substitue, seroient de difficile exécution, ou exigeroient des sommes considérables pour être construites.

V.

L'incendie arrivé au Louvre le 24 Mars de l'année dernière 1740, a réveillé l'attention du Public sur les moyens de prévenir de semblables malheurs, ou d'en rendre les suites moins funestes. Dans cette vue, on n'a rien imaginé qui pût être plus sûr ni plus expéditif, que de se procurer dans chaque maison à la Ville & à la Campagne, une ou plusieurs Pompes capables de remédier sur le champ au désordre. Alors quelques pintes d'eau dardées à propos sur l'endroit embrasé, feront sûrement plus d'effet que des muids d'eau qu'on y jetteroit après que l'incendie est devenu

venu plus considérable. Le même Mr. de Gensane nous a encore présenté un projet de Pompes très propres à remplir ce dessein, & dont l'exécution est simple, facile & de médiocre dépense : en voici la construction. Deux corps de Pompe sont placés à côté l'un de l'autre dans un bacquet qui leur fournit l'eau, & communiquent tous deux à un réservoir fermé de toutes parts. Ce réservoir est plein en partie de l'eau que les Pompes y fournissent & en partie d'une quantité d'air, qui étant comprimé par l'eau que les Pompes y chassent, la comprime aussi à son tour, & la force à s'échapper par un tuyau qui trempe dans l'eau & qui lui donne issue vers le côté où la main de celui qui dirige la Pompe veut la porter ; car ce tuyau est formé d'un cuir flexible qui se termine par une espèce de canule de métal. Les pistons des Pompes sont mus avec des balanciers qui sont levés & abaissés par les dents d'une lanterne, à l'axe de laquelle est attachée une manivelle que l'on fait tourner à la main. Ces sortes de Pompes qui * agissent par le ressort de l'air étoient déjà connues (a) ; mais une Machine peut être regardée comme nouvelle, ou par ce qui en fait le fonds, ou par la forme qu'on lui donne relativement à certains usages auxquels on la destine, & celle-ci est dans ce dernier cas. Du reste Mr. de Gensane a calculé qu'une de ses Pompes mue par un seul Homme, pouvoit élever à 35 ou 40 pieds de hauteur environ 53 pintes d'eau par minute.

VI.

(a) Voyez les Mémoires de 1725, page 50.

VI.

Un modèle de Cheminée de Mr. de Lagny, dans lequel il procure le moyen d'y éteindre le feu en ôtant la communication de l'air extérieur & de celui de la chambre avec le tuyau. Il met une Plaque de fer au haut de l'intérieur de la Cheminée & une autre en bas, placées horizontalement, & portant chacune deux tourillons ou gonds. On fait hauffer ou baiffer la Plaque d'en-haut par le moyen d'une petite chaîne qui passe sur une poulie appliquée sur le devant de la Cheminée & qui descend jusqu'en bas, en sorte que la Plaque puisse fermer exactement toute l'ouverture quand on tire la chaîne. La Plaque qui est en bas vers le manteau de la Cheminée peut aisément être abaissée ou haussée avec la main ou avec un bâton à crochet. Il n'y a pas de doute qu'il n'entende mettre un quarré ou quadre de fer, tant en-haut qu'en-bas, afin que les Plaques puissent bien joindre contre, & ne laisser aucun passage à l'air. Cette manière d'éteindre le feu des Cheminées a paru fort bonne, extrêmement simple, & nullement embarrassante.

V I I.

Un Lit pour les Malades & Impotens, dans lequel on a ménagé plus de commodités qu'en aucun autre qui soit connu ; inventé par le Sr. Hannot Menuisier.

V I I I.

Un Moulin proposé par les Srs. Claude-François & Jean-Claude du Bost frères, destiné à être mu, soit par la force du vent, soit par celle de l'eau.

Comme

Comme Moulin à vent , & par sa forme extérieure , il * est assez semblable à ceux * ^{Pag. 166.} qui sont connus sous le nom de Moulins à ^{in 4°} la Polonoise ; mais il en diffère à plusieurs égards.

Car 1. dans les Moulins à la Polonoise les plans des ailes sont dirigés vers l'axe ou arbre vertical de la roue ailée , & sont continués jusqu'à cet axe où se trouve la section commune de toutes les ailes ; au-lieu que dans le modèle de Mrs. du Bost les ailes font un angle de 22 degrés $\frac{1}{2}$ avec les rayons de la roue , & se terminent en dedans à une circonférence de moitié plus petite que celle de cette roue , de manière que la roue elle-même est faite à peu-près comme les cages ou tours rondes des Moulins à la Polonoise.

2. Dans les Moulins à la Polonoise l'arbre de la roue est d'une seule pièce , & toutes les parties de cette roue étant fermement arrêtées à l'arbre , elle se meut nécessairement toute entière ; au-lieu que la roue du Moulin de Mrs. du Bost est divisée en trois parties dans sa hauteur , & ces trois parties se peuvent mouvoir séparément , ou deux ensemble , ou toutes trois à la fois , ou s'arrêter par le moyen de trois freins disposés à cette intention. Ainsi l'on pourra ménager à volonté la force du vent , & empêcher que les meules ne soient emportées avec trop de rapidité.

3. L'inclinaison des ailes de la roue aux rayons , & le vuide qui est au milieu en forme de cylindre ou de tour creuse , fait que le vent peut frapper le plus d'ailes qu'il est

possible, & que presque tout le vent réfléchi sous différens angles d'incidence est mis à profit, ce qui permet à la roue de tourner, si l'on veut, en plein air & sans le secours de la tour extérieure où elle est renfermée; avantage que l'on n'a pas dans les Moulins à la Polonoise qui ont été imaginés jusqu'ici. La roue de ce Moulin se trouve donc par-là & par la tour qui l'environne, à l'abri des accidens que peuvent causer de violens coups de vent; autre propriété que n'ont pas les Moulins à la Polonoise ordinaires, dont les volans sont exposés à toute la violence du vent, & sont souvent emportés par des ouragans.

* Pag. 167. in 4 Du reste le Moulin de Mrs. du Bost a, comme tous les * autres Moulins à la Polonoise, l'avantage d'une meule attachée à l'arbre de la roue & sans aucun engrenage, d'où il résulte beaucoup moins de frottemens & un entretien plus facile.

Comme Moulin à eau, la roue de celui-ci se trouvant entièrement submergée, fera à l'abri des accidens causés par les glaces ou par les autres corps flottans qui viendroient la choquer. Aussi Mrs. du Bost proposent-ils de placer ces roues moitié couvertes à l'issue, par exemple, des arches d'un Pont, & derrière une de ses piles; au moyen de quoi l'arbre même seroit totalement hors d'atteinte. De plus on seroit dispensé d'élever la roue dans les grandes crues d'eau, pendant lesquelles ce Moulin iroit aussi-bien que dans les hauteurs d'eau médiocres.

Il est vrai que si ces Moulins sont à l'abri des

des glaces & des inondations , ils ne feront presque d'aucun usage dans les grandes sécheresses & les basses eaux ; car quand une fois la roue commencera à se découvrir, elle perdra d'autant plus de sa force qu'il demeurera plus de parties de sa hauteur à sec.

Mais malgré cet inconvénient, & quoiqu'en général les roues horizontales des Moulins à eau ne soient pas nouvelles , l'Académie a jugé que ce Moulin pouvoit devenir très utile par la construction de sa roue & par la disposition de ses ailes, sur-tout si l'on a attention à ne le placer que dans des endroits où il y ait toujours un courant d'eau assez profond pour en tenir la roue submergée, & si l'on prend les précautions nécessaires pour empêcher que le retardement de la rapidité de l'eau, causé par cette roue, n'occasionne des atterrissemens qui en gêneroient ou en arrêteroient le mouvement.

IX.

Un Moulin à bras & portatif de Mr. Mansard Architecte du Roi, & Membre de l'Académie d'Architecture. Ce Moulin qui ne diffère des Moulins ordinaires que par le peu d'espace qu'il occupe & par la disposition des parties * qui le composent, est établi dans une espèce de cage de charpente de 5 pieds de longueur sur 4 pieds de largeur. Deux manivelles font tourner un essieu de fer qui porte un rouet de bois , & ce rouet est engrené dans une lanterne dont l'axe fait tourner une meule de 3 pieds de diamètre. Dans deux expériences qui en ont été faites, quatre hom-

*Pag. 168.
in 4.

mes qui se relaient deux à deux, ont moulu trois boisseaux de froment en 25 minutes; d'où l'on peut conclurre que ce Moulin moulera près de huit boisseaux de pareil grain par heure; ce qui, en bien des rencontres, peut être d'un grand secours. Il n'est pas moins important pour le public d'être informé de tous les avantages qu'il peut tirer des anciennes inventions & des richesses qu'il possède, que d'en acquérir de nouvelles.

X.

L'Art d'imprimer des Tableaux ou des Estampes colorées. Cet Art que le Sr. Christophe le Blond se propose d'exercer, & pour lequel il a déjà obtenu en 1739 des Lettres patentes portant privilège exclusif pour 20 années, a paru d'une grande utilité par rapport aux Livres d'Anatomie, de Botanique & d'Histoire Naturelle, où l'on pourra représenter les objets avec leurs véritables couleurs. Ce qu'il y a de singulier, c'est que tout cela s'exécute avec trois planches, & avec les trois couleurs *Rouge, Jaune & Bleu*, qui par leur mélange produisent toutes les autres couleurs.



* E L O G E

* Pag.
169. in 4.

DE Mr. PETIT, Médecin.

FRANÇOIS POURFOUR DU PETIT naquit à Paris le 24 Juin 1664, de parens qui étoient dans le commerce, & qu'il perdit étant encore enfant. Les personnes qui furent chargées de son éducation trouvèrent en lui un obstacle presque invincible à ses premières études, un défaut de mémoire qui se montrait également par la difficulté d'apprendre, & par celle de retenir. Ce ne fut qu'à force de travail & par les soins de quelques-uns de ses Maîtres, dont il ne laissa pas de gagner l'affection, qu'il fit ses basses classes. Il éprouva les mêmes difficultés en Seconde & en Rhétorique; sa mémoire toujours indocile ne le servoit pas mieux pour les règles de Poésie & pour les préceptes d'Eloquence, qu'elle avoit fait pour les mots latins & pour les leçons de Grammaire; mais il s'obstinoit de même à les étudier, comme par pressentiment de ce qui devoit les suivre. C'est de cette manière laborieuse & tardive que Mr. Petit vint à bout d'apprendre assez de Latin & de Belles-Lettres pour pouvoir monter en Philosophie.

La Logique & la Métaphysique par où l'on a coutume de commencer la Philosophie, n'eurent

rent pour lui aucune sorte d'attrait; il ne voyoit encore là que des mots à apprendre. Mais enfin la Physique parut, & à sa vue toutes les facultés de l'ame du jeune Etudiant s'ouvrirent pour la recevoir; son esprit saisit, sa mémoire garda tout ce qui lui fut présenté par la Physique, & il se trouva tout à coup une facilité à comprendre & à retenir, dont la découverte fut sans doute la plus flatteuse qu'il ait faite de sa vie.

* Pag. 170. in 4 C'est donc à la Physique, mais à la Physique de Descartes, & à la partie expérimentale de cette Physique, que Mr. Petit * fut redevable d'une si heureuse révolution; car il lui falloit des expériences, des faits & du mécanisme; & toute autre manière de philosopher eût été encore pour lui un langage intelligible. C'en étoit fait de notre Académicien s'il avoit rencontré la Philosophie d'Aristote, telle qu'on la dictoit en ce tems-là; mais heureusement il trouva dans le Collège de Beauvais, où il étudioit, un Professeur de Philosophie Cartésien, & de plus, assez hardi ou assez adroit pour enseigner les Principes de Descartes, malgré les défenses expresses qu'il y avoit alors sur ce sujet.

Mr. Petit n'eut pas plutôt fini ses études, qu'il lui prit envie de voyager. La modicité de son revenu ne l'arrêta pas; il savoit déjà en tirer parti avec ordre & économie. Il parcourut ainsi presque toutes les Provinces du Royaume, & une grande partie de la Flandre, & toujours en Physicien, observant partout la Nature, & recherchant avec soin le commerce des Savans qui l'avoient observée;

car

car des Savans, selon lui, c'étoient des Physiciens ou des Naturalistes, & sur-tout des Cartésiens. Il ne voyoit rien hors delà qui méritât ce titre; & il est vrai que si quelqu'un pouvoit être excusable de borner ainsi le savoir au seul objet de ses recherches & la saine Philosophie à ses opinions particulières, Mr. Petit l'eût été plus qu'un autre; après l'espèce de miracle que la Physique Cartésienne venoit d'opérer en sa personne.

Le peu qu'il avoit appris d'Histoire Naturelle, de Chymie & d'Anatomie au Collège de Beauvais, avoit fait une grande impression sur son esprit, & le rapport que ces connoissances ont naturellement avec la Médecine, l'avoit lié par préférence avec des Médecins. Un de ceux avec qui la liaison devint le plus intime, & dont il retira aussi le plus d'instruction, fut Mr. Blondin établi à la Rochelle, bon Cartésien, qui avoit une Bibliothèque choisie, un Jardin de Plantes médicinales, & un Cabinet de Curiosités naturelles. Mr. Blondin lui apprit l'Ostéologie sur un Squelette humain, lui montra la position des Viscères, l'anatomie du Cerveau, celle des Yeux & de l'Oreille, tant sur l'Homme que sur divers Animaux, & finit * par lui ^{* Pag. 171;} conseiller de se faire Médecin. Mr. Petit y ^{in 4.} étoit déjà assez porté, & il se détermina aisément à embrasser une profession dont l'étude & l'exercice s'accordoient si bien avec ses occupations les plus chéries. Il partit pour Montpellier vers la fin de 1687, année où Mr. Chirac, devenu depuis si célèbre, & Membre de l'Académie des Sciences, commençoit

mençoit d'enseigner dans cette ville les différentes parties de la Médecinè. Mr. Petit les étudia sous lui ; il trouva du tems encore pour y faire un cours de Chymie, & ayant enfin reçu le bonnet de Docteur, il revint à Paris, en 1690, âgé de 26 ans.

Deux grands Maitres donnoient alors des leçons publiques dans le Jardin du Roi. Mr. Duverney y enseignoit l'Anatomie, & Mr. de Tournefort la Botanique ; pendant que feu Mr. Lémery, qui ne se distinguoit pas moins dans la Chymie, enseignoit cette Science avec un applaudissement général dans son propre Laboratoire, & y attiroit une foule d'Auditeurs de tous états. Mr. Petit fut assidu aux Cours tant publics que particuliers de ces trois Hommes fameux, & s'acquit bientôt leur estime & leur amitié ; il diséquoit, il opéroit & il herborisoit tour à tour avec eux. Il voulut aussi être particulièrement au fait de la Chirurgie, c'est-à-dire, se mettre en état de la pratiquer ; car c'étoit là sa manière d'étudier les théories susceptibles de pratique. Et soit qu'il eût inspiré le même gout à Mr. de Tournefort, ou que Mr. de Tournefort sentît assez par lui-même combien il importe au Médecin de connoître à fond les opérations chirurgiques, ils allèrent tous les deux pendant six mois faire les pansemens des blessés à l'Hôpital de la Charité.

Les années 1691 & 1692 se passèrent dans ces exercices. C'étoit le fort de la guerre commencée en 1688, & la Flandre, où Louis XIV en personne venoit d'assiéger & de prendre Namur, en étoit le principal théâtre. Une
armée.

armée de cent mille hommes y offroit abondamment à Mr. Petit de quoi mettre en œuvre ses connoissances, & en même tems de quoi les augmenter. Il se présenta pour aller servir * dans les Hopitaux du Roi destinés à cette armée; il fut agréé, & il partit le 1 d'Avril 1693. La bataille de Nerwinde & le siège de Charleroi suivirent de près son départ. Il fut d'abord établi dans l'Hopital de Mons avec Mr. Brisseau Médecin qui en avoit la direction, & qui lui céda peu de tems après plusieurs malades pour lesquels il fut couché sur l'Etat. Il fut chargé à diverses reprises de l'Hopital de Namur, & il étoit enfermé dans cette Place lorsque les Alliés en firent le siège & la reprirent sur la France en 1695; il passa ensuite à l'Hopital de Dinant. Partout il donna des preuves de son zèle, de son désintéressement & de sa capacité. Des blessés & des malades sans nombre lui étoient amenés de toutes parts, & il montrait parfaitement par son exemple, combien il est à désirer dans ces occasions pressantes, que le Médecin & le Chirurgien se réunissent ou ne fassent qu'un, à la manière des Anciens. Mr. Petit procura mille biens sous cette double fonction.

La grande connoissance qu'il avoit acquise des Plantes & des Drogues médicinales, & plus encore son inflexibilité à n'en souffrir que de bien conditionnées dans les Hopitaux qui lui étoient confiés, n'y furent pas moins utiles; mais elles pensèrent le perdre plus d'une fois. Parmi les Commissaires & les Entrepreneurs pour l'achat & l'entretien des remèdes & des vivres dans les Hopitaux d'armée, il

ne

ne se rencontre que trop souvent des hommes qui sacrifieroient sans pitié à leur intérêt des milliers d'autes hommes, l'armée & l'Etat. Mr. Petit qui étoit devenu leur fléau, ne pouvoit manquer de se voir bientôt exposé à leurs traits. On tenta tous les moyens de noircir sa conduite, ce qui n'étoit pas facile, ou du moins de traverser ses desseins, de l'inquiéter & de le rebuter; mais il eut le bonheur de trouver des Supérieurs éclairés, qui reconnurent sa probité & qui louèrent sa sévérité; les Commissaires infidèles ou suspects furent chassés. Toujours protégé, secondé par Mrs. de Bagnols & Voisin, l'un Intendant de la Flandre, l'autre du Hainaut, & tous deux si capables d'entrer dans des vues utiles, Mr. Petit * faisoit établir dans les Hopitaux mêmes des Laboratoires de Chymie & des Chambres d'Anatomie; il exerçoit en même tems ses Elèves à connoître les Plantes, à les cueillir & à les préparer dans la saison & dans les circonstances les plus convenables, soit pour en tirer des remèdes, soit pour les garder & en faire un sujet d'étude. C'est ainsi qu'il assemble dès-lors & qu'il dessécha un grand nombre de Plantes, qui firent le commencement d'un Herbar de trente gros Volumes in folio qu'il a laissés.

Il revint à Paris après la Paix de Ryswick en 1697, & il se rendit l'année suivante au camp de Compiègne où il fut chargé des malades avec Mr. Prouvenza Médecin Inspecteur des Hopitaux, & comme lui grand amateur de la Botanique. Mr. Petit reçut de Mr. Prouvenza dans cette occasion & dans plusieurs autres, des marques d'estime & d'amitié

tié qu'il voulut reconnoître d'une manière conforme à leur commun penchant. Il s'étoit engagé de nouveau à servir dans les Hopitaux de Flandre, lorsque la succession à la Couronne d'Espagne ralluma la guerre en Europe. Comme il s'acheminoit vers Ruremonde où il avoit été appelé, & qu'à son ordinaire il herborisoit sur sa route, il aperçut au bord d'une petite rivière tout proche de Wert dans le Comté de Horn, une Plante dont les feuilles étoient de la couleur du Plantin, mais d'une figure fort différente. L'ayant examinée de plus près, il l'a trouva aussi d'un caractère qui ne ressembloit à aucun des Genres rapportés dans les Institutions de Botanique, & il la nomma sur le champ *Prouvenzalìa*. Il en a nommé une autre *Dantia*, du nom de Mr. Danti d'Isnard, Membre de cette Compagnie, qui lui avoit beaucoup aidé à la composition de son Herbar. C'est ainsi qu'en ont souvent usé les Astronomes en faveur de leurs amis ou de leurs protecteurs, lorsqu'ils ont découvert quelque nouvel objet dans le Ciel; & si l'on est sensible à voir transmettre son nom à la postérité, on doit assurément être flatté de le trouver écrit sur des monumens si durables.

Mr. Petit demeura à Ruremonde, à Bruxelles & dans * quelques autres villes des Païs-Bas pendant tout le cours de cette guerre, & il nous suffira de dire qu'il s'y acquitta de ses devoirs comme dans la précédente; même application à servir, à s'instruire & à instruire ceux qui servoient sous lui; mêmes succès suivis des mêmes éloges.

Il se fixa enfin à Paris après la paix d'Utrecht

trecht en 1713, & il s'y maria en 1717. Content d'une petite fortune qui étoit moins son ouvrage que la suite naturelle de ses services, il ne songea nullement à l'augmenter, & à se faire dans cette Capitale des pratiques utiles que sa réputation lui eût attirées s'il avoit voulu l'accompagner de quelques soins. Mais l'étude du cabinet, la Physique & les expériences l'emportèrent sur les sollicitations de la Fortune. Résolu désormais de consacrer tout son loisir à ce premier objet de ses inclinations, & comptant s'en être aquis le droit par ses travaux passés, il tourna uniquement ses vues & ses desirs vers l'Académie des Sciences. C'est là en effet qu'il alloit retrouver non le Cartésianisme, mais l'esprit de Descartes, l'amour des expériences, & toute l'ardeur que ce Philosophe fit paroître pour s'en procurer le secours, sa circonspection dans leur choix, sa manière de les expliquer & de raisonner sur les Phénomènes de la Nature, toujours par le seul mécanisme, soit qu'il s'y montre, soit qu'il s'y cache; en un mot l'esprit de doute & de discussion qui caractérise son immortelle méthode & cette Académie: ou plutôt c'est là que Mr. Petit alloit voir Descartes préféré par les uns, Newton par les autres, & plus souvent Descartes associé à Newton, à Leibnitz, à Aristote même, & à tous les grands génies dont les méditations & les veilles ont enrichi l'esprit humain de quelque nouvelle connoissance.

Il se présenta donc pour entrer à l'Académie en 1722, il y fut reçu, & trois ans après il y obtint la place de Pensionnaire Anatomiste

mise vacante par la Vétérance de Mr. Duverney.

Une vie presque toujours ambulante & des fonctions jusqu'ici opposées au recueillement nécessaire pour la composition des Ouvrages, n'avoient pas empêché Mr. Petit de * publier * Pag. 175 in 4.
en 1710 trois Dissertations en forme de Lettres, qui furent imprimées à Namur sous le titre de *Lettres d'un Médecin des Hopitaux du Roi à un autre Médecin de ses amis*. Il n'en fit tirer que 200 Exemplaires, ce qui a rendu cet ouvrage infiniment rare, & qui nous engage à en donner une idée. C'est un petit in 4°. rempli de faits, d'observations & d'expériences, qui peint parfaitement les occupations parmi lesquelles il a été enfanté & dont il est le fruit.

La première, & sans difficulté la plus importante de ces Lettres, contient un nouveau système du Cerveau. Ce système a pour objet l'entrelacement de plusieurs nerfs ou filets médullaires, qui partent de la moelle allongée; & qui passent obliquement de l'épaisseur de l'une de ses portions latérales dans l'épaisseur de l'autre portion. L'Auteur démontre la nécessité de cette mécanique par cinq observations principales accompagnées d'un grand nombre d'autres, & il en établit la réalité par l'inspection même de la moelle allongée, dont il donne des figures d'après les dissections qu'il en a faites. Ce n'est pas seulement de nos jours que cet entrelacement de nerfs a été soupçonné & admis par d'habiles Anatomistes; Cassius & Arétéeus, très anciens Médecins, & qui vivoient vers le commencement

ment du premier siècle, ont cru que les nerfs s'entrelaçoient à leur origine, & se croisoient de manière que ceux du côté droit passoiént au côté gauche, & ceux du côté gauche passoiént au côté droit. Eh! comment expliquer sans cela cet accident si ordinaire après certaines blessures, où certains coups reçus à un côté de la tête sont presque toujours suivis de la paralysie du bras ou de la jambe du côté opposé. Mais il y a loin souvent du simple soupçon & de la raison de convenance, à la vérification & à la certitude du fait. C'est en ce sens, & Mr. Petit en avertit lui-même, qu'on peut bien appeller nouveau un système qui n'avoit passé jusqu'alors que pour une conjecture dans l'esprit de quelques Auteurs, & qui est présentement fondé sur des preuves solides, & sur une structure du Cerveau qu'il nous a dévoilée. C'est en effet le témoignage que lui rendent nos plus habiles * Anatomistes, & c'est principalement sur ce témoignage, & en considération de cette découverte que Mr. Petit fut reçu à l'Académie des Sciences.

* Pag.
176. in 4

Sa seconde Lettre n'est presque qu'une suite de la première. Il y traite encore du Cerveau; il examine d'où viennent les esprits qui produisent le sentiment, s'ils partent du Cervelet, ou seulement de quelque endroit de la moelle allongée. Ce fluide subtil, cette espèce de matière éthérée capable de se porter avec rapidité du Cerveau dans les parties pour y produire le mouvement, ou des parties dans le Cerveau pour y exciter les sensations, est ce que tous les Anatomistes ont nommé *esprits animaux*. Quelques-uns les composent d'Air &

& de Nitre, quelques autres les font consister en des corpuscules salins volatils de la nature de l'esprit de Sel armoniac, ou volatils sulfureux, tels que ceux de l'esprit de Vin, & enfin il y a eu & il y a encore d'habiles Anatomistes qui en ont tatalement nié l'existence: ample matière aux expériences chymiques sur le sang des Animaux, & l'on peut s'assurer que Mr. Petit ne les a pas épargnées. Elles le conduisent presque toujours à la négative, ou pour le moins au doute & à l'incertitude sur toutes ces questions. Ses expériences ne sont pas plus favorables au système des acides & des alkalis, qu'on l'avoit engagé à examiner par cette autre question: *Si les esprits animaux fermentent avec quelque partie du sang pour faire la contraction des muscles, & si cette partie du sang est acide ou alkaline.* Rien ne lui paroît plus suspect que les raisonnemens fondés sur ces prétendues fermentations d'acides & d'alkalis dans le Corps humain, ni plus dangereux que de s'en faire un principe dans la pratique des maladies. Il préparoit ainsi, & peu s'en faut qu'il n'annonçât la chute d'un système entierement banni aujourd'hui de la Médecine, mais qui régnoit encore alors avec toute l'autorité d'une opinion à la mode.

La troisième Lettre a pour but l'établissement de quelques nouveaux genres de Plantes où la *Prouvenzalia* & la *Dantia* ne sont pas oubliées, & une critique de quelques * endroits des Elémens ou Institutions de Botanique de Mr. de Tournefort qui étoit mort depuis deux ans, & dont Mr. Petit reconnoît

Hist. 1741.

L

tou-

* Pag. 177. in 4.

toujours les rares talens & la supériorité dans cette Science.

Nous passerons plus succinctement sur les Ouvrages qu'il a fait imprimer avec nos Mémoires, qui sont entre les mains de tout le monde.

Ces Ouvrages sont cependant assez considérables par leur objet & par leur nombre. La Physique expérimentale, l'Anatomie, la Chymie, & même un peu de Physique raisonnée & systématique, y paroissent tour à tour. Ce qu'il a fait sur l'ascension des liqueurs dans les tuyaux capillaires, & sur la cause des végétations salines, est de ce dernier genre. Mais la plus grande partie des Mémoires qu'il a donnés depuis son entrée à l'Académie, roule sur la description anatomique des Yeux de l'Homme & de divers Animaux, sur les dimensions exactes & portées à une précision scrupuleuse des parties qui les composent, sur la nature, les causes & l'opération de la Cataracte, & en général sur tout ce qui concerne la mécanique de l'Œil & la Vision.

Il avoit imaginé & fait construire un *Ophthalmomètre*, instrument destiné à mesurer les parties de l'œil, & plusieurs autres Machines pour constater ce qu'il avançoit sur toute cette matière, ou pour diriger la main de ceux qui ont à opérer sur cet organe délicat. Une des plus importantes à ce dessein étoit un globe de verre creux représentant au naturel un œil dont le CrySTALLIN est cataracté; car on fait aujourd'hui, & Mr. Petit n'a pas peu contribué à mettre ce fait hors de doute, que ce que l'on appelle communément la cataracte,

&

& qu'on attribuoit autrefois à une pellicule membraneuse qui se formoit dans l'œil, n'est presque jamais qu'une altération ou une maladie du CrySTALLIN, un épaississement, & l'opacité qui s'en ensuit. Ce que l'âge a coutume d'ôter de clarté à la vue, ne vient aussi pour l'ordinaire, selon Mr. Petit, que du changement arrivé à cette partie qui se colore de plus en plus; & il nous fit voir un jour dans une de nos Assemblées, quarante* ou cinquante ^{*Pag. 178} CrySTALLINS de tous âges, dont la substance alloit de plus en plus en jaunissant, & la transparence en diminuant par degrés insensibles depuis l'enfance jusqu'à l'extrême vieillesse. ^{in 4.}

C'est donc sur cette partie qu'il faut opérer, c'est le CrySTALLIN qu'il s'agit d'abattre, non cette prétendue membrane qui n'existe presque jamais. Or l'œil artificiel dont nous venons de parler, & qui est fort grand, a été construit de manière qu'avec une aiguille proportionnée on y fait toute l'opération de la Cataracte, & qu'on voit au travers du verre la courbe qu'il faut faire décrire au CrySTALLIN en l'abattant, pour n'endommager que le moins qu'il est possible des parties qui l'environnent.

Aidé par tant de secours, armé de tous ces instrumens que la connoissance exacte des parties lui avoit suggérés, aimant d'ailleurs à opérer, & s'y étant exercé toute sa vie, on peut juger que Mr. Petit ne dédaigna pas de pratiquer lui-même ses leçons. Il mit la main à l'œuvre, & ce fut presque toujours avec le succès qu'on en devoit attendre, & qu'il s'étoit préparé par ses soins & par ses recher-

ches. Il en a eu quelquefois pour témoins des personnes aussi illustres par leur savoir, que respectables par leur dignité. Au mois d'Avril 1726 étant à Fresnes chez Mr. le Chancelier, il abattit en sa présence les Cataractes à une fille âgée de 60 ans qui y étoit venue de Meaux; la malade fut parfaitement guérie en trois jours, elle s'en retourna à cheval, & elle voit encore aujourd'hui.

Malgré ces succès Mr. Petit se rendoit chaque jour plus difficile à entreprendre l'opération de la Cataracte, & dans ses dernières années il ne la pratiquoit guère que sur les pauvres, à qui il procuroit, avec la vue, tous les secours que sa compassion naturelle & la charité chrétienne pouvoient lui inspirer; car outre mille inconvéniens, quelquefois inévitables, qui se rencontrent dans cette opération par la disposition accidentelle des malades, leur peu d'exactitude à observer le régime qu'il avoit coutume de leur imposer, l'en avoit souvent rebuté.


* Pag. 179. in 4. * Sa théorie & sa méthode sur ce sujet furent attaquées par Mr. Hecquet dans son Traité des maladies des yeux, & dans quelques autres Ouvrages de ce savant Médecin. Mr. Petit répondit solidement à ses objections par des Lettres qu'il fit imprimer en 1729, & qui ne contiennent d'ailleurs qu'une extension & une explication de ce qu'il avoit avancé là-dessus dans les Mémoires de l'Académie.

Sa manière d'écrire étoit négligée & sans aucun agrément, il n'avoit jamais su ou voulu savoir ce que c'étoit que de limer un Ouvrage; il auroit peut-être trop regretté le tems qu'il

qu'il en conte, & il faut convenir que le genre auquel il s'étoit principalement attaché, avoit peu à perdre par ces sortes de négligences. Renfermé dans les faits, il dénombreoit & il détailloit, rarement il discutoit; occupé à découvrir & à voir, il rapportoit ce qu'il avoit vu, & dans l'ordre qu'il l'avoit vu, toujours avec beaucoup de fidélité & de candeur; car il aimoit souverainement la vérité, & il ne souffroit qu'avec peine tout badinage qui lui paroïssoit la blesser, quelque ingénieux qu'il pût être.

Le 3 Juin de cette année il tomba malade d'une hernie qu'il avoit depuis longtems. Le 8 jour de sa maladie on lui fit une opération qui dura 16 minutes, & qu'il souffrit avec une constance peu commune. Il mourut le 18 du même mois avec des sentimens de Religion & de piété dont la naissance n'étoit point due aux approches de la mort, mais à la conviction des vérités qui avoient fait la règle de sa vie.

De quatre enfans mâles qu'il avoit eus de son mariage il ne reste que l'ainé qui a embrassé la même profession que son père, & qui nous a déjà donné des preuves qu'il pourra un jour lui succéder dans cette Compagnie.



* Pag.
180. in 4

* E L O G E

DE Mr. LE CARDINAL DE POLIGNAC.

MELCHIOR DE POLIGNAC, Cardinal Prêtre de l'Eglise Romaine, du titre de Sainte Marie des Anges, Abbé de Corbie, d'Anchin, de Bonport, de Mouzon & de Bé-gard, Archevêque d'Auch, Primat de la No-rempopulanie, Commandeur des Ordres du Roi, naquit au Puy Capitale du Velay en Lan-guedoc, le 11 Octobre 1661. Il étoit se-cond fils de Louis-Armand Vicomte de Po-lignac, Marquis de Chalancon, Gouverneur du Puy, Chevalier des Ordres du Roi, & de Jacqueline de Beauvoir-Grimoard-de-Roure sa troisième femme.

La Maison de Polignac étant une des plus connues & des plus illustres du Royaume, nous nous dispenserons d'en relever ici l'an-cienneté, l'éclat & les alliances.

Six mois après que Mr. le Cardinal de Po-lignac fut venu au monde, il éprouva le sort de quelques-uns des plus fameux Héros de l'an-tiquité, & il en courut tous les dangers, il fut exposé. Il étoit nourri à la campagne: sa nourrice qui étoit fille, & qu'une première faute n'avoit pas rendu plus sage, en fit une seconde. Dans cet état qu'elle ne put long-tems

tems cacher, frappée de tout ce qu'elle avoit à craindre, elle s'enfuit vers la fin du jour & disparut, après avoir porté l'enfant sur un fumier, où il passa toute la nuit. Heureusement c'étoit dans la belle saison; on le retrouva le lendemain, sans qu'il lui fût arrivé aucun accident.

Son corps formé par les graces, l'esprit, la vivacité jointe à la douceur que cet enfant fit bientôt paroître, ajoutèrent des motifs plus solides à l'intérêt qu'une semblable aventure faisoit naître en sa faveur, & le rendirent infiniment cher à ses parens. Mr. le Vicomte de Polignac, qui le destinoit à * l'Eglise, l'a-^{*Pag. 181.} mena de bonne heure à Paris, & le mit d'a-^{in 4} bord au Collège de Clermont aujourd'hui de Louis le Grand. Le jeune Abbé de Polignac s'y distingua dans ses premières études, & surtout dans ses Humanités. On le fit passer ensuite au Collège d'Harcourt, pour y apprendre la Philosophie; c'est là que ses heureuses dispositions achevèrent de se montrer de la manière la plus brillante.

Il étudioit sous un Professeur célèbre, mais ancien & absolument dévoué à la Philosophie d'Aristote. Cependant l'Abbé de Polignac apprit qu'il y avoit une autre Philosophie dans le monde, celle de Descartes; il se mit au fait de cette Philosophie, & il en saisit toutes les beautés. Les principes de Descartes étoient alors formellement pros crits dans les Ecoles du Royaume, où il étoit ordonné en même tems de n'enseigner que la Philosophie d'Aristote; mais ni cette raison, ni les efforts redoublés de son Maître pour le ramener au

Péripatétisme, ne purent obscurcir la lumière qui avoit brillé à ses yeux. Il céda seulement, en ce qu'il voulut bien s'engager à soutenir dans ses thèses les deux Philosophies en deux jours consécutifs. Le Professeur avoit aussi exigé que celle de Descartes passeroit la première, croyant qu'il auroit été trop dangereux de finir par-là, & de renvoyer les Auditeurs avec une impression récente de la doctrine prétendue erronée qu'on savoit être très séduisante dans la bouche de l'Abbé de Polignac; car son éloquence étoit déjà formée & se déceloit par mille traits. Le succès de ce double Acte public fut des plus éclatans; les systèmes de Descartes & d'Aristote y parurent l'un après l'autre, comme on l'avoit demandé, & tous deux dans leur plus beau jour; ils furent défendus autant que chacun pouvoit l'être; la prédilection du Répondant ne s'y fit sentir que par la force des raisons qui la justifioient; & il montra dans cette occasion tant d'équité, de retenue & de savoir, qu'il reçut des éloges de l'un & de l'autre parti, & qu'en ce sens il réunit tous les suffrages.

Les thèses de Théologie que Mr. l'Abbé de Polignac soutint quelques années après en Sorbonne, ne lui firent pas * moins d'honneur: il y avoit mis en tête ces mots, qui se trouvent si souvent dans l'Ecriture en parlant des Rois de Juda, *Excelsa abstulit*, par où il faisoit allusion à tout ce que venoit d'ordonner, ou que préparoit alors Louis XIV pour l'établissement de l'unité de Religion dans son

Royaume.

*Pag. 182.
in 4.

Royaume: c'étoit vers l'année 1683 deux ans avant la révocation de l'Edit de Nantes.

Tant de connoissances déjà assez approfondies, dont une excellente mémoire lui assuroit la possession, & dont il savoit parler sans ostentation & avec grace, se firent bientôt admirer parmi les gens de Lettres & dans le grand monde, & lui gagnèrent l'estime & l'amitié de tout ce qu'il y avoit de plus distingué par le mérite & par la naissance. Le Cardinal de Bouillon, qui fut des premiers à lui en donner des marques, le mena à Rome en 1689, après la mort d'Innocent XI. Il le fit entrer avec lui dans le Conclave, & il l'employa non seulement à l'élection du nouveau Pape Alexandre VIII, mais encore dans l'accommodement des différends qui regnoient alors entre la France & la Cour de Rome, & que ce Cardinal étoit chargé de terminer.

Ces différends, dont les uns sembloient intéresser les droits de la Tiare, & les autres la police de Rome, par les franchises du Palais des Ambassadeurs, avoient été poussés fort loin du vivant d'Innocent XI, & n'étoient pas aisés à pacifier. Le Roi y avoit encore envoyé le Duc de Chaulne dans le même dessein; mais Sa Majesté étant informée de la capacité de l'Abbé de Polignac, de l'estime & du crédit qu'il s'étoit aquis dans Rome, déclara qu'Elle vouloit aussi qu'il eût part à la négociation. Se distinguer parmi les excellentes têtes qui habitent cette Ville fameuse, ou qui s'y rassemblent du monde entier; dont à certains égards elle n'a pas cessé d'être la Capitale; parmi des gens tout occupés de mille

* Pag. 183.
in 4.

intérêts différens, & exercés dans la politique la plus profonde & la plus raffinée; au milieu d'un Etat qu'on croiroit être un composé de plusieurs Républiques, & où, quoique le pouvoir appartienne à un seul, chaque Prince ne *laisse pas d'avoir sa Cour & son autorité particulière; s'y faire goûter, s'y faire aimer, combien de discernement, d'art & de prudence, que de talens naturels & acquis suppose un tel succès! C'est pourtant ce qu'avoit fait Mr. l'Abbé de Polignac à l'âge de 28 ans, & dès son premier voyage à Rome. Alexandre VIII qui étoit un des meilleurs esprits de son siècle, & qui avoit souvent des conférences avec le jeune Négociateur, disoit de lui, *Je ne sais comment il fait, il ne me contredit jamais, il est toujours de mon avis, & cependant c'est ordinairement le sien qui prévaut.*

Les affaires ayant été heureusement terminées, & les articles de l'accommodement étant dressés, l'Abbé de Polignac revint à la Cour pour les proposer à Sa Majesté; & c'est alors que ce Monarque lui rendit un témoignage en apparence tout contraire à celui du Pape, mais qui ne peignoit pas moins bien son caractère. *Je viens*, dit-il, *au sortir d'une longue audience qu'il lui avoit donnée, d'entretenir un homme, & un jeune homme, qui m'a toujours contredit, & qui m'a toujours plu.* En effet Mr. le Cardinal de Polignac garda toujours sa politique & tout son art pour traiter avec les autres Princes, & n'employa jamais que sa candeur & son zèle pour le bien de l'Etat, en parlant à son Roi.

De

De retour en France l'Abbé de Polignac y partagea d'abord son loisir entre l'étude & les amis illustres qu'il s'étoit faits. Il entra ensuite dans le Séminaire des Bons-enfans, en 1692 ; mais le Roi l'en tira en 1693 pour l'envoyer en Pologne, en qualité de son Ambassadeur.

Jean Sobieski, que ses grandes actions avoient élevé sur le trône, régnoit encore ; mais sa santé chancelante & qui dépérissoit tous les jours, faisoit prévoir les troubles qu'une vacance prochaine ne manqueroit pas d'exciter pour l'élection de son successeur.

Il étoit de l'intérêt de la France, attaquée par les principales Puissances de l'Europe liguées contre elle depuis cinq à six ans, d'empêcher qu'un Prince dévoué à ses ennemis n'obtînt la Couronne de Pologne. Le Roi Sobieski la devoit * en partie aux puissances de Louis XIV, & Louis XIV auroit eu lieu de croire que les trois fils de ce Prince en conserveroient une juste reconnoissance, si depuis quelques années le Prince Jacques, leur aîné, n'eût pris des engagements avec la Maison d'Autriche, en épousant la Princesse Palatine de Neubourg sœur de l'Impératrice.

La Reine de Pologne, Marie d'Arquien, étoit née Françoisse ; mais elle s'étoit crue dégagée de tout devoir envers sa patrie, depuis qu'elle étoit montée sur le trône.

Cependant Louis XIV touché des vertus de Sobieski, conservoit toujours la même affection pour ce Prince & pour sa famille, & auroit souhaité qu'au défaut de l'aîné de ses

filz, dont la partialité pour l'Empereur étoit trop déclarée, il fût possible de procurer la Couronne à l'un des deux cadets, lorsque le Roi leur père viendrait à décéder.

Dans ces circonstances, & instruit des intentions de Sa Majesté l'Abbé de Polignac partit pour la Pologne vers la fin du mois de Mai 1693. Il espéroit y trouver un puissant parti en faveur des cadets; mais la Nation indisposée contre l'aîné, regardoit l'exclusion qu'elle lui donnoit d'avance, comme une raison valable contre les deux autres.

Il fallut donc, pour se conformer aux conjonctures présentes, travailler sur un nouveau plan. Il y travailla si heureusement, que le trône étant venu à vaquer, il eut non seulement assez de crédit pour en éloigner tout ennemi du nom François, mais il put encore sans trop de présomption, concevoir l'espérance flatteuse de mettre cette Couronne sur la tête d'un Prince de la Maison de France. Il en écrivit au Roi deux jours après la mort de Sobieski, c'est-à-dire, le 29 Juin 1696, & son projet fut approuvé: projet d'autant plus difficile à exécuter, qu'il se présentait en même tems sur la frontière, un compétiteur à la tête d'une puissante armée, menaçant d'un côté ceux qui lui refuseroient leur voix, & de l'autre promettant mille avantages à la République, & faisant goûter d'avance par ses largesses, une partie de ce qu'il promettoit.

*Pag. 185.
in 4.

*Dénué de tous ces secours, l'Abbé de Polignac parvint cependant à faire élire & proclamer Roi de Pologne Mr. le Prince de Conti. Mais pour soutenir cette élection, &
réunir

réunir les suffrages divisés entre ce Prince & l'Electeur de Saxe , dans un país où l'unanimité décide, non la pluralité , où la liberté est telle , qu'un particulier mal intentionné peut faire manquer l'affaire la mieux concertée & la plus utile , ne fût-ce que pour montrer qu'il a part au gouvernement , il falloit combattre & surmonter le parti opposé avec les mêmes armes qui avoient été employées pour lui concilier des amis.

Quoique la France ne soit pas moins puissante par ses richesses que redoutable par ses armes , éloignée de la Pologne , & ne pouvant faire passer que lentement dans ce Royaume les sommes que l'Ambassadeur avoit demandées , elles y arrivèrent trop tard , & l'éloquence du Ministre ne put suppléer à leur défaut. La guerre , qui en avoit retardé l'arrivée , retarda pareillement celle du Prince de Conti : sa route par mer avec peu de vaisseaux , exigeoit nécessairement des précautions pour éviter les Escadres d'Angleterre & de Hollande , & entraînoit par-là mille inconvéniens & de longs délais. Il n'étoit plus tems quand il débarqua à l'Abbaye d'O-liva près de Dantzic qui se déclara contre lui par plusieurs actes d'hostilité , & dont les autres Villes de Prusse imitèrent l'exemple. Ce Prince fut donc bientôt obligé de se rembarquer. L'Abbé de Polignac contraint aussi de se retirer , demeura quelque tems dans la Poméranie citérieure , à Stettin ou aux environs , & ne revint en France qu'au commencement de l'année 1698 , après avoir perdu

254 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

tous ses équipages & tous ses meubles, qui lui furent enlevés par les Dantzicois.

Le Roi se crut obligé de témoigner qu'il étoit mécontent de la conduite de son Ambassadeur, & lui commanda de se retirer dans son Abbaye de Bonport.

Ce n'est pas aux Sujets à pénétrer dans les motifs secrets des résolutions de leurs Maîtres. L'Abbé de Polignac pouvoit justifier sa conduite, & par le compte exact qu'il avoit rendu * de l'état des affaires, & par les ordres précis qu'il avoit reçus ; mais puni par un Roi juste, il se crut coupable, & n'attendit que de sa seule bonté, ce qu'il auroit cru pouvoit attendre de sa justice.

Ce fut dans cette retraite que rendu à lui-même, il entreprit d'écrire ce Poème fameux, qui n'a encore vu le jour que par les copies qui s'en sont échapées dans le public : Ouvrage que la Religion & l'amour de la vertu lui inspirèrent, que la Philosophie lui dicta, & que ses talens admirables & déjà exercés pour l'Eloquence & pour la Poésie, ornèrent de mille beautés utiles au dessein qui le lui fit entreprendre, en un mot le Poème de l'*Antilucrèce*, dont nous parlerons bientôt plus au long.

Le Roi d'Espagne Charles II étant mort le 1 Novembre 1700, les nouvelles de cette mort & du testament de ce Prince, où Philippe Duc d'Anjou étoit déclaré héritier universel de la Monarchie d'Espagne, pénétrèrent bientôt jusque dans la solitude de l'Abbé de Polignac toujours animé des mêmes sentimens pour sa patrie & pour son Roi. Il écri-

* Pag. 186.
in 4.

écrivit à Louis XIV, Sire, *si les prospérités de Votre Majesté ne mettent point fin à mes malheurs, du moins me les font-elles oublier.*

Ils finirent cependant ses malheurs, il fut rappellé en 1702, & il reparut à la Cour avec plus d'éclat que jamais, par les marques de bonté singulières avec lesquelles il fut reçu de S. M. La disgrâce jette je ne sai quoi de touchant sur les grandes vertus & les qualités éminentes, soit par le contraste des choses qui devoient si peu être ensemble, soit qu'elle épure les unes, & quelle ajoute aux autres : aussi n'est-il pas étonnant sous un Prince vertueux, qu'à la disgrâce succède quelquefois une augmentation de faveur. La place d'Auditeur de Rote étant venu à vaquer par la promotion de l'Abbé de la Tremoille au Cardinalat le 17 Mai 1706, le Roi la donna à l'Abbé de Polignac.

On sait quelle est à Rome la considération de ce Tribunal, & le rang que ceux qui le composent, tiennent à cette Cour. * Douze ^{Pag. 187.} Prélat^{in 4.}s y décident souverainement des matières bénéficiales de presque toute la Catholicité, & souvent même des affaires civiles qui y sont portées par appel. L'Abbé de Polignac, qui n'étoit encore que médiocrement versé dans les questions du Droit Civil & Canonique, se fit un devoir de les étudier à fond, devint un excellent Juge, & sa réputation déjà établie dans toute l'Europe, & particulièrement en Italie, s'accrut de ce nouveau titre.

Le Cardinal de la Tremoille qui étoit demeuré à Rome chargé des affaires de la Cour de

de France , eut pour lui les mêmes sentimens que le Cardinal de Bouillon , & le fit entrer aussi dans plusieurs de ses négociations. Clément XI qui occupoit alors le Saint Siège , & qui joignoit l'amour des Belles-lettres à une solide piété , l'honora d'une amitié tendre ; le Cardinal de la Tremoille en fut bien profiter dans plus d'une occasion délicate , mais il en faisoit honneur à l'Abbé de Polignac auprès du Roi , tandis que l'Abbé de Polignac écrivoit de son côté , que le succès des affaires dont on l'avoit chargé , étoit entierement dû au crédit & à l'habileté du Cardinal de la Tremoille. Sa Majesté fut sensible à une espèce d'émulation si rare entre des Ministres , & qui tournoit toujours à l'avantage de son service. Elle en parla , & l'on sait de quel prix étoient en pareille rencontre les paroles de ce grand Roi.

Juste estimateur du mérite Louis XIV connoissoit trop parfaitement celui de l'Abbé de Polignac , pour en borner la récompense à la place d'Auditeur de Rote ; dès-lors il le destinoit à des emplois encore plus importans , & se proposoit de lui ouvrir le chemin aux plus hautes dignités.

Après trois années de séjour à Rome , Mr. l'Abbé de Polignac avoit eu permission de revenir en France pour mettre ordre à ses affaires , très dérangées par les dépenses & par les pertes qu'il avoit faites en Pologne. Le Roi lui avoit accordé des représailles sur les vaisseaux Dantzicois , secours trop casuel , & qui ne put réparer les dommages que tant d'accidens lui avoient causés. Il étoit encore

à la * Cour en 1710, lorsqu'il fut question de * Pag.
 tenir de nouvelles conférences en Hollande, 188. in 4.
 pour finir une guerre sanglante que la succe-
 sion à la Couronne d'Espagne avoit excitée.
 Le Roi nomma le Maréchal d'Uxelles & l'Ab-
 bé de Polignac ses Plénipotentiaires à Gertrui-
 denberg, où ceux des Etats Généraux des
 Provinces-unies devoient se trouver.

Le moment marqué pour la paix n'étoit pas
 encore arrivé; mais quelque infructueuses
 que fussent ces conférences, la sagesse & la
 fermeté de l'Abbé de Polignac n'en furent pas
 moins estimées.

Comme l'entière restitution de la Monar-
 chie d'Espagne, avec des circonstances encore
 plus dures que la restitution même, faisoit le
 principal objet des Alliés, l'Abbé de Poli-
 gnac envoya au Roi un mémoire détaillé, où
 il montrait par de très fortes raisons, qu'il
 falloit courir les plus grands risques, & bra-
 ver les plus fâcheux événemens, plutôt que
 d'abandonner l'Espagne sous de pareilles con-
 ditions.

Cet avis ne manquoit pas de contradicteurs
 qui insistoient sur la nécessité d'abandonner
 l'Espagne, & sur l'état où se trouvoit actuel-
 lement la France, tant au dedans qu'au de-
 hors du Royaume. C'est cependant le parti
 que prit le Roi; il rappella ses Plénipotentiai-
 res, & les conférences furent rompues. Les
 plus heureux succès couronnèrent une rési-
 stance si héroïque, les armes de Louis XIV
 & celles de Philippe V son petit-fils furent
 presque par-tout victorieuses; l'Empereur Jo-
 seph mourut; l'Angleterre auparavant si ani-
 mée

258 HISTOIRE DE L'ACADEMIE ROYALE

mée contre la France , fut la première à seconder ses desirs ; les affaires générales changèrent de face , & la paix fut proposée à des conditions plus équitables.

On établit les conférences pour en traiter à Utrecht , & l'on en fixa l'ouverture au 12 Janvier 1712. L'Abbé de Polignac fut encore un des Plénipotentiaires que le Roi nomma pour y assister de sa part , quoiqu'il y eût peu d'apparence qu'il pût y rester jusqu'à l'entière conclusion des Traités. La raison en étoit aussi honorable qu'avantageuse pour Mr. l'Abbé de Polignac. Sa Majesté lui avoit donné * une marque éclatante de son estime , en témoignant au Roi d'Angleterre Jaques III qui étoit encore France , qu'il lui feroit plaisir d'accorder à cet Abbé sa nomination au Cardinalat. Destiné à la pourpre , le cérémonial attaché à cette dignité ne lui permit pas de demeurer Plénipotentiaire en second jusqu'à la signature de la Paix , qui se fit avec la France le 11 Avril 1713. D'ailleurs le Pape avoit la délicatesse de ne pas vouloir rendre publique sa promotion pendant qu'il seroit en pays protestant. Créé Cardinal le 18 Mai 1712 il fut donc réservé *in petto* jusqu'au 30 Janvier 1713 , où il fut déclaré ; & il ne reçut la calotte qu'en chemin pour la France , comme on en étoit convenu , & en pays catholique : elle lui fut remise auprès d'Anvers le 10 de Février suivant.

Il obtint dans la même année la charge de Maître de la Chapelle du Roi ; mais il s'en démit en 1716 , & l'Abbé de Breteuil , depuis Evêque de Rennes , lui succéda.

Le

Le feu Roi ne vécut pas assez pour donner à Mr. le Cardinal de Polignac d'autres marques de son estime ; mais son auguste Successeur y a suppléé.

Ne dissimulons point cependant que dans les commencemens de ce glorieux règne & durant la Régence, Mr. le Cardinal de Polignac eut ordre de se retirer dans son Abbaye d'Anchin^(a), mais imitons en même tems son respectueux silence sur les ordres supérieurs. Il fut rappelé trois années après , & les idées que de semblables événemens peuvent faire naître, furent entièrement effacées par les grâces dont son rappel fut suivi.

Innocent XIII étant mort le 7 Mars 1724, Mr. le Cardinal de Polignac alla à Rome pour l'élection du Pape Benoît XIII , & il y demeura 8 ans chargé des affaires de France. Comme il s'agissoit principalement alors de matières de Doctrine , dont il ne nous convient pas de parler, nous dirons seulement qu'il y employa tout ce que son zèle & ses talens conciliateurs étoient capables de lui inspirer , tant pour la pureté de la foi, que pour la paix de l'Eglise. Au *commencement *Pag. 190. de 1726 , il fut nommé à l'Archevêché^{n 4.} d'Auch ; il revint en France dans le mois de Juillet 1732, & six mois après son retour le Roi le fit Commandeur de l'Ordre du Saint Esprit, où il avoit été associé , & dont il avoit eu permission de porter les marques dès l'année 1728. C'est pendant ce dernier séjour à Rome , & peu de tems après la naissance

(a) Le 29 Décembre 1718.

fance de Monsieur le Dauphin, qu'il donna sur la place Navone une de ces fêtes superbes, où la profusion, de concert avec le goût, apprend aux nations étrangères quelle est l'opulence d'un Etat, par la magnificence de ses Ministres.

Nous ne nous arrêterons pas davantage sur les négociations de Mr. le Cardinal de Polignac, ni sur les événemens de sa vie qui s'y rapportent. Tout ce qui le regarde en qualité d'homme public, appartient à l'Histoire de France, & doit en faire une des parties les plus intéressantes. Mais nous allons considérer dans l'homme particulier, un Philosophe sublime, orné de tout ce que la belle Littérature a de plus excellent.

Mr. le Cardinal de Polignac n'étoit pas demeuré oisif pendant les deux ou trois années de sa retraite à Anchin. Bien différent de ceux qui, après avoir soutenu le poids des affaires, succombent à l'ennui du repos, il fut toujours se faire des occupations également utiles & agréables. L'Antilucrèce qu'il avoit commencé à Bonport, vint une seconde fois à son secours. Il l'avoit déjà beaucoup retouché & augmenté, mais il s'agissoit encore d'y ajouter des Livres entiers, d'y insérer un grand nombre d'expériences curieuses, & plusieurs découvertes qui étoient venues à sa connoissance depuis quelques années, & nous osons le dire, depuis qu'il étoit entré à l'Académie des Sciences; car personne n'honora jamais nos assemblées d'une assiduité plus flatteuse, per-

sonne

sonne n'y fut jamais plus attentif, soit pour y puiser, soit pour y répandre des lumières. Aussi l'Antilucrèce, que l'on croiroit être l'Ouvrage des trois célèbres Académies qui se glorifient de compter Mr. le Cardinal de Polognag parmi leurs membres, * & que toutes * Pag. pourroient réclamer par les différens genres^{191.} in 4. de beauté dont il brille, nous appartiendrait-il toujours de préférence, par la partie philosophique qui y domine, qui le caractérise & qui en fait la base. Tâchons donc d'en donner une idée exacte, autant du moins que les bornes prescrites à ce discours pourront le permettre.

L'Antilucrèce est un Poème Latin, du nombre de ceux qu'on appelle *Didactiques*, parce qu'ils ont pour but d'enseigner des vérités importantes, ou quelque art utile à la vie. Il est écrit en vers héroïques. Il fut d'abord composé en six Livres, & il l'a été depuis en neuf. Le neuvième Livre, qui n'a jamais été achevé, ni peut-être commencé, quoique les principaux matériaux en fussent tout prêts, étoit destiné à des éclaircissémens sur divers endroits de ceux qui le précèdent. Le Poème tel que nous l'avons, consiste donc en huit Livres complets, qui font de mille, douze ou treize cens vers chacun.

Le titre d'Antilucrèce montre assez que cet Ouvrage a été fait pour combattre à armes pareilles la Philosophie de Lucrèce, ou, ce qui est la même chose, celle d'Epicure, que ce Poète avoit adoptée avec la plupart des conséquences dangereuses dont elle est susceptible.

Mr.

Mr. le Cardinal de Polignac disoit volontiers quelle avoit été l'occasion de son Poème. En revenant de Pologne il s'étoit arrêté quelque tems en Hollande, il y avoit eu plusieurs entretiens, plusieurs disputes avec le fameux Bayle, dont le Dictionnaire critique paroissoit alors depuis peu. On fait de quelle manière les argumens d'Epicure, de Lucrèce & des Sceptiques, contre les vérités les plus importantes de la Religion & de la Morale, ont été célébrés & mis en œuvre dans ce Dictionnaire. Ils ne furent pas dissimulés dans cette occasion, & dès-lors Mr. le Cardinal de Polignac forma le projet de les réfuter; ce qu'il exécuta pendant son exil à l'Abbaye de Bonport. Ce n'est pourtant pas à Bayle qu'il s'adresse dans son Poème sous le nom Quintius, ainsi qu'a fait Lucrèce dans celui de *rerum Natura* à l'égard de Memmius * Romain d'une famille illustre; mais c'est, comme nous savons encore, à un homme de qualité, & de beaucoup d'esprit, qui a été connu par quelques Ouvrages, & avec qui Mr. le Cardinal de Polignac se trouvoit lié d'amitié.

* Pag.
192. in 4.

Ces craintes, prétendues vaines & puériles, dont le Poète Latin veut délivrer son ami, l'auteur de l'Antilucrèce songe à les rétablir utilement dans le sien. Il emploie ensuite tout ce que la Poésie a de plus sublime & de plus pathétique, pour lui faire goûter ce que la saine Philosophie a de plus consolant. Ici il foudroie le vice, là il peint avec amour des vertus dont, sans le savoir, il étoit le modèle. L'homme dans son état naturel, vile & im-

imperceptible partie de l'Univers, environné d'élémens qui concourent à le détruire, attaqué par ses semblables, en proie aux bêtes féroces, sans ressource dans ses maux, sans appui dans ses adversités, c'est là l'objet que notre Poète Philosophe présente à l'homme même, pour lui faire desirer un protecteur, & pour le rendre attentif à des preuves qui vont le convaincre qu'il en a un, le plus sage & le plus puissant de tous, l'Auteur même de la Nature.

De semblables préliminaires font le sujet du premier Livre.

Les Livres suivans ont aussi pour but, mais sous d'autres aspects, de préparer les voies qui conduisent à la grande vérité, qu'on ne trouvera traitée à fond que dans le septième & le huitième, ou de dissiper les nuages qui en obscurcissent l'entrée. Cette vérité est l'existence d'un premier Etre, intelligent, & juste rémunérateur.

Qu'on n'aille point imaginer sur cet exposé & sur quelques autres endroits de ce discours, qu'il s'agit ici peut-être de Théologie & de vérités révélées qui passent les limites que nous avons dû sagement nous prescrire. La matière de l'Antilucrèce est, comme nous l'avons dit, purement philosophique, par conséquent de notre ressort, & traitée comme elle auroit pu l'être au milieu d'Athènes & dans le Portique, si l'on y avoit connu les méditations de Descartes, ou si l'esprit humain y avoit été plus âgé de deux mille ans : en un mot la Religion, quoique nommée en cent

ca-

* Pag. endroits, n'est ici* proprement que dans l'in-
 193. in 4-tention. Ce seroit une pétition de principe,
 si elle avoit été employée dans les moyens,
 puisque la connoissance d'un premier Etre par
 les seules lumières de la raison, précède, se-
 lon l'ordre des choses, la connoissance de ce
 qu'il nous a révélé.

Le vuide, l'espace éternel & infini, parsemé
 seulement d'atomes ou corpuscules indivisi-
 bles qui s'y meuvent par eux-mêmes, & dont
 la rencontre fortuite produit tous les Phéno-
 mènes de l'Univers, les diverses tendances de
 ces atomes vers tels ou tels points de l'espa-
 ce, le hazard enfin, ce mot vuide de sens, &
 donné pour maître du Monde, sont autant
 de dogmes Epicuriens, qu'il falloit réfuter,
 ou, pour me servir de l'expression du Poète,
 autant de monstres qu'il falloit abattre, &
 qu'il frappe en effet de tous les coups qui leur
 furent jamais portés, & de nouveaux encore
 plus redoutables. Le Cartésianisme le plus ri-
 gide & le mieux conçu, brille dans le déve-
 loppement de ces questions, qui exigent,
 comme on fait, une clarté & une précision
 toutes particulières. On peut dire même que
 nulle autre Philosophie avant Descartes, n'en
 avoit fait de vraies questions, si pour les ren-
 dre telles il faut y apporter des idées intel-
 ligibles.

Mais ce qu'il y a de surprenant dans ce Poë-
 me, & qui l'est encore plus par l'adresse de
 l'exécution que par la hardiesse du dessein,
 c'est qu'en traitant ces matières l'Auteur a su
 y amener presque tout ce que la Physique, la
 Cosmo-

Cosmographie & l'Histoire Naturelle offrent de plus remarquable; y décrire les Arts mécaniques les plus ingénieux ou les plus utiles; y faire entrer la Fable, y rappeler l'Histoire, & toujours avec une élégance qu'on ne trouve que dans Virgile, ou dans ce même Lucrèce dont notre Poète s'est déclaré l'antagoniste. Les tours les plus nobles & les plus variés, les transitions les plus heureuses, les figures les plus capables de soutenir ou de réveiller l'attention, les comparaisons les plus justes & les plus instructives y font passer successivement sous les yeux mille objets divers, comme par une espèce * d'enchantement. C'est ici, il faut l'avouer, que la grande & sublime Poésie l'emporte infiniment sur la Prose dogmatique la plus élégante. Celle-ci ne produira jamais que des lecteurs, celle-là fait des spectateurs; elle attache l'esprit, elle remue l'ame. Ce n'est pas le Cardinal de Polignac que vous écoutez dans son Poème, c'est le spectacle même de la Nature où vous assistez avec lui. Les grands Poètes de l'antiquité & quelques modernes nous ont donné des exemples de cette importante illusion; mais si l'Antilucrèce vient à voir le jour, comme il le verra sans doute par les soins d'un illustre ami à qui Mr. le Cardinal de Polignac l'a confié en mourant, j'ose assurer qu'il en fournira une preuve éclatante.

De la réfutation des Atomes & du Vuide, & de toutes les propriétés chimériques dont la Philosophie Epicurienne les avoit revêtus, l'Auteur passe à l'origine du Mouvement, qu'il

démontre n'être pas essentiel à la matière, & n'avoir par conséquent d'autre cause que l'Auteur de la Nature.

Il traite ensuite de la spiritualité de l'ame, de sa distinction d'avec le corps, de la simplicité & de l'unité de son être, qui la rendent indestructible à tout agent naturel.

La question de l'ame des bêtes, l'une des plus épineuses de la Philosophie, quand la Philosophie est destinée à préparer la Religion, se présente ici naturellement, & ne pouvoit être passée sous silence. Elle est accompagnée, en forme d'objection, & par le savant artifice dont nous avons parlé, de tout ce que l'Histoire Naturelle nous apprend de plus curieux des mœurs, des ruses & de l'industrie des animaux. Le principe interne, pensant, ou machinal, qui les fait agir, n'y est pas traité avec moins d'art & d'intelligence, discussion également curieuse & sublime.

Mr. le Cardinal de Polignac, tout Cartésien qu'il étoit, n'avoit jamais été bien décidé sur ce point. Il sentoît parfaitement les avantages du pur machinisme des bêtes, & combien on applanissoit par-là de difficultés; mais il voyoit en même tems ce machinisme exposé à de grandes objections. Le parti qu'il

* Pag. 195. in 4. avoit coutume de prendre dans ce * conflit de sentimens contraires, étoit de montrer que dans l'un & l'autre cas la spiritualité de notre ame n'en étoit pas moins certaine, & qu'en abandonnant le reste aux profondeurs d'une Sagesse dont nous ne connoissons jamais les secrets, cette vérité & ses dépendances n'en pou-

pouvoient recevoir aucune atteinte. C'est là aussi le parti qu'il prend dans son Poème. On voit pourtant qu'il penche vers le machinisme; mais il l'abandonne, il le laisse indécis, pour se renfermer dans son véritable sujet, sachant qu'en toute espèce de guerre, on n'est jamais si fort que lorsqu'on embrasse moins de terrain à défendre.

Le tour de ses Vers tient beaucoup de celui de Virgile, son Poète favori, qu'il possédoit & qu'il a imité en plusieurs endroits, mais imité en Auteur original; & comme Virgile a imité Homère. Sa ressemblance avec Lucrèce est plus apparente, parce qu'il en emprunte plus fréquemment les traits; mais elle est, à mon avis, moins réelle; & ces traits qu'il en emprunte, c'est le plus souvent pour les lancer contre lui-même, avec plus de force qu'ils n'en avoient en partant de cet adversaire.

Je n'ai vu nulle part un style, qui à l'élégance & à la noblesse joigne tant de clarté, si ce n'est peut-être encore dans Virgile.

Mais trop semblable à son modèle en un seul point, Mr. le Cardinal de Polignac a eu, comme ce grand Poète, le malheur de ne pouvoir mettre la dernière main à son ouvrage. Nous n'avons pas trouvé parmi les copies de l'Antilucrèce qui nous ont été confiées, l'article des expériences de Newton sur la Lumière, non plus que celui de la règle de Képler sur la révolution des Planètes, & plusieurs autres grands morceaux que Mr. le Cardinal de Polignac nous avoit fait l'honneur de nous

communiquer, & qui vraisemblablement n'ont jamais été mis à la place qui leur étoit destinée. Il a dit aussi plusieurs fois qu'il avoit assez de matériaux pour étendre l'Antilucrèce jusqu'à dix, & même jusqu'à douze Livres.

* Pag. 196.
in 4,

* Nous ne croyons point cependant que ce qui restoit à faire dans ce Poème, pour l'achever ou pour l'embellir, soit capable de rien ôter aux éloges qui lui sont dus, ni à la gloire de son Auteur.

Il en est peut-être de ces sortes d'ouvrages non achevés, mais portés au point où se trouve actuellement celui-ci, comme de ces tableaux admirables dont parle Plin, & qui, selon ce savant connoisseur, n'en étoient que plus admirés, de cela même qu'ils étoient demeurés imparfaits. Saisis d'une douleur tendre à la vue de ces chef-d'œuvres de l'art, auxquels la mort trop prompte de leurs Auteurs a ravi les derniers traits, nous leur prêtons ce qui leur manque, nos regrets suppléent à nos desirs; nous lisons sur l'ouvrage toute la pensée du génie qui l'a conçu, nous y voyons toutes les beautés qui alloient éclore sous les mains de l'ouvrier, & ces mains expirantes qui nous semblent y être encore attachées, en rehaussent le prix à nos yeux.

L'Antilucrèce ne fut pas plutôt annoncé après le retour de Mr. le Cardinal de Polignac de son Abbaye de Bonport, que tout ce qui compose le monde savant, s'empressa d'en obtenir la lecture, d'en tirer des copies ou même de le traduire. On va voir que ce monde n'exclut pas ce qu'il y a de plus grand,

ou

ou qui approche le plus du trône. Madame la Duchesse du Maine, dont l'esprit enfiniment cultivé & également digne de l'être, n'est borné en aucun genre de connoissances, voulut être instruite de celles qui étoient contenues dans l'Antilucrèce, & de la manière dont elles y étoient traitées. L'Auteur le lui traduisit verbalement d'un bout à l'autre. Mr. le Duc du Maine fit plus, il mit par écrit une traduction de tout le premier livre, & l'offrit à cette Princesse par une élégante Epître dédicatoire; & nous pouvons assurer avec connoissance de cause, que le présent étoit digne de celle à qui il fut offert. Mr. le Duc de Bourgogne, ce Prince si chéri de la France, & dont les lumières & les vertus brillent encore dans l'auguste Monarque qui lui doit le jour, voulut avoir des conférences réglées avec Mr. le * Cardinal ^{Pag. 197.} de Polignac sur son Antilucrèce, après avoir ^{in 4.} donné à la lecture de cet Ouvrage toute l'application qu'il mérite par lui-même & par son objet. Le feu Roi lui en entendit parler avec tant d'éloges, qu'il parut desirer d'en connoître plus particulièrement les beautés; ce qui engagea Mr. le Duc de Bourgogne à le traduire, si ce n'est en entier, du moins en partie.

L'histoire littéraire de Mr. le Cardinal de Polignac, ainsi que sa vie politique, nous fourniroit plusieurs autres ouvrages Latins & François, tant en vers qu'en prose, dont nous ferions en état de parler, mais dont nous n'entreprendrons pas même l'énumération. Tels

sont divers morceaux qui ont précédé l'Antilucrèce, & qui rouloient aussi sur des matières philosophiques; des Harangues, des Plaidoyers, des Mémoires, & sur-tout un nombre prodigieux de Lettres & de Dépêches, parmi lesquelles il s'en trouve plusieurs qui peuvent passer pour des chef-d'œuvres de politique & d'éloquence.

Cette collection d'Antiques, Marbres, Porphyres, Bronzes, Statues, Bustes, Bas-reliefs qu'il avoit fait revivre, & dont il avoit orné son Palais, après les avoir retirés de dessous les ruines de cette Ville autrefois maîtresse du monde, ville qu'il connoissoit dans toutes ses époques, comme s'il y avoit vécu dans tous les tems, fera éternellement honneur à son gout pour les beaux arts & à son érudition. L'un & l'autre ont été relevés comme ils méritoient de l'être, dans une Académie qui a l'érudition & les beaux arts en partage.

Plusieurs autres particularités de sa vie, plusieurs faits que nous pourrions encore entasser ici & que nous supprimons, rempliroient sans doute l'éloge d'un homme ordinaire, mais il faut nécessairement abréger dans celui d'un homme aussi rare que Mr. le Cardinal de Polignac.

Il avoit atteint l'âge de quatre-vingt ans. Sa bonne constitution, sa sobriété, & sa vie uniforme depuis que ses affaires & la discussion importante d'un procès concernant son Diocèse, le retenoient à Paris, sembloient lui promettre de plus longs jours. Cependant sa santé s'affoiblissoit considérablement * depuis quel-

* Pag.
198. in 4.

quelques-années. Il fut attaqué d'hydropisie vers le milieu du mois d'Octobre dernier, & il mourut le 20 Novembre de la même année 1741. Il conserva toute sa raison dans le cours de sa maladie, il jouit de toutes ses lumières jusqu'au dernier soupir, & ses lumières furent accompagnées de tous les sentimens qu'elles étoient capables de faire naître, & qui ne l'avoient jamais abandonné.

Il avoit été reçu à l'Académie Françoisé en 1704, à l'Académie des Sciences en 1715, & à celle des Belles Lettres en 1717.

Il aimoit souverainement sa Nation & son Roi, & il s'occupoit sans cesse des moyens d'affermir ou d'augmenter leur gloire. Les Sciences & les Arts, les Savans & les Artistes lui étoient chers à ce titre, & par eux-mêmes, car les grands talens ne marchent point sans une forte inclination pour tout ce qui se rapporte à leur objet.

Sa conversation étoit douce, amusante & infiniment instructive, comme on le peut juger par tout ce qu'il avoit vu dans le Monde & dans les différentes Cours de l'Europe, par les grandes affaires qui avoient roulé sur lui, en un mot par tout ce qu'il savoit, ayant frappé, pour ainsi dire, aux bornes de l'esprit humain considéré par tous ses côtés. Le son de sa voix, & la grace avec laquelle il parloit & prononçoit sa langue; achevoient de mettre dans son entretien une espèce de charme, qui alloit presque jusqu'à la séduction. L'universalité de ses connoissances s'y montroit, mais sans dessein ni de briller ni de faire sentir sa

supériorité. Il étoit plein d'égards & de politesse pour ceux qui l'écoutoient, & s'il aimoit à se faire écouter, on se plaifoit encore plus à l'entendre, par tout ce qu'il y avoit d'excellent, de curieux & d'utile à recueillir de sa conversation.

Sa mémoire ne le laissa jamais hésiter sur un mot, sur un nom propre, ou sur une date, sur un passage d'Auteur, ou sur un fait, quelque éloigné ou détourné qu'il pût être; elle le servoit constamment, & avec tout l'ordre que la méditation peut mettre dans le discours.

*Pag. 199.
en 4. * Son éloquence dans les grandes affaires, dans les délibérations, dans des Dépêches importantes & raisonnées; ou telle qu'on la trouve en plusieurs endroits de ses écrits, se développoit par degrés, & avançoit toujours sans se hâter, d'abord douce & insinuante, mais pleine de force en approchant du but. Cicéron s'y faisoit sentir avant Démosthène.

Une autre espèce d'éloquence plus indépendante de l'art, celle qui se montre & qui éclate tout-à-coup dans les cas imprévus, ne manquoit pas à Mr. le Cardinal de Polignac. Nous avons de lui plusieurs traits qui en font foi, & de ces reparties heureuses qui marquent également le coup d'œil vif de l'esprit, & l'élévation du cœur.

La connoissance & le sentiment qu'il avoit de notre ignorance sur l'étendue & les limites des forces de la Nature, pouvoient le rendre favorable un moment à certains faits extraordinaires, qu'une discussion exacte ne manque guère de faire évanouir; mais s'agissoit-il de

de philosopher, d'examiner & de discuter soigneusement de semblables faits, personne n'étoit plus ferme que lui sur les grands principes du raisonnement, ni plus rigide observateur des loix de la bonne Critique.

Les deux fameux systèmes qui partagent aujourd'hui les Savans, faisoient par préférence le sujet de ses entretiens, lorsqu'il se trouvoit avec des personnes capables d'en raisonner. Descartes & Newton mis dans la balance, il ne faut pas demander de quel côté elle penchoit entre les mains de Mr. le Cardinal de Polignac. Zélé Cartésien par choix, par habitude & même par principe de Religion, le Newtonianisme, tel qu'il le concevoit, lui avoit toujours paru dangereux par sa conformité avec les points fondamentaux de la Physique d'Epicure. Il s'en déclaroit ouvertement, & la dispute sur ce sujet, non plus que sur toute autre matière, ne lui déplaisoit pas. Mais quelque constant qu'il fût dans ses sentimens, il ne les défendoit jamais avec la moindre aigreur. Il déduisoit ses preuves, il exposoit ses objections avec ordre, paisiblement, & du ton dont il semble que parleroit la raison * même ayant à s'expliquer ici-bas par des organes humains. On pouvoit hardiment le contredire, on auroit pu même le convaincre, sans déchoir un moment de sa familiarité & de sa bienveillance.

* Pag.
200, lin 49

Il avoit une inclination marquée pour l'Agriculture, cet art utile, si propre à nous rappeler le souvenir des mœurs antiques, & il l'entendoit, comme il paroît par plus d'un endroit de son Poëme. Il s'étoit procuré depuis

puis quelques années dans Paris & tout joignant son Palais, un vaste enclos, où il alloit tous les jours dans la belle saison, & où il cultivoit d'excellens fruits & des plantes rares: c'est là aussi qu'il se plaisoit à philosopher avec ses amis.

Enfin, car ce n'est pas un avantage à passer sous silence, Mr. le Cardinal de Polignac a été un des hommes du monde le mieux fait & de la plus grande mine, on ne pouvoit qu'en être frappé en l'abordant. Je ne sai quoi d'altier & de relevé caractérisoit ses traits, une noble hardiesse sembloit les animer; mais il ne prenoit pas plutôt la parole, qu'à cet air imposant succédoit un air de bonté & de douceur qui dissipoit toute crainte, & n'inspiroit que la confiance avec le respect. Son ame étoit alors véritablement peinte sur son visage: ame grande, généreuse & tranquille, qui a toujours usé libéralement de ses trésors, ainsi que des biens de la fortune, sans les compter, & presque sans les connoître.





MEMOIRES

DE

MATHÉMATIQUE

ET

DE PHYSIQUE,

TIRES DES REGISTRES

de l'Académie Royale des Sciences,

De l'Année M. DCCXLI.

~~~~~\*~~~~~

R E F L E X I O N S

*Sur la Théorie du troisième Satellite de Jupiter.*

Par Mr. MARALDI (\*).

✠✠✠✠ I l'on considère le grand nombre  
S des élémens qui entrent dans la  
✠✠✠✠ Théorie des Satellites de Jupiter,  
✠✠✠✠ & la difficulté de les déterminer  
avec quelque précision, on ne sera point é-  
tonné

(\*) 17 Juin 1741.

Mém. 1741.

A

## 2 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

\* Pag.  
2. in 4

tonné que cette théorie soit encore si éloignée de sa perfection, & qu'on n'ait point encore pu découvrir si la \* seconde Equation du premier Satellite est commune aux trois autres. Aussitôt que Mr. Cassini eut découvert cette inégalité, il crut qu'elle pouvoit être l'effet du mouvement successif de la lumière, comme il l'expliqua par un Ecrit qu'il publia en ce tems-là, & que Mr. du Hamel a inséré dans son Histoire de l'Académie, page 148; mais n'ayant pu représenter par cette inégalité les mouvemens des trois autres Satellites, il abandonna cette hypothèse, que Mr. Roemer adopta depuis, & à qui on en attribue ordinairement la découverte. Mais si l'aberration que Mr. Bradeley a découverte aux Etoiles fixes, & qui a été confirmée par les observations de plusieurs Astronomes, est l'effet de la lumière, joint au mouvement de la Terre, que les Physiciens regardent comme la preuve de son mouvement successif, on ne peut plus se dispenser d'admettre dans la théorie des Eclipses des quatre Satellites, la seconde Equation du premier, & elle doit être conforme à cette hypothèse. Il y a tout lieu de croire que si on ne l'a point apperçue aux trois derniers Satellites, c'est qu'elle a été confondue avec d'autres irrégularités que nous ne connoissons point. J'ai fait voir l'année dernière que le second Satellite est sujet à une inégalité synodique, qui monte à 24 minutes de tems, tantôt additive & tantôt soustractive, & que la variation de l'inclinaison de son Orbe, capable de produire dans les Eclipses de ce Satellite une inégalité de 22



minutes, comme Mr. Maraldi, mon oncle, l'a fait voir dans les Mémoires de l'Académie de 1729, nous empêchoit de découvrir la cause & les règles de la prétendue inégalité; car la variation de l'inclinaison augmente ou diminue la durée des Eclipses, & par conséquent accélère ou retarde l'Immersion & l'Emerfion, qui sont les phases qu'on observe plus fréquemment. Comme on ne peut observer qu'une de ces phases dans les Eclipses du premier Satellite, & rarement les deux dans le second, si on ne connoît point exactement la durée des Eclipses, on n'est pas plus en droit, dans la comparaison que l'on en fait avec les Tables d'attribuer la différence que \* l'on y remarque, plutôt à une cause qu'à une autre.

\* Pag.  
3. in 4.

Cette considération nous prouve que les observations du troisième Satellite sont préférables à celles des trois autres, pour constater l'Equation de la lumière. Ce Satellite est le seul dont on puisse observer la durée des Eclipses tous les ans, & en connoître plus souvent la variation. Ainsi nous avons jugé à propos de commencer par cet examen; nous verrons ensuite quelle doit être l'Equation de la lumière, suivant l'hypothèse de Mr. Bradeley; enfin nous montrerons comment elle s'accorde avec les observations.

Quelle que soit la cause de la variation de la durée des Eclipses du troisième Satellite, c'est aux limites des plus grandes latitudes qu'elle est plus sensible. Nous avons prouvé par quelques-unes de ces observations, dans un Mémoire de 1732, qu'elle avoit toujours diminué depuis 1691 jusqu'en 1727, & nous

#### 4 MEMOIRÉS DE L'ACADEMIE ROYALE

avons rapporté l'année dernière une observation du 23 Aout 1739, qui confirme cette diminution. Il s'agit de voir présentement ce qu'elle a été avant l'année 1691; mais nous n'avons aucunes observations faites aussi proche des limites que celles que nous avons rapportées en 1732, voici comment nous avons cru pouvoir y suppléer.

Après l'examen des causes de la variation de la durée des Eclipses du troisième Satellite, nous avons conjecturé en 1732, qu'elle pouvoit venir de l'Inclinaison, comme mon Oncle l'avoit pensé du second Satellite, & nous avons déterminé l'Inclinaison de son Orbe pour l'année 1691 de  $3^d\ 0' 5''$ , pour l'année 1715 de  $3^d\ 5' 35''$ , & pour l'année 1727 de  $3^d\ 12' 5''$ . Rien ne nous empêche de le supposer encore dans ce Mémoire, & nous pourrions par ce moyen substituer la recherche de la variation de l'Inclinaison à celle de la variation de la durée des Eclipses. Dans cette supposition, si la durée des Eclipses diminue, l'Inclinaison doit croître, & au contraire si la durée des Eclipses augmente, l'Inclinaison doit diminuer. Ainsi le lieu des Nœuds des Satellites & le diamètre de la section de l'ombre de Jupiter dans l'ombre du Satellite étant donnés, on peut trouver \* l'Inclinaison par toutes les observations de la durée de ses Eclipses, & la comparer à celle que nous avons déterminée en 1732. Nous aurons soin cependant de ne nous servir que des observations éloignées des Nœuds de 45 degrés, & au-delà, parce qu'à cette distance une erreur d'une minute de tems dans la durée des Ec-

\* Pag.  
4. in 4.



Eclipses, en produit une de 4 minutes de degré dans l'Inclinaison, qui augmenteroit à mesure que les observations seroient plus proches des Nœuds. Nous avons trouvé trois observations avant 1691, propres pour cette recherche. La plus ancienne est du 11 Mai 1673, où la demi-durée de l'Eclipse a été trouvée de  $1^h 7' 40''$ , Jupiter étant à  $16^d 20'$ , de la Balance, éloigné par conséquent du Nœud descendant des Satellites, de  $61^d 50'$ , ce qui donne l'Inclinaison de  $3^d 16' 42''$ . La seconde observation est du 24 Novembre 1678, où la demi-durée de l'Eclipse fut observée de  $1^h 20' 0''$ , Jupiter étant à  $4^d 45'$ , du Bélier, éloigné du Nœud ascendant de  $50^d 15'$ , par cette observation nous avons trouvé l'Inclinaison de  $3^d 13' 13''$ . Par une autre observation de 1687, nous l'avons trouvée de  $2^d 57' 24''$ . On voit par ces trois observations, que la durée des Eclipses du troisième Satellite n'a pas toujours été en diminuant, il y a apparence qu'elle a été aussi courte avant 1673 qu'elle l'a été en 1739, puisque nous avons trouvé par l'observation de 1673 l'Inclinaison de  $3^d 16' 42''$  égale à celle que nous avons trouvée en 1739, qui est de  $3^d 17' 35''$ . Mais quelle est la progression de la variation de l'Inclinaison? a-t-elle une période? On n'oseroit le conclurre des observations que j'ai rapportées. Si l'Inclinaison n'est pas constante, & si elle est la cause des variations que nous avons remarquées dans la durée des Eclipses, elle auroit autant diminué dans l'intervalle de 14 ans, savoir depuis 1673 jusqu'en 1687, qu'elle a augmenté

## 6 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

dans l'espace de 52 ans, savoir depuis 1687 jusqu'en 1739. On ne sauroit concevoir une telle irrégularité, & je suis persuadé que l'Inclinaison n'est pas la seule qui fait varier la durée des Eclipses des Satellites de Jupiter. Parmi les causes qui peuvent la faire varier, je \* ne doute point qu'il n'y en ait aussi d'Optiques, telles que celles dont Mr. de Fouchy a donné la théorie en 1732. Mais nous ne pouvons pas les appliquer ici, parce que nous ne connoissons point la grandeur de ce qu'il appelle la moindre partie visible du Satellite, nous connoissons encore moins l'intensité de la lumière, & par conséquent nous ne pouvons pas calculer leurs variations. C'est pourquoy dans l'examen que nous nous sommes proposés de faire des observations du troisième Satellite, pour constater l'Equation de la lumière, & dans la certitude où nous sommes de la variation de la durée de ses Eclipses, dont nous ne connoissons jusqu'à présent d'autre cause que le changement d'Inclinaison, nous avons calculé l'Inclinaison de son Orbe par autant d'observations que nous avons pu trouver, en supposant les Nœuds fixes, & le diamètre de la section de l'ombre de Jupiter dans l'Orbe du Satellite, tel que nous l'avons donné en 1732; & ayant construit des Tables de la demi-demeure du Satellite dans l'ombre suivant différentes Inclinaisons, nous nous en sommes servis dans le calcul des observations, suivant que nous avons jugé que devoit être l'Inclinaison, & suivant que des observations précédentes ou suivantes de la durée des Eclipses nous l'indiquoient. Voici ces observations.

TA-

\* Pag.  
s. in 4.

TABLE des Observations des Eclipses du troisieme Satellite de Jupiter, par lesquelles on a calculé l'Inclinaison de son Orbe, les Nœuds étant supposés à 14<sup>d</sup> 30' du Lion & du Verseau, & le demi-diamètre de l'ombre de 3<sup>d</sup> 44'.

| Dates des Immer-<br>sions & Emerfions | Heures des Immerf.<br>& Emerfions,          | Durée<br>des Eclipses. | Distance<br>au<br>Nœud. | Inclinaison. |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|
| 1673. 11 Mai                          | 10 <sup>h</sup> 17' 50" Im.<br>12 33 11 Em. | 2h 15' 21"             | 61d 50'                 | 3d 16' 42"   |
| 1678. 22 Nov.                         | 8 46 40 Im.<br>11 26 40 Em.                 | 2 40 0                 | 50 15                   | 3 13 13      |
| à Greenwich.<br>1687. 11 Mars         | 15 9 10 Im.<br>17 42 10 Em.                 | 2 33 0                 | 62 29                   | 2 57 34      |
| 1691. 17 Déc.                         | 6 5 1 Im.<br>8 11 41 Em.                    | 2 6 40                 | 89 28                   | 3 0 18       |
| 24 Déc.                               | 10 1 1 Im.<br>12 8 44 Em.                   | 2 7 43                 | 88 49                   | 2 59 40      |
| 1693. 19 Fév.                         | 6 9 35 Im.<br>8 57 32 Em.                   | 2 47 57                | 51 41                   | 2 56 23      |
| 1698. 4 Avril                         | 12 20 37 Im.<br>14 29 0 Em.                 | 2 8 23                 | 85 13                   | 3 3 56       |
| 1702. 6 Déc.                          | 4 53 52 Im.<br>7 26 52 Em.                  | 2 33 0                 | 60 64                   | 2 59 2       |
| 1703. 19 Oct.                         | 10 10 10 Im.<br>12 16 34 Em.                | 2 6 24                 | 88 58 3                 | 0 41         |

## 8 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

| Dates des Immer-<br>sions & Emerfions. | Heures des Immerf.<br>& Emerfions.        | Durée<br>des Eclipses, | Distance<br>au<br>Nœud. | Inclinaifon.          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1704. 4 Janv.                          | 10 <sup>h</sup> 4' 7" Im.<br>12 10 49 Em. | 2 <sup>h</sup> 6' 42"  | 83 <sup>d</sup> 19'     | 3 <sup>d</sup> 1' 39" |
| 9 Février.                             | 6 1 36 Im.<br>8 8 48 Em.                  | 2 7 12                 | 80 63                   | 2 36                  |
| 1705. 25 Janv.                         | 10 6 10 Im.<br>12 53 47 Em.               | 2 47 37                | 49 24                   | 3 3 5                 |
| 1715. 2 Aout.                          | 13 53 29 Im.<br>15 55 26 Em.              | 2 1 57                 | 87 28                   | 3 4 14                |
| 7 Sept.                                | 10 2 56 Im.<br>12 4 37 Em.                | 2 1 41                 | 89 18                   | 3 4 12                |
| 14 Sept.                               | 14 8 4 Im.<br>16 7 22 Em.                 | 1 59 14                | 88 39                   | 3 5 58                |
| 1716. 19 Fév.                          | 6 8 5 Im.<br>8 14 40 Em.                  | 2 6 35                 | 74 34                   | 3 7 16                |
| 1721. 19 Fév.                          | 13 24 42 Im.<br>15 39 42 Em.              | 2 15 0                 | 71 36                   | 3 3 2                 |
| 1726. 2 Sept.                          | 12 42 2 Im.<br>15 6 13 Em.                | 2 24 11                | 61 48                   | 3 7 53                |
| 26 Déc.                                | 5 11 30 Im.<br>7 19 8 Em.                 | 2 7 38                 | 72 19                   | 3 8 37                |



| Dates des Immer-<br>fions & Emerfions. | Heures des Immerf.<br>& Emerfions.         | Durée<br>des Eclipses. | Distance<br>au<br>Nœud. | Inclinaifon.           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1727. 12 Aout                          | 14 <sup>h</sup> 3' 21" Im.<br>15 53 17 Em. | 1 <sup>h</sup> 49' 56" | 86 55'                  | 3 <sup>d</sup> 12' 24" |
| à Petersbourg.<br>1728. 6 Avril        | 18 16 12 Im.<br>10 30 40 Em.               | 2 14 28                | 65 16                   | 3 11 4                 |
| 1732. 1 Fév.                           | 10 35 44 Im.<br>13 27 41 Em.               | 2 51 57                | 46 31                   | 3 5 5                  |
| 1733. 1 Mars                           | 13 17 30 Im.<br>15 15 33 Em.               | 1 58 3                 | 76 21                   | 3 12 1                 |
| 1739. 22 Aout                          | 14 10 7 Im.<br>15 54 46 Em.                | 1 44 39                | 81 20                   | 3 17 3                 |

\* Comme l'on n'a reconnu jusqu'à présent aucune excentricité au troisieme Satellite, nous avons supposé dans tous ces calculs le demi-diamètre de l'ombre de Jupiter dans l'Orbe du Satellite, constant, parce que la variation qui lui pourroit arriver de celle des diamètres de Jupiter & du Soleil, ne monte qu'à 25" de l'Orbe du Satellite. Il nous reste présentement à déterminer l'Equation de la lumière suivant l'hypothèse de Mr. Bradley. \* Page 7. in 4.

Cet Astronome a découvert par les observations de plusieurs Etoiles, de quelque grandeur qu'elles soient, que la vitesse de la lumière est à la vitesse annuelle de la Terre, A 5. comme



comme le rayon est au sinus de 20 secondes &  $\frac{1}{2}$ ; d'où je conclus que dans le tems que la lumière parcourt le rayon d'un cercle, la Terre parcourra le sinus de 20 secondes du même cercle. Mais la Terre parcourt par son moyen mouvement l'arc de 20 secondes de l'Orbe annuel, qu'on peut prendre pour le sinus même, en  $8' 13''$ ; donc la lumière emploiera  $8' 13''$  à parcourir le rayon de l'Orbe annuel. Mais Jupiter est plus éloigné de la Terre de tout le diamètre de l'Orbe annuel, lorsqu'il est en conjonction avec le Soleil, que lorsqu'il est en opposition; donc l'Equation de la lumière \* étant 0 à l'opposition (car c'est en partant de là qu'elle commence à se faire appercevoir) elle fera  $16' 26''$  à la conjonction, au lieu que Mr. Cassini ne l'a supposée que de  $14' 10''$ . Mais comme les conjonctions & les oppositions arrivent tantôt plus près de la Terre, tantôt plus loin, à cause de l'excentricité de Jupiter, il suit de la même hypothèse une seconde Equation de la lumière, qui étant 0 au périhélie, doit être de  $4' 6'' \frac{1}{2}$  à l'aphélie, car l'excentricité de Jupiter est de 5012 parties, dont le diamètre de l'Orbe annuel est 20000, qui est à 12 parties près le quart du diamètre de l'Orbe annuel. Nous avons construit deux Tables de ces Equations, qu'on peut appeler de la première & de la seconde Equation de la lumière; la première est distribuée pour tout les degrés de la distance de Jupiter au Soleil, & la seconde pour tous les degrés de l'anomalie de Jupiter. Nous allons voir comment elles s'accordent avec les observations: mais

je

je dois avertir auparavant, que dans le calcul des observations je me suis servi d'une Table de la première Equation des Conjonctions, calculée suivant la théorie de Jupiter de Mr. Cassini; celle qu'il a fait imprimer dans ses Tables, & qu'il a empruntée de mon Oncle, fait les Equations plus grandes que suivant sa théorie; nous verrons si mon Oncle a eu raison de les augmenter. Voila les précautions que nous avons cru devoir faire précéder au calcul que nous avons fait des observations du troisième Satellite, pour constater l'Equation de la lumière, voici en peu de mots le résultat. J'ai calculé environ 300 observations du troisième Satellite; la première est du 16 Septembre 1669, & la dernière est du 24 Février de la présente année 1741, ainsi de l'une à l'autre il y a 72 ans, qui font six périodes de Jupiter. Pour nous conformer aux Tables de Mr. Cassini, nous ferons commencer ces périodes au sixième Signe de l'anomalie de Jupiter, car c'est là que commence la Table des Equations des Conjonctions; nous avons les observations de cinq de ces périodes complètes, où nous avons remarqué que dans les six premiers Signes de ces \* périodes, qui sont les six derniers de l'anomalie de Jupiter, le calcul corrigé par l'E-<sup>9.</sup> in 4<sup>o</sup> quation de la lumière s'accorde beaucoup plus avec les observations, que si on négligeoit cette Equation, & qu'après cette correction il reste encore une inégalité additive qui, lorsqu'elle est plus grande, monte à 12 ou 14' environ, ce qui arrive ordinairement dans les huitième & neuvième Signes de l'anomalie

de Jupiter. Elle feroit souvent de plus de 20 minutes, si on négligeoit les Equations de la lumière; nous avons plusieurs observations qui la demanderoient de plus de 25 minutes. Cette inégalité paroît commencer au fixième Signe de l'anomalie de Jupiter, & finir au douzième; puisque dans ces Signes elle est plus petite, ou d'une dénomination différente.

Dans les six derniers Signes de ces périodes, qui sont les premiers de l'anomalie de Jupiter, l'inégalité qui reste après les corrections de la lumière, est soustractive, mais moindre de quelques minutes que n'est l'additive dans les autres Signes, ce qui indiqueroit que l'Equation de la lumière est encore trop petite, ou que les époques des moyens mouvemens ne sont pas exactes; sans les corrections de la lumière, cette dernière inégalité feroit souvent additive, il est vrai aussi que souvent le calcul approcheroit plus des observations, mais il paroît plus naturel que si après ces corrections il reste quelqu'inégalité, elle soit additive pendant six Signes, & soustractive pendant six autres, & égale dans les uns & dans les autres.

La dénomination de cette dernière inégalité est la même que celle du centre de Jupiter, ou des Equations des conjonctions des Satellites, ce qui montre que mon Oncle a eu raison d'augmenter ces Equations, & nous feroit soupçonner une excentricité au troisième Satellite comme au quatrième. Nous n'oserions cependant l'avancer, parce que les observations de 1676, 1677 & 1678, & celles de

de 1738, 1739, 1740 & 1741, qui ne font point comprises dans les cinq périodes, y sont totalement contraires. Dans les premières années, savoir 1676, 1677 & 1678, Jupiter étant dans \* les troisième, quatrième & cinquième Signes d'anomalie, l'inégalité a été additive, & la plus grande qu'on ait jamais observée. Dans les observations des dernières années, savoir 1738, 1739, 1740 & 1741, l'inégalité a été soustractive dans les sixième, septième & huitième Signes d'anomalie de Jupiter; cependant cela ne nous empêchera pas d'admettre l'Equation de la lumière, & de l'employer dans les calculs du troisième Satellite: j'espère qu'on trouvera dans la suite la cause des autres irrégularités de ce Satellite.

\* Pag.  
10. in 4.

Pour prouver ce que nous avons dit ci-dessus, il faudroit rapporter toutes les observations & leurs différences avec les Tables, ce qui occuperoit trop de place dans ce Mémoire. Nous reservons les observations pour un Ouvrage particulier, où nous les donnerons avec celles des trois autres Satellites.





## \* MOYENS

\* Pag.  
II, in 4.

## DE CONGELER L'ESPRIT DE VIN,

*Et de donner aux HUILES GRASSES quelques-uns des caractères d'une Huile essentielle.*

Par Mr. GEOFFROY (a).

**L**ORSQUE j'eus à la fin de 1739 mes observations sur le Remède de M<sup>lle</sup>. Stephens, je donnai une analyse du Savon par décomposition & récomposition. Une partie de cette analyse avoit été faite par le moyen de l'Huile de Vitriol, mais j'ai reconnu depuis qu'il n'est pas nécessaire, pour parvenir à cette fin, d'employer un acide si fort, & qu'un acide beaucoup plus foible suffit. En effet, le Vinaigre distillé ordinaire, substitué à l'Huile de Vitriol, fait de même la séparation du Sel & de l'Huile, à la vérité un peu plus lentement.

Cet acide végétal ayant digéré quelque tems sur 2 onces 2 gros de Savon blanc d'Alican, en a séparé une once 4 gros 54 grains d'Huile d'Olive très limpide. Le reste de ce composé, solide avant l'expérience, est le Sel alkali de la Soude, qui, comme je l'ai dit dans le Mémoire précédent, ne sauroit aller qu'à 3 gros 18 grains, parce qu'il faut presque la même

(a) 20 Mai 1741.

même quantité d'humidité pour donner à ce Sel une forme de Sel cristallisé. Mais si l'on veut qu'il soit plus concentré ou moins aqueux dans la Soude même, telle que les Savonniers l'emploient dans la composition de leur Lessive, quelque réduction que l'on fasse de la quantité de ce Sel, on trouvera toujours, en examinant ce que j'ai dit dans le Mémoire déjà cité, qu'il doit y avoir dans 18 gros de Savon, au moins 2 gros de flegme ou d'humidité.

Le Vinaigre, dans la nouvelle décomposition du Savon, principal ingrédient du Remède Anglois, m'a paru confirmer \* ce que j'ai déjà dit, qu'un malade dans l'usage de la Tisane, & qui en boit par jour trois demi-septiers chargés de 2 onces 2 gros de ce Savon, prenoit au moins une once 4 gros 49 grains & demi d'Huile d'Olive, & trois gros ou environ de Sel de Soude, mêlé ou uni avec une petite portion de Chaux. \* Pag. 12. in 4.

Cette vérification n'étoit pas le principal objet de mon travail. Je cherchois si je ne pourrois pas découvrir la raison de la consistance de ce corps, composé d'une Lessive de Sels & d'une Huile.

On sait que les principaux caractères de l'Huile en général, sont de ne se point mêler à l'eau, de la furnager ou de se précipiter au fond, comme le font certaines Huiles distillées; de dissoudre le Soufre commun, de former du Savon plus ou moins liquide, lorsqu'on la mêle avec des Alkalis fixes mis en liqueur; de se mêler avec toute autre matière grasse, soit qu'on l'ait exprimée, soit qu'on l'ait

fait distillée; de donner quand on la brule, une flamme plus ou moins claire, & une suite plus ou moins abondante, à proportion qu'elle est plus ou moins pure. Cette différence de pureté rend aussi l'Huile différemment inflammable, selon une observation rapportée à la fin de ce Mémoire.

L'Huile faite par expression ou par ébullition, se distingue des Huiles essentielles, & même des matières purement résineuses, en ce que naturellement & sans préparation, elle n'est pas dissoluble dans l'Esprit de Vin, quoique capable d'inflammabilité; elle en diffère encore, en ce que les Huiles essentielles mêlées avec l'eau, montent dans la distillation, & que c'est même un moyen de les rectifier, au lieu que les Huiles grasses laissent monter l'eau toute seule, & restent au fond de l'Alambic.

Ainsi il faut qu'il y ait dans ces Huiles, connues sous le nom d'*Huiles grasses*, telles que l'Huile d'Olive, d'Amandes, de Lin, de Noix, de Chenevis, &c. quelque matière qui s'oppose à leur union avec l'eau & avec les esprits ardens, quelque corps du genre des Gommés, qui défend la partie \* purement Huile, de l'action de l'Esprit de Vin, comme à son tour la partie qui n'est que huileuse ou inflammable, défend la gommeuse de l'action dissolvante de l'Eau, sans quoi il se feroit une union assez prompte de l'Huile d'Olive, par exemple, avec l'une ou l'autre de ces deux liqueurs.

Mais la séparation de ces deux matières de différent caractère, qui composent l'Huile dont

\* Pag.  
13. in 4.

dont je parle, est extrêmement difficile, & je n'ai pu réussir jusqu'à présent à les avoir séparément l'une de l'autre, en sorte que l'une des deux fût seulement dissoluble dans l'Eau, & l'autre seulement dans l'Esprit de Vin. Si j'y parviens dans la suite, comme je l'espère, je pourrai dire avec plus de certitude qu'à présent, que les Huiles communes, non essentielles, ne sont autre chose que des Gommés-résines résoutes, semblables ou de même genre que nos Gommés-résines sèches qui sont dissolubles en partie par l'Eau & en partie par un Esprit ardent.

En attendant, les inductions qu'on peut tirer de certaines expériences, semblent autoriser ce sentiment sur la réunion de deux matières de différent caractère dans une même Huile commune; car si on distille l'Huile d'Olive ou quelque autre huile grasse sur la Chaux vive, on retire par la distillation une huile beaucoup plus ténue, & qui, comme les Huiles essentielles, se dissout & disparoît dans l'Esprit de Vin, parce que la Chaux a retenu dans ses pores la partie gommeuse ou mucilagineuse de l'huile, soit comme plus grossière ou comme plus fixe, & qu'elle n'a laissé passer que la portion purement inflammable, parce qu'elle est la plus ténue ou la plus volatile.

Toute huile grasse qu'on unit par digestion ou par ébullition à une lessive de Sel alkali, concentrée & fort caustique, fait du Savon; mais toute huile grasse ne le donne pas en forme solide, comme le Savon d'Alican, de Genes, &c. L'Huile de Lin, par exemple, ne four-

fournira jamais qu'un Savon liquide avec un Sel alkali, quelque forte qu'en soit la lessive. En voici, à ce que je crois, la raison, c'est que l'Huile de Lin ne se grumèle & ne se coagule point au froid; \* au contraire l'Huile d'Olive & l'Huile de Ben, qui cessent d'être liquides au moindre froid, donnent aisément un Savon solide, quand elles ont été suffisamment dissoutes ou divisées par une lessive de Sel alkali, avec laquelle on les a fait bouillir ou digérer pendant du tems.

La cause de la congélation de ces huiles, plus prompte qu'aucune des autres, ne m'est pas encore assez connue pour que je risque de l'expliquer: peut-être que d'autres expériences que je médite, me la feront découvrir. Ainsi je me contente, quant à présent, du fait; & ce fait, c'est-à-dire, cette facilité que l'huile a de se congeler, paroît être d'autant mieux la principale cause de la solidité du Savon, que si l'on fait dissoudre dans une lessive alkaline, même incapable de se cristalliser, comme est celle de Potasse pure & de Chaux vive, quelque matière inflammable qu'on puisse regarder comme une huile naturelle, mais tellement congelée, qu'elle en soit dure, cassante & même friable, on a en trois ou quatre heures de simple digestion, un véritable Savon qui n'a besoin que d'une digestion un peu plus longue pour être aussi solide que le Savon d'Alicante. Ce fait appartient à un Mémoire que Mr. Hellot donnera dans quelque tems sur la Cire végétale de la Caroline & de la Louisiane.

On peut encore faire concourir comme cause



se de la solidité du Savon ordinaire, la portion terreuse de la Chaux qui, étant entrée dans la lessive forte des Savonniers, s'est mêlée avec l'huile pendant l'ébullition, comme aussi la propriété particulière qu'a le Sel alkali de la Soude de se cristalliser au froid, & de perdre aisément son humidité. Ainsi le Savon d'Alicante est composé de deux matières principales, qui séparément cessent d'être liquides quand le froid les surprend; & de la proximité de leurs parties divisées, infiniment petites, & chacune congelée séparément, il résulte un tout ou une masse qui, de liquide au feu, devient compacte au froid, qui n'est pas sèche au toucher comme le Sel le seroit s'il étoit seul, mais grasse & onctueuse, parce que ce sont des particules huileuses d'une petitesse extrême, mêlées avec \* des cristaux salins aussi petits ou peut-être plus petits qu'elles. Divisez cette masse en des lames très minces, évaporez-en l'humidité à une chaleur douce, ces lames perdront leur onctuosité, & deviendront friables, parce qu'alors le Sel de la Soude qui a été exposé à la chaleur, a perdu son humidité, & s'est calciné ou réduit en une farine encore plus fine qu'il ne l'étoit étant cristallisé, & cette farine recouvrant les particules huileuses qui sont aussi en partie desséchées, le tact n'en reçoit plus l'impression précédente de douceur & d'onctuosité. On peut se convaincre par le Microscope, que cette explication n'est pas simplement imaginée.

L'Huile d'Olive seule se mêle avec d'autres huiles: le Sel alkali dissout ou divise ces li-  
queurs

\* Pag.  
15. in 4

queurs grasses, mais le Savon qui résulte du mélange de l'huile & du Sel alkali, n'est plus dissout dans les huiles. J'y en ai tenu de ratisé bien mince pendant plus d'une année, sans qu'il y ait reçu la moindre altération. Le Sel alkali qui n'est plus en dissolution dans le Savon formé & compact, s'y trouve en assez grande quantité pour empêcher que l'huile avec laquelle il est joint, ne s'unisse de nouveau avec d'autres huiles grasses: pour dissoudre ce composé, il faut une liqueur plus subtile, & elle-même composée de différentes substances. Le même sel qui l'empêche de se mêler aux huiles, empêche aussi son huile de bruler; car pour peu qu'on frotte un papier de Savon, on lui ôte la facilité qu'il a de s'enflammer à la lumière d'une bougie.

Le Savon se fond & s'étend dans l'eau comme une matière mucilagineuse: plus l'eau est pure, mieux il s'y mêle sans se grumeler, & il la fait paroître blanche ou laiteuse. Si c'est une eau crue, qui contienne quelque portion d'acide vitriolique, il ne fait que s'y diviser en flocons neigeux, inégalement suspendus dans le liquide; c'est pourquoi le Savon peut servir à faire connoître assez bien la simplicité ou la pureté de l'eau d'une Rivière, d'une Source, &c. car pour peu que cette eau contienne d'acide, cet acide saisit une partie de l'alkali du Savon, & alors la proportion convenable & \* nécessaire entre l'huile & le sel, pour faire un vrai Savon, n'étant plus telle qu'elle doit être, la distribution uniforme de ce composé ne se fait pas dans une telle eau comme dans une eau qui est pure.

Jamais

Jamais le Savon ne se dissout dans l'eau, de quelque pureté qu'on la puisse concevoir, sans la teindre d'une couleur laiteuse & opaque; par conséquent il ne s'en fait pas une dissolution aussi parfaite que le seroit celle d'un métal dans l'acide qui lui convient. La raison en est que l'eau, supposée pure, étant un dissolvant homogène, ne trouve dans le Savon qu'une seule matière qu'elle puisse dissoudre parfaitement, c'est-à-dire le sel. La partie huileuse, qui n'y est que divisée, n'a point changé de nature, puisqu'on la peut faire reparaître par un acide, & par conséquent ayant conservé son caractère d'huile, elle demeure incapable d'union avec l'eau.

Le Savon se fond moins bien dans le Vin blanc que dans l'Eau, quoique le Vin dissolve certaines Gommés résineuses que l'Eau ne dissout pas. Cette petite différence me paroît devoir être attribuée à l'acide tartareux ou végétal qui est dans le Vin: or puisqu'il sera prouvé par les expériences suivantes, que l'acide opère la desunion de ce composé, il s'ensuit que si dans le Vin blanc l'huile du Savon ne se sépare pas aussi facilement que dans d'autres circonstances dont il sera parlé, c'est que cet acide n'y est pas assez abondant, mais qu'il suffit cependant pour empêcher que la dissolution du Savon ne se fasse avec une sorte d'égalité, comme la plus petite quantité d'acide répandue dans de l'eau, fait paroître le Savon grumelé.

L'Eau-de-vie, qui contient pour l'ordinaire moitié d'esprit inflammable, & dont l'autre moitié, qu'on regarde comme son flegme, est  
en-

## 22 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

encore mêlée avec une matière huileuse très abondante & légèrement saline, dissout le Savon beaucoup mieux que l'Eau, & encore mieux que le Vin blanc. Cependant cette dissolution est toujours un peu laiteuse. Mais si dans trois onces & demie de bonne Eau de vie, on \* met seulement un gros de cristaux de Soude pour alkaliser son flegme huileux, alors elle tiendra en dissolution parfaitement limpide, jusqu'à une once deux gros de Savon bien blanc, & elle restera en cet état tant que le vaisseau sera assez bien bouché pour que le spiritueux de la liqueur ne puisse s'évaporer. Les grands froids font perdre à cette liqueur une partie de sa fluidité, & on y apperçoit une sorte d'épaississement, lequel disparoit quand les chaleurs reviennent.

Si l'Eau-de-vie simple paroît un peu laiteuse quand elle a dissout le Savon, c'est parce qu'elle est trop aqueuse, ou parce qu'elle contient d'elle-même une portion d'huile qui lui donnoit déjà une teinte jaunâtre. En y ajoutant du Sel de Soude, on présente à son acide tartareux un alkali, il s'en forme un Sel moyen résout, qui est limpide, & l'Huile de l'Eau-de-vie rentre alors plus aisément dans la partie spiritueuse, parce qu'il n'y a plus d'acide qui l'en empêche.

Une preuve que c'est l'acide qui s'oppose au mélange parfait de l'huile avec la partie spiritueuse inflammable, c'est que si l'on met dans de l'Esprit de Vin acidulé, ou dans un esprit acide dulcifié, une certaine quantité de Savon, la division des matières différentes qui composent ce mixte, se fait presque aussi

\* Pag.  
17. in 4.

fa-



facilement que si l'on verçoit de l'acide pur sur du Savon dissous. La partie flegmatique de la liqueur dissout le Sel alkali du composé, l'acide l'attaque, & la plus grande partie de l'huile surnage.

Ce qu'il y a de plus singulier à observer dans les expériences que je viens de lire, c'est que quand on fait fondre du Savon dans de l'Eau, on a toujours une liqueur laiteuse, parce qu'une infinité de petites parties opaques & indissolubles dans cette liqueur, y sont suspendues, & empêchent la transmission libre des rayons de la lumière. Mais ces mêmes parties, apparentes dans l'Eau, paroissent infiniment moins dans l'Eau-de-vie. C'est donc la partie spiritueuse de cette liqueur inflammable qui les tient en dissolution, & cependant cette même partie spiritueuse n'est pas capable de \* dissoudre l'Huile d'Olive, quand elle n'a pas été unie précédemment à un Sel alkali, ou quand elle n'a pas été séparée du Savon par un acide végétal ou minéral. Car quoiqu'après cette séparation sa couleur soit la même, cependant elle a aquis une partie des propriétés d'une Huile essentielle, c'est-à-dire, qu'elle est beaucoup plus inflammable, qu'elle donne moins de suye, enfin qu'elle s'unit dans l'instant à l'Esprit de Vin; à la vérité elle ne monte pas avec l'Eau dans la distillation comme le font les véritables Huiles essentielles. Il faut donc attribuer la cause de cette limpidité du mélange de l'Eau-de-vie & du Savon, à la disposition actuelle des particules de l'Huile, à leur division en des atomes infiniment petits, &

\* Pag.  
18. in 4.



& vraisemblablement à ce que la partie gommeuse ou mucilagineuse de l'Huile ayant été dissoute dans le flegme de l'Eau-de-vie avec le Sel alkali, le reste de cette huile est devenu plus subtil, plus homogène, & par conséquent plus propre à se dissoudre totalement dans l'esprit inflammable de la liqueur.

L'Esprit de Vin dissout les Huiles essentielles, & ne dissout pas les Huiles faites par expression ou par ébullition, à moins qu'elles n'aient été purifiées, subtilisées par les opérations dont j'ai parlé, & qu'un intermède terreux n'ait retenu leurs parties grossières dans la distillation, ou qu'un Sel alkali uni à la Chaux, n'ait produit le même effet. L'Esprit de Vin se charge aussi des Sels alkalis volatils, & de quelques Sels moyens volatils, comme le Sel volatil du Vitriol de Mr. Homberg, connu sous le nom de *Sel sédatif*; il s'unit de même en partie aux esprits volatils urinaires, qui sont des Sels volatils résouts; il se joint très aisément aux esprits acides, même aux Sels volatils acides, tels que le Sel volatil du Succin, mais jamais il ne se mêle avec les Sels alkalis fixes, secs ou liquéfiés, à moins qu'ils n'aient été violemment alkalisés par le feu, ou encore mieux, à l'aide du principe inflammable de quelque Minéral avec lequel on les a tenus longtems en fusion; car alors l'Esprit de Vin en tire une teinture âcre & mordicante: la *Tinctura acris* de \* Mr. Stahl en est un exemple. Si l'on voit quelquefois le Sel de Tartre ordinaire, la Potasse, la Cendre gravelée, se dissoudre dans l'Esprit de Vin, ce n'est alors que parce que cet esprit est

\* Pag.  
19. in 4.

est aqueux, car il n'y a que la partie flegmatique qui puisse en faire la dissolution, & qui reste liquide avec eux au fond du vaisseau au-dessous de la partie spiritueuse inflammable.

Mais quand le Sel alkali & l'Huile ont été unis ensemble par ébullition, quand on en a fait du Savon, qui n'est, pour ainsi dire, qu'un amalgame des deux, alors l'Esprit de Vin les dissout, & en apparence si parfaitement, que trois onces de cet esprit peuvent tenir en dissolution un gros de Savon blanc, & même plus, sans que la limpidité de cette liqueur en soit aucunement altérée. Il est vrai qu'il faut aider cette dissolution par une chaleur assez vive, laisser refroidir la liqueur, la décantier, & la tenir dans une Bouteille bien bouchée. Si l'on débouche la bouteille, & qu'on laisse évaporer la partie la plus inflammable & la plus volatile de l'Esprit de Vin, on verra le Savon se précipiter peu-à-peu, & former des espèces de cristaux floconeux, composés de filets longs & foyeux, posés parallèlement les uns sur les autres, comme le fil d'Amianthe le plus fin. Cette dissolution du Savon n'est pas, comme je l'ai dit, une destruction de ses parties, puisqu'on peut les en retirer de nouveau, comme on retire le Mercure & l'Argent de la dissolution de ces deux métaux qu'on auroit amalgamés avant que de les dissoudre. Le Savon ne perd pas même son odeur, quoique divisé en parties infiniment petites dans un liquide qui a une odeur encore plus pénétrante que la sienne.

Cependant, avec le secours d'un acide, on  
achève

achève de donner à l'huile grasse & grossière du Savon, la perfection dont j'ai déjà parlé; on la convertit en Huile, qui a les principaux caractères de l'Huile éthérée. Il n'y a qu'à verser sur la dissolution précédente de l'Esprit de Vitriol jusqu'à agréable acidité, il se précipitera pendant la digestion une matière saline dissoluble dans l'eau. Décantez la liqueur qui, \* après cette précipitation, conserve encore sa limpidité; versez dessus deux fois autant d'eau, le mélange deviendra laiteux, & l'huile se séparera. Cette huile qui, avant que d'entrer dans la composition du Savon, restoit dans l'Esprit de Vin sans s'y mêler, est dissoute en un instant par cet esprit ardent, lorsqu'elle a été purifiée comme je viens de le dire.

Quand j'ai dissout seulement un gros de Savon blanc dans trois onces ou 24 gros de bon Esprit de Vin, je décante cette dissolution dans une Fiole cylindrique que je bouche bien. La liqueur est parfaitement limpide, sans aucune teinte, & extrêmement fluide. Cependant je la puis condenser assez vite en une masse aussi transparente que si elle n'avoit rien perdu de sa fluidité, & qui paroît comme un cylindre solide du plus beau Cristal. Je l'ai fait voir en cet état à plusieurs personnes de l'Académie qui, à ce que je crois, s'en ressouviennent. Pour que cette congélation se fasse comme je viens de la décrire, j'expose la Fiole à l'air dans un tems froid où le Thermomètre seroit seulement à 2 degrés au-dessus du terme de la congélation, ou bien je l'enfonce un peu dans de la neige; en 10 ou

\* Pag. 20.  
in 4.

12 minutes j'ai le *coagulum* transparent & uniforme, c'est-à-dire, sans aucun glaçon qui le traverse. Il ne faut pas laisser prendre à la liqueur un degré de froid trop vif, ni qu'elle en soit frappée trop brusquement, parce qu'alors le *coagulum* auroit une couleur laiteuse, & deviendrait opaque.

On peut expliquer ce phénomène de différentes manières. Tant que l'Esprit de Vin se trouve dans un air tempéré, il conserve le degré de fluidité qui lui est propre, & en cet état les particules des matières qui composent le Savon, y étant divisées & subdivisées presque à l'infini, elles se tiennent suspendues dans le liquide, sans qu'on y puisse appercevoir aucune opacité, comme l'Argent & le Mercure, exactement dissouts dans l'Eau-forte, n'altèrent pas sa limpidité; mais lorsque dans mon expérience la liqueur vient à diminuer de volume, en se condensant par le froid, les particules du Savon se rapprochent, & deviennent alors plus apparentes \* qu'elles n'é- \* Pag. 21.  
toient auparavant dans cette liqueur, quand in 4.  
elle avoit son premier volume.

Il seroit peut-être plus simple de n'attribuer qu'à l'huile du Savon la cause de cette congélation diaphane par un froid modéré, & de l'opacité occasionnée par un froid plus vif. L'Huile d'Olive, ainsi que l'Huile de Ben, sont de toutes les huiles grasses celles qui se congèlent le plus vite au froid. Ainsi comme l'Huile d'Olive n'est que divisée dans l'Esprit de Vin, chacune de ses petites parties reste transparente tant que le degré du froid n'est pas assez fort pour leur faire perdre leur dia-



phanéité, mais qu'il l'est seulement assez pour arrêter la rapidité de leur mouvement. S'il survient un froid trop vif ou trop subit, chacune de ces petites parties, globuleuses, ou de telle figure qu'on voudra, se congèle; & comme toute huile congelée est opaque, tous ces petits corps aiant perdu leur transparence, la liqueur totale ne paroît plus que d'une couleur laiteuse. Quand cette dissolution du Savon ne reçoit de l'air qu'une impression de froid modérée, ou moyenne entre le degré de chaleur nécessaire à la fluidité de l'huile & le degré de froid qui la grumèle, sa congélation se fait & se distribue plus également, & toute la liqueur prend uniformément une sorte de solidité presque semblable à de la Colle de poisson dissoute dans de l'eau bien claire. Une raison assez forte qui peut faire attribuer cette congélation de la totalité de la liqueur à la seule huile du Savon, c'est que quand on tient longtems ce *coagulum*, devenu opaque, au grand froid, il paroît sensiblement se resserrer, & même il exprime des gouttes d'Esprit de Vin qui reprennent la fluidité & la transparence qui leur sont propres.

L'expérience ne réussit pas de même avec l'Eau-de-vie, parce qu'étant beaucoup plus aqueuse, la dissolution du Savon s'y fait différemment que dans l'Esprit de Vin, & l'on ne peut parvenir à faire un *coagulum* un peu semblable au précédent, qu'en augmentant considérablement la quantité du Savon; alors ce qui en paroît coagulé, doit être regardé comme une espèce de précipitation.



Sel alkali , & encore plus celui de l'acide qui sépare l'huile du Savon , pour changer le caractère des huiles grasses & communes , & les convertir en une espèce d'Huile éthérée , car l'Esprit de Vin seul ne fait pas cet effet. J'ai fait digérer pendant plusieurs mois de l'Huile d'Olive & de l'Esprit de Vin , mis à parties égales dans un même vaisseau. J'ai vu l'huile s'éclaircir , & perdre sa couleur jaune , sans que l'Esprit de Vin parût se teindre. Le mélange fut au bout de quelque tems d'une transparence si uniforme qu'on auroit cru qu'il n'y avoit qu'une seule liqueur , & il falloit remuer le vaisseau pour s'assurer qu'il y en avoit deux , dont l'une surnageoit l'autre. Malgré cette dépuration apparente , l'huile conservoit son goût gras ; peu-à-peu elle prit une odeur rance , & l'ayant exposée au froid , elle s'y grumela fort vite , & se congéla comme elle faisoit auparavant.

Ce n'est pas le Sel alkali seul qui prépare l'huile à être séparée pure par un acide ; les matières calcinées terreuses , même métalliques , font le même effet. On a déjà remarqué ce que j'ai dit de la dépuration d'une Huile grasse par le moyen de la Chaux vive ; j'ajouterai que si l'on fait cuire , à la manière des emplâtres , une livre de Litharge bien broyée & bien lavée , avec deux livres d'Huile d'Olive , & qu'on ait l'attention d'entretenir dans le vaisseau assez d'eau pour empêcher le mélange de se bruler , on remarquera , pendant que l'huile s'incorpore avec la chaux du Plombe qu'il s'en élève une fumée dont l'odeur est semblable à celle du Savon. Lorsque la cuis-

Ion est achevée, on a une masse blanchâtre, qu'on pourroit appeller un *Savon métallique*, puisqu'elle a plusieurs des propriétés du Savon ordinaire, & qu'il ne lui manque presque que celle de se fondre dans l'eau, à laquelle elle ne fait que communiquer un goût gras.

Si l'on fait bouillir cette masse huileuse & métallique dans de l'Esprit de Vin, & qu'ensuite on l'y laisse tranquille pendant quelque tems, on y voit paroître une pellicule grasse, partie surnageant la liqueur, partie adhérente aux \* parois du vaisseau. Filtrez cette liqueur pour l'avoir limpide, & l'exposez à un froid de deux degrés ou environ, elle deviendra trouble, ce qui n'arrive pas à une dissolution du Savon ordinaire dans l'Esprit de Vin. Mais dans l'expérience suivante, la base de ce Savon métallique, ou ce qui lui a donné sa solidité, est une matière indissoluble dans la partie flegmatique de l'Esprit de Vin; ce sont donc les petites parties de la Litharge, nageantes dans ce liquide, qui en altèrent la limpidité. Il faut les faire disparaître en les dissolvant: pour cela, il n'y a qu'à y ajouter suffisante quantité de Vinaigre distillé, à mesure que cet acide attaque la Litharge, la liqueur totale s'éclaircit, & l'on voit l'huile se séparer des parties métalliques calcinées avec lesquelles elle étoit unie; elle prend peu-à-peu le haut de la liqueur, & elle y reparoit beaucoup plus transparente qu'elle n'étoit originairement. Séparez-la avec un Siphon, de nouvel Esprit de Vin la dissoudra.

Si l'on substituoit l'acide du Vitriol au Vinaigre

naigre distillé, on sépareroit de même de la masse précédente une huile dissoluble par un esprit ardent; mais l'acide vitriolique, au lieu de dissoudre la chaux du Plomb, la précipiteroit, parce que l'Huile de Vitriol ne dissout le Plomb que quand elle est extrêmement concentrée; encore faut-il la chauffer jusqu'à la faire bouillir.

On sépare encore une huile dissoluble de la masse huileuse & métallique, sans la dissoudre d'abord dans l'Esprit de Vin. Il n'y a qu'à la faire digérer dans du Vinaigre distillé, le Plomb s'y dissout peu-à-peu, l'huile le quitte, & s'élève claire & limpide à la surface de cette liqueur acide.


Il paroît par toutes ces expériences, que les matières violemment calcinées, sont propres à s'unir avec les huiles, & à prendre corps plus facilement avec celles qui se congèlent aisément au moindre froid, qu'avec celles qui restent fluides; que les acides décomposent les mélanges savonneux, quelque parfaits qu'ils puissent être; que pour ôter aux huiles par expression la matière mucilagineuse ou gommeuse \* qui les empêche de se joindre à l'Esprit de Vin, il faut les faire \* Pag. 24.  
in 4, passer au travers de ces matières calcinées; qu'il n'importe pas qu'elles soient salines, terreuses ou métalliques pour produire cet effet; que par ces mêmes expériences, on a lieu de soupçonner que la matière qui a été séparée, n'étoit pas inflammable, puisque les huiles qui en sont délivrées, en deviennent plus subtiles, se dissolvent dans l'Esprit de Vin, prennent feu beaucoup plus aisément qu'aupara-

vant, & rendent beaucoup moins de fuye.

On a encore la preuve de l'existence de cette matière hétérogène par un moyen plus simple. Il n'y a qu'à mettre une livre d'Huile d'Olive, tirée nouvellement d'un tonneau plein, dans une Lampe de fer blanc qui ait une longue surface, y plonger une mèche un peu longue, de 40 à 50 fils de coton fin, ajustant le lumignon de manière que lorsqu'il sera allumé, la flamme ne fasse point de dard pointu, il brulera 28 à 30 heures sans qu'on le mouche & sans donner de fumée. Eteignez-le au bout de ce tems, & laissez la Lampe exposée à l'air pendant trois semaines ou un mois; alors rallumez ce lumignon, dont vous aurez coupé le bout noir avec des ciseaux, il ne brulera pas plus d'une heure sans s'éteindre, & deviendra plus dur que du charbon. Examinez l'huile de la Lampe, vous y trouverez deux sortes de matières, l'une condensée presque comme du Succin, l'autre un peu plus liquide, mais beaucoup moins qu'elle ne l'étoit quand elle étoit nouvelle. Ainsi ce qu'il y avoit de grossier & de non inflammable dans l'huile, s'en est précipité, & la mèche se trouvant, pour ainsi dire, obstruée par cette matière épaissie, elle ne peut plus pomper la partie inflammable, comme elle le faisoit quand l'huile étoit bien fluide. Ce sont ces deux matières, séparées l'une de l'autre naturellement & sans aucun secours étranger, qu'il faut examiner, pour avoir une entière certitude que les Huiles faites par expression, ne sont que des Gommés-résines liquides, ainsi que j'ai cru pouvoir le dire dans ce Mémoire.

SUR





\* SUR LE CAS IRREDUCTIBLE \* Pag. 255  
in 4<sup>e</sup>

DU TROISIEME DEGRE.

Par Mr. NICOLE (a).

J'AI lu en 1738 deux Mémoires sur cette matière, qui sont imprimés dans le Volume de cette année-là. L'un de ces deux Mémoires contient la manière de réduire à des quantités réelles, la formule algébrique que Cardan a donnée il y a près de deux siècles. Cette formule de Cardan exprime la plus grande des trois Racines dont est composée une Equation du 3<sup>me</sup>. degré, dans le cas où ces trois Racines sont inégales, réelles & incommensurables.

Tous les Géomètres savent que cette formule de Cardan renferme un mélange de quantités réelles & de quantités imaginaires: ces quantités imaginaires qui entrent dans l'expression d'une grandeur qui doit être réelle, avoient toujours été un sujet de scandale.

J'ai montré dans le Mémoire dont je parle, qu'en étendant en Suite infinie, chacun des deux signes radicaux qui entrent dans la formule de Cardan, il en résulroit deux Suites infinies; que chacune de ces deux Suites étoit composée de termes alternativement réels & imaginaires, & que tous les termes ima-

(A) 6 Mai 1741.

B 5

imaginaires qui étoient positifs dans l'une de ces Suites, étoient négatifs dans l'autre; par ce moyen toutes les quantités imaginaires se détruisant, la formule de Cardan ne se trouvoit plus composée que de quantités réelles.

Mais quoique j'eusse fait cette réduction en quantités réelles, je n'étois parvenu qu'à une expression algébrique qui contenoit une Suite composée d'une infinité de termes.

Depuis ce tems-là, en examinant cette Suite, dont tous les termes sont alternativement positifs & négatifs, j'ai vu qu'ils étoient les mêmes que ceux de la puissance  $n$  d'un binome pris de deux en deux, & que la première partie de ce binome étoit une quantité algébrique composée d'un numérateur & d'un dénominateur, la seconde partie étant l'unité. Tous les termes positifs de la Suite qu'il faut sommer, sont donc ceux de la puissance  $n$  de ce binome pris de quatre en quatre, savoir les 1, 5, 9, 13, &c. termes.

Et tous les termes négatifs de cette Suite sont aussi ceux de la même puissance du même binome pris aussi de quatre en quatre, à commencer par le 3<sup>me</sup>. terme, savoir les 3, 7, 11, 15, &c. termes.

La résolution complète du fameux Problème du Cas irréductible, se réduit donc à trouver les formules générales qui expriment les sommes des termes de la puissance  $n$  de ce binome pris de quatre en quatre.

Mais quoique jusqu'à présent j'aye employé bien du tems à la recherche de ces formules, je ne suis encore parvenu à les trouver que dans un cas particulier, c'est celui où il y a

éga-

égalité entre le numérateur & le dénominateur de la quantité algébrique qui exprime la première partie du binome; alors cette première partie devient l'unité, & le binome est  $1+1$ . Or on sait que toutes les puissances de ce binome sont exprimées par les bandes perpendiculaires du Triangle arithmétique de Mr. Pascal.

On verra donc dans ce Mémoire, la manière de trouver les formules qui expriment les sommes des termes pris de quatre en quatre d'une bande perpendiculaire quelconque du Triangle arithmétique de Mr. Pascal.

Ces formules étant trouvées, il ne faut plus que les substituer à la place de la Suite infinie qui entre dans l'expression à laquelle on avoit réduit le Problème du Cas irréductible, & mettre dans cette expression, pour le rapport des coefficients de l'Equation du 3<sup>me</sup>. degré qu'on vouloit résoudre, celui qui résulte de l'égalité entre le numérateur & le dénominateur de la quantité algébrique dont on a parlé.

Tout cela étant fait, on a la Racine de l'Equation du 3<sup>me</sup>. degré qu'on cherchoit pour ce cas particulier seulement \* qui contient cependant une infinité d'Equations qui y sont renfermées, & dont les trois Racines sont réelles, inégales & incommensurables. \* Pag. 27.  
in 4.

J'ai fait voir dans les Mémoires de l'année 1738, p. 136, que l'expression de l'une des trois Racines de toute Equation du 3<sup>me</sup>

dégré, qui est  $\sqrt[3]{[\frac{1}{2}q + \sqrt{(\frac{1}{4}qq - \frac{1}{27}p^3)}] + \sqrt[3]{[\frac{1}{2}q - \sqrt{(\frac{1}{4}qq - \frac{1}{27}p^3)}]}$  peut se réduire dans le cas où  $\frac{1}{27}p^3$  est plus grand que  $\frac{1}{4}qq$ , à cette autre expression  $\sqrt[3]{(\frac{1}{27}p^3 - \frac{1}{4}qq) \times [\sqrt[3]{\frac{q}{2\sqrt{(\frac{1}{27}p^3 - \frac{1}{4}qq)}} + \sqrt{-1}} + \sqrt[3]{\frac{q}{2\sqrt{(\frac{1}{27}p^3 - \frac{1}{4}qq)}} - \sqrt{-1}}]}]$ ; & qu'en supposant  $\frac{1}{2}q = a$ , &  $\sqrt[3]{(\frac{1}{27}p^3 - \frac{1}{4}qq)} = b$ , cette expression devient  $\sqrt[3]{b \times [(\frac{a}{b} + \sqrt{-1})^{\frac{1}{3}} + (\frac{a}{b} - \sqrt{-1})^{\frac{1}{3}}]}$ , ou en faisant encore  $\frac{1}{3} = n$ , elle devient  $b^n \times [(\frac{a}{b} + \sqrt{-1})^n + (\frac{a}{b} - \sqrt{-1})^n]$ ; qu'en élevant chacun de ces binomes à la puissance  $n$ , cette quantité devient

$$2b^n \times \left\{ \begin{aligned} & \left( \frac{a}{b} \right)^n - \frac{n \times n-1}{1.2} \times \left( \frac{a}{b} \right)^{n-2} + \frac{n \times n-1 \times n-2 \times n-3}{1.2.3.4} \times \left( \frac{a}{b} \right)^{n-4} \\ & - \frac{n \times n-1 \times \dots \times n-5}{1.2 \dots 6} \times \left( \frac{a}{b} \right)^{n-6} + \frac{n \times n-1 \times \dots \times n-7}{1.2 \dots 8} \times \left( \frac{a}{b} \right)^{n-8} \\ & - \frac{n \times n-1 \times \dots \times n-9}{1.2 \dots 10} \times \left( \frac{a}{b} \right)^{n-10} + \dots \end{aligned} \right.$$

dans laquelle il n'y a plus de grandeurs imaginaires. La question du Cas irréductible se réduit donc à trouver la somme de cette Suite.

Pour rendre cette Suite plus simple, soit supposé  $a=b$ , elle deviendra

$$2b^n \times$$





On fait qu'une des propriétés de ce Triangle est que la première bande perpendiculaire

$$\begin{aligned}
 & \dots\dots\dots 1 + \dots\dots\dots = (1+1)^1. \\
 \text{La 2. de } & 1 + 2 + 1 \dots\dots\dots = (1+1)^2. \\
 \text{La 3. me } & 1 + 3 + 3 + 1 \dots\dots\dots = (1+1)^3. \\
 \text{La 4. me } & 1 + 4 + 6 + 4 + 1 \dots\dots\dots = (1+1)^4. \\
 \text{La 5. me } & 1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1 \dots\dots\dots = (1+1)^5. \\
 \text{La 6. me } & 1 + 6 + 15 + 20 + 15 + 6 + 1 \dots\dots\dots = (1+1)^6. \\
 \text{La 7. me } & 1 + 7 + 21 + 35 + 35 + 21 + 7 + 1 = (1+1)^7.
 \end{aligned}$$

Et enfin que la bande perpendiculaire exprimée par \*, sera  $(2)^n = (1+1)^n = 1 + n$

$$\begin{aligned}
 & + \frac{n \times n - 1}{1.2} + \frac{n \times n - 1 \times n - 2}{1.2.3} + \frac{n \times n - 1 \times n - 2 \times n - 3}{1.2.3.4} \\
 & + \frac{n \times n - 1 \times n - 2 \times n - 3 \times n - 4}{1.2.3.4.5} + \frac{n \times n - 1 \times n - 2 \times n - 3 \times n - 4 \times n - 5}{1.2.3.4.5.6} \\
 & + \frac{n \times n - 1 \times n - 2 \times n - 3 \times n - 4 \times n - 5 \times n - 6}{1.2.3.4.5.6.7} + \&c.
 \end{aligned}$$

Or comme les termes 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, &c. de cette \* dernière Suite, sont ceux de la Suite qu'il faut sommer pour résoudre le Cas irréductible dans la supposition de  $n=6$ , & que les termes de celle qu'il faut sommer pour résoudre ce Problème, ont alternativement les signes plus & moins, la question se réduit à trouver la somme des 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, &c. termes d'une bande perpendiculaire quelconque, & d'en retrancher la somme des 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, &c. termes de la même bande perpendiculaire, c'est-à-dire, qu'il faut trouver la somme des termes d'une bande perpendiculaire quelconque, pris de quatre en quatre.

La première somme à trouver sera composée

sée des 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, &c. termes de cette bande.

La seconde somme sera composée des 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, &c. termes.

La troisième, des 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, &c. termes.

Et la quatrième, des 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, &c.

Si l'on prend ces sommes de 4 en 4, depuis la première bande jusqu'à la 19.<sup>me</sup>, on aura pour la première bande

|                       |        |     |        |     |        |     |                            |
|-----------------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|----------------------------|
| 1. <sup>re</sup> ...  | 1      | ... | 1      | ... | 0      | ... | 0 = 2 <sup>1</sup> .       |
| 2. <sup>de</sup> ...  | 1      | ... | 2      | ... | 1      | ... | 0 = 2 <sup>2</sup> .       |
| 3. <sup>me</sup> ...  | 1      | ... | 3      | ... | 3      | ... | 1 = 2 <sup>3</sup> .       |
| 4. <sup>me</sup> ...  | 2      | ... | 4      | ... | 6      | ... | 4 = 2 <sup>4</sup> .       |
| 5. <sup>me</sup> ...  | 6      | ... | 6      | ... | 10     | ... | 10 = 2 <sup>5</sup> .      |
| 6. <sup>me</sup> ...  | 16     | ... | 12     | ... | 16     | ... | 20 = 2 <sup>6</sup> .      |
| 7. <sup>me</sup> ...  | 36     | ... | 28     | ... | 28     | ... | 36 = 2 <sup>7</sup> .      |
| 8. <sup>me</sup> ...  | 72     | ... | 64     | ... | 56     | ... | 64 = 2 <sup>8</sup> .      |
| 9. <sup>me</sup> ...  | 136    | ... | 136    | ... | 120    | ... | 120 = 2 <sup>9</sup> .     |
| 10. <sup>me</sup> ... | 256    | ... | 272    | ... | 256    | ... | 240 = 2 <sup>10</sup> .    |
| 11. <sup>me</sup> ... | 496    | ... | 528    | ... | 528    | ... | 496 = 2 <sup>11</sup> .    |
| 12. <sup>me</sup> ... | 992    | ... | 1024   | ... | 1056   | ... | 1024 = 2 <sup>12</sup> .   |
| 13. <sup>me</sup> ... | 2016   | ... | 2016   | ... | 2080   | ... | 2080 = 2 <sup>13</sup> .   |
| 14. <sup>me</sup> ... | 4096   | ... | 4032   | ... | 4096   | ... | 4160 = 2 <sup>14</sup> .   |
| 15. <sup>me</sup> ... | 8256   | ... | 8128   | ... | 8128   | ... | 8256 = 2 <sup>15</sup> .   |
| 16. <sup>me</sup> ... | 16512  | ... | 16384  | ... | 16256  | ... | 16384 = 2 <sup>16</sup> .  |
| 17. <sup>me</sup> ... | 32896  | ... | 32896  | ... | 32640  | ... | 32640 = 2 <sup>17</sup> .  |
| 18. <sup>me</sup> ... | 65536  | ... | 65792  | ... | 65736  | ... | 65280 = 2 <sup>18</sup> .  |
| 19. <sup>me</sup> ... | 130816 | ... | 131328 | ... | 131328 | ... | 130816 = 2 <sup>19</sup> . |

\* Si l'on examine les nombres qui composent ces quatre colonnes, on trouvera qu'ils suivent la loi marquée dans cette Table.

# 40 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

$$1... \frac{(2)^1 + (2)^1}{(2)^2} \cdot \frac{(2)^1 + (2)^1}{(2)^2} \cdot \frac{(2)^1 - (2)^1}{(2)^2} \cdot \frac{(2)^1 - (2)^1}{(2)^2} = (2)^1$$

$$2... \frac{(2)^2}{(2)^2} \cdot \frac{(2)^2 + (2)^2}{(2)^4} \cdot \frac{(2)^2 - (2)^2}{(2)^4} \cdot \frac{(2)^2 - (2)^2}{(2)^4} = (2)^2$$

$$3... \frac{(2)^3 - (2)^2}{(2)^4} \cdot \frac{(2)^3 + (2)^2}{(2)^4} \cdot \frac{(2)^3 + (2)^2}{(2)^4} \cdot \frac{(2)^3 - (2)^2}{(2)^4} = (2)^3$$

$$4... \frac{(2)^4 - (2)^3}{(2)^4} \cdot \frac{(2)^4}{(2)^4} \cdot \frac{(2)^4 + (2)^3}{(2)^4} \cdot \frac{(2)^4}{(2)^4} = (2)^4$$

$$5... \frac{(2)^5 - (2)^4}{(2)^5} \cdot \frac{(2)^5 - (2)^4}{(2)^5} \cdot \frac{(2)^5 + (2)^4}{(2)^5} \cdot \frac{(2)^5 + (2)^4}{(2)^5} = (2)^5$$

$$6... \frac{(2)^6}{(2)^6} \cdot \frac{(2)^6 - (2)^4}{(2)^6} \cdot \frac{(2)^6}{(2)^6} \cdot \frac{(2)^6 + (2)^4}{(2)^6} = (2)^6$$

$$7... \frac{(2)^7 + (2)^4}{(2)^7} \cdot \frac{(2)^7 - (2)^4}{(2)^7} \cdot \frac{(2)^7 - (2)^4}{(2)^7} \cdot \frac{(2)^7 + (2)^4}{(2)^7} = (2)^7$$

$$8... \frac{(2)^8 + (2)^5}{(2)^8} \cdot \frac{(2)^8}{(2)^8} \cdot \frac{(2)^8 - (2)^5}{(2)^8} \cdot \frac{(2)^8}{(2)^8} = (2)^8$$

$$9... \frac{(2)^9 + (2)^5}{(2)^9} \cdot \frac{(2)^9 + (2)^5}{(2)^9} \cdot \frac{(2)^9 - (2)^5}{(2)^9} \cdot \frac{(2)^9 - (2)^5}{(2)^9} = (2)^9$$

$$10... \frac{(2)^{10}}{(2)^{10}} \cdot \frac{(2)^{10} + (2)^6}{(2)^{10}} \cdot \frac{(2)^{10}}{(2)^{10}} \cdot \frac{(2)^{10} - (2)^6}{(2)^{10}} = (2)^{10}$$

$$11... \frac{(2)^{11} - (2)^6}{(2)^{11}} \cdot \frac{(2)^{11} + (2)^6}{(2)^{11}} \cdot \frac{(2)^{11} + (2)^6}{(2)^{11}} \cdot \frac{(2)^{11} - (2)^6}{(2)^{11}} = (2)^{11}$$

$$12... \frac{(2)^{12} - (2)^7}{(2)^{12}} \cdot \frac{(2)^{12}}{(2)^{12}} \cdot \frac{(2)^{12} + (2)^7}{(2)^{12}} \cdot \frac{(2)^{12}}{(2)^{12}} = (2)^{12}$$

$$13... \frac{(2)^{13} - (2)^7}{(2)^{13}} \cdot \frac{(2)^{13} - (2)^7}{(2)^{13}} \cdot \frac{(2)^{13} + (2)^7}{(2)^{13}} \cdot \frac{(2)^{13} + (2)^7}{(2)^{13}} = (2)^{13}$$

$$14... \frac{(2)^{14}}{(2)^{14}} \cdot \frac{(2)^{14} - (2)^8}{(2)^{14}} \cdot \frac{(2)^{14}}{(2)^{14}} \cdot \frac{(2)^{14} + (2)^8}{(2)^{14}} = (2)^{14}$$

$$15... \frac{(2)^{15} + (2)^8}{(2)^{15}} \cdot \frac{(2)^{15} - (2)^8}{(2)^{15}} \cdot \frac{(2)^{15} - (2)^8}{(2)^{15}} \cdot \frac{(2)^{15} + (2)^8}{(2)^{15}} = (2)^{15}$$

16...



$$16... \frac{(2)^{16} + (2)^9}{(2)^{16}} \cdot \frac{(2)^{16}}{(2)^{16} - (2)^9} \cdot \frac{(2)^{16} - (2)^9}{(2)^{16}} = (2)^{16}.$$

$$17... \frac{(2)^{17} + (2)^9}{(2)^{17} + (2)^9} \cdot \frac{(2)^{17} + (2)^9}{(2)^{17} - (2)^9} \cdot \frac{(2)^{17} - (2)^9}{(2)^{17} - (2)^9} = (2)^{17}.$$

$$18... \frac{(2)^{18}}{(2)^{18} + (2)^{10}} \cdot \frac{(2)^{18} + (2)^{10}}{(2)^{18}} \cdot \frac{(2)^{18} - (2)^{10}}{(2)^{18} - (2)^{10}} = (2)^{18}.$$

$$19... \frac{(2)^{19} - (2)^{10}}{(2)^{19} + (2)^{10}} \cdot \frac{(2)^{19} + (2)^{10}}{(2)^{19} + (2)^{10}} \cdot \frac{(2)^{19} - (2)^{10}}{(2)^{19} - (2)^{10}} = (2)^{19}.$$

$$20... \frac{(2)^{20} - (2)^{11}}{(2)^{20}} \cdot \frac{(2)^{20}}{(2)^{20} + (2)^{11}} \cdot \frac{(2)^{20} + (2)^{11}}{(2)^{20}} = (2)^{20}.$$

$$21... \frac{(2)^{21} - (2)^{11}}{(2)^{21} - (2)^{11}} \cdot \frac{(2)^{21} - (2)^{11}}{(2)^{21} + (2)^{11}} \cdot \frac{(2)^{21} + (2)^{11}}{(2)^{21} + (2)^{11}} = (2)^{21}.$$

$$22... \frac{(2)^{22}}{(2)^{22} - (2)^{12}} \cdot \frac{(2)^{22} - (2)^{12}}{(2)^{22}} \cdot \frac{(2)^{22} + (2)^{12}}{(2)^{22} + (2)^{12}} = (2)^{22}.$$

$$n... \left( \frac{(2)^n - (2)^2}{(2)^n - (2)^2} \cdot \frac{(2)^n + (2)^2}{(2)^n + (2)^2} \cdot \frac{(2)^n + (2)^2}{(2)^n - (2)^2} \cdot \frac{(2)^n - (2)^2}{(2)^n - (2)^2} \right. \\ \left. - \frac{(2)^2}{(2)^2} \dots - \frac{(2)^2}{(2)^2} \dots + \frac{(2)^2}{(2)^2} \dots + \frac{(2)^2}{(2)^2} \right. \\ \left. - \frac{(2)^2}{(2)^2} \dots - \frac{(2)^2}{(2)^2} \dots + \frac{(2)^2}{(2)^2} \dots + \frac{(2)^2}{(2)^2} \right. \\ \left. 0 \dots - \frac{(2)^2}{(2)^2} \dots 0 \dots + \frac{(2)^2}{(2)^2} \right. \\ \left. + \frac{(2)^2}{(2)^2} \dots - \frac{(2)^2}{(2)^2} \dots - \frac{(2)^2}{(2)^2} \dots + \frac{(2)^2}{(2)^2} \right. \\ \left. + \frac{(2)^2}{(2)^2} \dots 0 \dots - \frac{(2)^2}{(2)^2} \dots 0 \right. \\ \left. + \frac{(2)^2}{(2)^2} \dots + \frac{(2)^2}{(2)^2} \dots - \frac{(2)^2}{(2)^2} \dots - \frac{(2)^2}{(2)^2} \right. \\ \left. 0 \dots + \frac{(2)^2}{(2)^2} \dots 0 \dots - \frac{(2)^2}{(2)^2} \right) = (2)^n.$$

Ceter

## 42 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

Cette loi est telle dans chaque colonne, qu'à commencer au 3.<sup>me</sup> terme de chacune d'elles, & dont les quatre pris ensemble, forment la 3.<sup>me</sup> puissance de  $1+1$ , qui est la première des puissances de  $1+1$  qui ait quatre termes; cette loi, dis-je, est telle, que depuis le 3.<sup>me</sup> jusques & compris le 10.<sup>me</sup> depuis le 11.<sup>me</sup> jusques & compris le 18.<sup>me</sup>, \* & depuis le 19.<sup>me</sup> jusques & compris le 26.<sup>me</sup>, & ainsi de suite à l'infini, en les prenant de huit en huit, ces huit termes ont pour formules générales les huit formules qui sont écrites au-dessous de chaque colonne.

Ensorte que si l'on demande le 21.<sup>me</sup> terme de chaque colonne, ce qui est la même chose que les quatre sommes qui résultent des termes de la 21.<sup>me</sup> bande perpendiculaire du Triangle arithmétique pris de quatre en quatre, il faut d'abord de 21 en retrancher 2, à cause que la loi ne commence qu'au 3.<sup>me</sup> terme, il reste 19, ensuite il faut ôter de ce nombre 8 autant de fois qu'il est possible, il restera 3, ce qui indique que les

$$3^{\text{mes}} \text{ formules: } \frac{(2)^n - (2)^{\frac{n+1}{2}}}{4} \cdot \frac{(2)^n - (2)^{\frac{n+1}{2}}}{4}$$

$$\frac{(2)^n + (2)^{\frac{n+1}{2}}}{4} \cdot \frac{(2)^n + (2)^{\frac{n+1}{2}}}{4} \text{ qui sont écrites}$$

sous chaque colonne, sont celles dont il faut se servir pour le cas proposé.

Si donc on substitue 21 pour  $n$ , dans ces for-

mules, on aura  $\frac{(2)^{21} - (2)^{11}}{4} \cdot \frac{(2)^{21} - (2)^{11}}{4}$ .

$\frac{(2)^{21} + (2)^{11}}{4} \cdot \frac{(2)^{21} + (2)^{11}}{4}$ , ou ces quatre nombres 523776. 523776. 524800. 524800.

Si l'on demande le 104.<sup>me</sup> terme de chaque colonne de 104, il faut ôter 2, il reste 102; il faut ensuite diviser 102 par 8, il vient 12, & il reste 6. Ce nombre 6 indique les 6.<sup>mes</sup> formules qui sont sous chaque colonne.

Ces formules sont  $\frac{(2)^{n+2} + (2)^2}{4} \cdot \frac{(2)^n}{4}$ .

$\frac{(2)^{n+2} - (2)^2}{4} \cdot \frac{(2)^n}{4}$ , dans lesquelles si l'on

substitue 104 pour  $n$ , il viendra  $\frac{(2)^{104} + (2)^2}{4} \cdot \frac{(2)^{104}}{4}$ .

$\frac{(2)^{104} - (2)^2}{4} \cdot \frac{(2)^{104}}{4}$  pour les qua-

tre quantités qui résultent de la 104.<sup>me</sup> bande perpendiculaire du Triangle arithmétique, dont les termes sont pris de quatre en quatre.

Mais on a montré que pour résoudre le cas irréductible dans l'exemple proposé de  $a=b$ , il falloit ôter d'un terme \* quelconque de la première colonne, le terme correspondant de la troisième colonne. \* Pag. 33. in 4.

Si donc des huit formules de la première colonne on ôte les huit formules de la troisième, on aura

$$\begin{array}{lcl}
 -\frac{2}{4} \times (2)^{\frac{n+1}{2}} = -(2)^{\frac{n-1}{2}} & & \\
 -\frac{2}{4} \times (2)^{\frac{n+2}{2}} = -(2)^{\frac{n}{2}} & & \\
 -\frac{2}{4} \times (2)^{\frac{n+1}{2}} = -(2)^{\frac{n-1}{2}} & & \\
 0 & = & 0 \\
 +\frac{2}{4} \times (2)^{\frac{n+1}{2}} = +(2)^{\frac{n-1}{2}} & & \\
 +\frac{2}{4} \times (2)^{\frac{n+2}{2}} = +(2)^{\frac{n}{2}} & & \\
 +\frac{2}{4} \times (2)^{\frac{n+1}{2}} = +(2)^{\frac{n-1}{2}} & & \\
 +\frac{2}{4} \times (2)^{\frac{n+1}{2}} = +(2)^{\frac{n-1}{2}} & & \\
 0 & = & 0
 \end{array}
 \left. \vphantom{\begin{array}{l} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array}} \right\} = \pm (2)^{\frac{n-1}{2}}, \text{ ou } \pm (2)^{\frac{n}{2}}, \text{ ou } 0.$$

D'où l'on voit que ces huit différences se réduisent aux trois  $\pm (2)^{\frac{n-1}{2}}$ ,  $\pm (2)^{\frac{n}{2}}$ , & 0.

La première  $\pm (2)^{\frac{n-1}{2}}$  convient à toutes les bandes impaires du Triangle arithmétique; car on voit qu'elle résulte des 1.<sup>re</sup> 3.<sup>me</sup> 5.<sup>me</sup> & 7.<sup>me</sup> formules.

Les deux autres  $\pm (2)^{\frac{n}{2}}$  & 0 conviennent à toutes les bandes paires du même Triangle, puisqu'elles résultent des 2.<sup>me</sup> 4.<sup>me</sup> 6.<sup>me</sup> & 8.<sup>me</sup> formules, où il est encore à remar-

quer que la première  $\pm (2)^{\frac{n}{2}}$  de ces deux dernières, convient aux bandes paires 2, 6, 10, &c.

&c. & que la seconde zéro, convient aux bandes paires 4, 8, 12, &c.

\* On voit donc par tout ce qui vient de <sup>\* Pag. 34.</sup> tre dit, que les quatre sommes qui résultent in 4.

de l'assemblage de tous les termes, pris de quatre en quatre, d'une bande perpendiculaire du Triangle arithmétique, ou, ce qui revient au même, que les quatre sommes formées par l'assemblage de tous les termes de la puissance  $n$  de la quantité  $1+1$  ou 2, pris de 4 en 4, que ces quatre sommes, dis-je, sont telles, que la différence de la première à la troisième, pour toutes les puissances im-

paire, sera  $+(2)^{\frac{n-1}{2}}$ , & pour toutes les puissances paires, que cette différence sera

$+(2)^{\frac{n}{2}}$  ou zéro.

Si donc on reprend la quantité

$$2b^n \times \left\{ \begin{array}{l} 1 - \frac{n \times n - 1}{1 \times 2} + \frac{n \times n - 1 \times n - 2 \times n - 3}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \\ - \frac{n \times n - 1 \times \dots n - 5}{1 \cdot 2 \dots 6} + \frac{n \times n - 1 \times \dots n - 7}{1 \cdot 2 \dots 8} \\ - \frac{n \times n - 1 \times \dots n - 9}{1 \cdot 2 \dots 10} + \frac{n \times n - 1 \times \dots n - 11}{1 \cdot 2 \dots 12} \\ - \frac{n \times n - 1 \times \dots n - 13}{1 \cdot 2 \dots 14} + \frac{n \times n - 1 \times \dots 15}{1 \cdot 2 \dots 16} \\ - \&c. \end{array} \right.$$

dont on a vu que la somme devoit fournir la solution du Cas irréductible dans la supposition de  $a=b$ , ou de  $\frac{1}{2}q = \sqrt{\left(\frac{1}{27}p^3 - \frac{1}{4}qq\right)}$ , & que l'on substitue pour la suite sa valeur

$\pm$



+ (2) <sup>2</sup> qui suppose que  $n$  est un nombre impair, on aura  $2b^n \times (2)^{\frac{n-1}{2}} = b^n \times (2)^{\frac{n+1}{2}}$ , ou en mettant pour  $n$ , sa valeur  $\frac{2}{3}$ , on aura

$\sqrt[3]{b \times (2)^{\frac{2}{3}}} = \sqrt[3]{b} \times \sqrt[3]{4}$ ; & en mettant encore pour  $\sqrt[3]{b}$ , sa valeur  $\sqrt[3]{(\frac{1}{27}p^3 - \frac{1}{4}qq)}$ , on aura  $\sqrt[3]{4 \sqrt[3]{(\frac{1}{27}p^3 - \frac{1}{4}qq)}}$ . Mais de ce que  $\frac{1}{2}q = \sqrt[3]{(\frac{1}{27}p^3 - \frac{1}{4}qq)}$  on tire  $q = \frac{1}{3}p \sqrt[3]{(\frac{2}{3}p)}$ ; si donc on substitue pour  $q$ , cette valeur, on aura  $\sqrt[3]{(\frac{2}{3}p)}$ , la racine cherchée est donc  $\sqrt[3]{(\frac{2}{3}p)}$ .

L'Equation générale est  $x^3 - px + q = 0$ , & dans le \* cas présent est  $x^3 - px + \frac{1}{3}p \sqrt[3]{(\frac{2}{3}p)} = 0$ , dont la racine, selon la formule de Cardan, est  $\sqrt[3]{[\frac{1}{6}p \sqrt[3]{(\frac{2}{3}p)} + \sqrt[3]{(\frac{1}{27}p^3 - \frac{1}{27}p^3)]}$   
 $+ \sqrt[3]{[\frac{1}{6}p \sqrt[3]{(\frac{2}{3}p)} - \sqrt[3]{(\frac{1}{27}p^3 - \frac{1}{27}p^3)]}$   
 $= \sqrt[3]{[\frac{1}{6}p \sqrt[3]{(\frac{2}{3}p)} + \sqrt[3]{(-\frac{1}{27}p^3)}]} + \sqrt[3]{[\frac{1}{6}p \sqrt[3]{(\frac{2}{3}p)} - \sqrt[3]{(-\frac{1}{27}p^3)}]} = \sqrt[3]{(\frac{1}{27}p^3)} \times [\sqrt[3]{(1 + \sqrt[3]{-1})} + \sqrt[3]{(1 - \sqrt[3]{-1})}] = \sqrt[3]{(\frac{1}{27}p^3)} \times \sqrt[3]{\frac{1}{2} \times [\sqrt[3]{(1 + \sqrt[3]{-1})} + \sqrt[3]{(1 - \sqrt[3]{-1})}]}$ . & qui par notre formule est  $\sqrt[3]{(\frac{2}{3}p)}$ .

# E X E M P L E.

La formule générale de notre supposition, qui

qui est  $x^3 - px + \frac{1}{3}p\sqrt{\frac{2}{3}p} = 0$ , étant donc  
divisée par  $x - \sqrt{\frac{2}{3}p} = 0$ , il viendra  $xx$   
 $+ x\sqrt{\frac{2}{3}p} - \frac{1}{3}p = 0$ , qui donne pour les  
deux autres racines  $x = -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{3}p} \pm \sqrt{\frac{1}{3}p + \frac{1}{12}p}$ , ou  $x = -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{3}p} \pm \sqrt{\frac{1}{3}p}$ .

Ainsi les trois racines de l'Equation

$$x^3 - px + \frac{1}{3}p\sqrt{\frac{2}{3}p} = 0$$

$$\text{sont } x + \sqrt{\frac{1}{3}p} + \sqrt{\frac{1}{3}p} = 0$$

$$x + \sqrt{\frac{1}{3}p} - \sqrt{\frac{1}{3}p}$$

$$x - \sqrt{\frac{2}{3}p}$$

toutes trois réelles, inégales & incommen-  
surables.

Si  $p = 12$ , l'Equation sera

$$x^3 - 12x + 8\sqrt{2} = 0,$$

les racines seront  $x + \sqrt{2} + \sqrt{6} = 0$ .

$$x + \sqrt{2} - \sqrt{6} = 0.$$

$$x - 2\sqrt{2} \dots = 0.$$

Si  $p = 8\sqrt{5}$ , l'Equation sera

$$x^3 - 8x\sqrt{5} + \frac{8}{3}\sqrt{5} = 0,$$

les racines seront  $x + \sqrt{\frac{4}{3}\sqrt{5}} + \sqrt{4\sqrt{5}}$ .

$$x + \sqrt{\frac{4}{3}\sqrt{5}} - \sqrt{4\sqrt{5}}.$$

$$x - 2\sqrt{\frac{4}{3}\sqrt{5}}.$$

### \* REMARQUE.

\* Pag. 36.  
in 4.

On a vu dans le second des deux Mémoi-  
res imprimés sur cette matière dans le Volu-  
me de l'année 1738, p. 346, que de l'Equa-  
tion générale  $x^3 - px + q = 0$ , on tire les  
deux autres  $x^3 - dd x + 4q = 0$  &  $d^3 - 3pd$   
 $+ \sqrt{4p^3 - 27qq} = 0$ , en supposant que  $d$   
est la différence de deux quelconques des  
trois racines renfermées dans l'Equation  $x^3 - px$   
 $+ q = 0$ .

Cette

Cette Equation, dans le cas présent, est

$$x^3 - px + \frac{1}{3}p\sqrt{\left(\frac{2}{3}p\right)} = 0,$$

dont les trois racines sont

$$x = \sqrt{\left(\frac{2}{3}p\right)}, x = \sqrt{\left(\frac{1}{2}p\right)} - \sqrt{\left(\frac{1}{6}p\right)},$$

$$\& x = -\sqrt{\left(\frac{1}{2}p\right)} - \sqrt{\left(\frac{1}{6}p\right)}.$$

Les trois différences de ces trois racines

$$\text{font } d = \sqrt{(2p)}, d = \sqrt{\left(\frac{1}{2}p\right)} - \sqrt{\left(\frac{1}{2}p\right)},$$

$$\& d = -\sqrt{\left(\frac{1}{2}p\right)} - \sqrt{\left(\frac{1}{2}p\right)},$$

qui sont les trois racines de l'Equation

$$d^3 - 3pd + \sqrt{(4p^3 - 27pq)} = 0$$

qui se réduit, dans notre cas, à  $d^3 - 3pd + p\sqrt{(2p)} = 0$ .

Les quarrés de ces trois différences sont

$$dd = 2p, dd = 2p - p\sqrt{3}, dd = 2p + p\sqrt{3}.$$

Ces trois valeurs de  $dd$ , étant substituées dans l'Equation  $x^3 - dd x + 4q$ , qui est dans notre cas

$$x^3 - dd x + \frac{4}{3}p\sqrt{\left(\frac{2}{3}p\right)} = 0,$$

il viendra les trois Equations

$$x^3 - x \times (2p) + \frac{4}{3}p\sqrt{\left(\frac{2}{3}p\right)} = 0.$$

$$x^3 - x \times (2p - p\sqrt{3}) + \frac{4}{3}p\sqrt{\left(\frac{2}{3}p\right)} = 0.$$

$$x^3 - x \times (2p + p\sqrt{3}) + \frac{4}{3}p\sqrt{\left(\frac{2}{3}p\right)} = 0.$$

Ces trois nouvelles Equations feront encore trois nouvelles formules, dont on aura les trois racines de chacune.

\* Pag.  
37<sup>a</sup> in 4.

\* Les trois racines de la première sont

$$x = \sqrt{\left(\frac{2}{3}p\right)}, x = \sqrt{\left(\frac{1}{2}p\right)} - \sqrt{\left(\frac{1}{6}p\right)}, x = -\sqrt{\left(\frac{1}{2}p\right)} - \sqrt{\left(\frac{1}{6}p\right)}.$$

Les trois racines de la seconde sont

$$x = -\sqrt{\left(\frac{1}{2}p\right)} - \sqrt{\left(\frac{1}{6}p\right)}.$$

$$x = \frac{1}{2} \times [\sqrt{\left(\frac{1}{2}p\right)} + \sqrt{\left(\frac{1}{6}p\right)}] + \sqrt{\left(\frac{1}{2}p - \frac{1}{4}p\sqrt{3}\right)}.$$

$$x = \frac{1}{2} \times [\sqrt{\left(\frac{1}{2}p\right)} + \sqrt{\left(\frac{1}{6}p\right)}] - \sqrt{\left(\frac{1}{2}p - \frac{1}{4}p\sqrt{3}\right)}.$$

Les

Les trois racines de la troisième sont

$$x = \sqrt{\left(\frac{1}{2}p\right)} - \sqrt{\left(\frac{1}{6}p\right)}.$$

$$x = \frac{1}{2} \times \left[ \sqrt{\left(\frac{1}{6}p\right)} - \sqrt{\left(\frac{1}{2}p\right)} \right] + \sqrt{\left(\frac{1}{2}p + \frac{5}{4}p\sqrt{3}\right)}.$$

$$x = \frac{1}{2} \times \left[ \sqrt{\left(\frac{1}{6}p\right)} - \sqrt{\left(\frac{1}{2}p\right)} \right] - \sqrt{\left(\frac{1}{2}p + \frac{5}{4}p\sqrt{3}\right)}.$$

Car on a vu dans le Mémoire cité, que chacune de ces trois Equations devoit avoir une des trois racines de l'Equation primitive

$$x^3 - px + \frac{1}{3}p\sqrt{\left(\frac{2}{3}p\right)} = 0.$$



## \* THEORIE CHYMIQUE \* Pag. 38. in 4.

### DE LA TEINTURE DES ETOFFES.

#### Second Mémoire.

Par Mr. HELLOT (a).

#### DU ROUGE ET DU JAUNE.

DANS le Mémoire que je lus au mois de Juin de l'année dernière, sur l'art de la Teinture, je m'étois proposé de démontrer que la différence des couleurs qu'on nomme de *bon teint*, & de celles qui ne sont que de *petit* ou de *faux teint*, dépendoit en partie de la préparation du sujet qu'on vouloit teindre, & en partie du choix des matières colorantes qu'on employoit ensuite. Je suis obligé, pour plus de clarté, de répéter ici ce que j'ai déjà dit, & qu'on peut regarder, à ce que je crois, comme les principes généraux.

(\*) 20 Mai 1741.

généraux de cet art, que toute la mécanique invisible de la Teinture consiste à dilater les pores du corps à teindre, à y déposer des particules d'une matière étrangère, & à les y retenir, de manière que ni l'eau de la pluie, ni les rayons du Soleil, ne puissent les en faire sortir; à choisir des particules colorantes d'une telle ténuité, qu'elles soient retenues, suffisamment enchaînées, dans les pores du sujet, ouverts par la chaleur de l'eau bouillante, puis resserrés par le froid, & de plus, enduits de l'espèce de mastic que laissent dans ces pores les sels choisis pour les préparer. J'ajoutai aussi que les couleurs n'étoient de faux teint, que parce qu'on ne préparoit pas suffisamment le sujet, en sorte que les particules colorantes n'étant que déposées sur la surface naturellement trop lisse des corps, ou dans des pores dont la capacité n'étoit pas suffisante pour les recevoir, il étoit impossible que le moindre choc ne les en détachât.

\* Il est vrai qu'il y a des matières, le bois de Brésil, par \* exemple, dont les parties colorantes, appliquées sur une étoffe non préparée, la font paroître d'un rouge assez beau les premiers jours; mais ce rouge se ternit & s'efface à l'air de telle sorte, qu'on ne soupçonneroit pas, au bout de quelques mois, que cette étoffe eût été teinte de cette couleur. De cette expérience, plusieurs fois répétée, on a conclu que ce bois, & en général presque tous les bois de teinture, étoient de faux teint, & en conséquence il a été défendu aux Teinturiers du bon teint de s'en



s'en servir. Mais il ne seroit peut-être pas impossible de faire voir que le défaut qu'on reproche à ces bois, d'ailleurs fort utiles dans la teinture des étoffes de bas prix, ne doit être imputé qu'à ce que la manière de les mettre en usage est encore ignorée, & que ces bois pourroient être employés presque aussi utilement dans le bon teint, puisqu'on peut tirer de celui de Fernambouc une couleur rouge beaucoup plus belle que les rouges de Garance, & que cette couleur, que j'ai exposée à l'air & à la pluie pendant trois mois de suite de l'hiver dernier, n'y a cependant rien perdu de son rouge, & s'y est seulement fanée, peut-être beaucoup moins que n'auroit fait l'écarlate la mieux teinte.

Communément on admet pour couleurs de bon teint toutes celles qui, exposées au Soleil & au ferein pendant douze jours complets, ne changent point, ou qui prennent une teinte un peu plus foncée sans perdre leur nuance principale. Toute couleur au contraire qui, pendant le même espace de tems, s'éclaircit trop, se décharge & change, est réputée de mauvais teint. Mais comme cette épreuve, la seule véritable, & qui seule devoit suffire, ne peut être mise en usage dans les cas où il faut juger sur le champ si une étoffe, exposée en vente dans une Foire ou ailleurs, est de bon teint, au cas que son prix l'exige, il a fallu trouver des moyens de lui faire perdre, en peu de minutes, tout ce qu'elle perdrait étant exposée pendant douze ou quinze jours au Soleil. Il y a dans le Règlement de Mr. Colbert sur les Teintures, quelques méthodes

\* Pag. 40. in 4. thodes prescrites pour les éprouver. \* Cependant l'expérience ayant fait connoître que ces méthodes étoient insuffisantes pour certaines couleurs, feu Mr. du Fay a travaillé longtems pour en trouver qui fussent ou plus générales ou plus sûres; & c'est d'après un très grand nombre d'expériences, qu'il a faites avec beaucoup de soins, qu'on a rédigé la nouvelle instruction sur ces sortes d'épreuves, auxquelles on a donné le nom de *Débouillis*. Elle se trouve imprimée à la suite du Règlement de 1737, sur les Teintures.

Quelques-uns de ces débouillis se font par le Savon, d'autres par l'alun, d'autres par le Tartre rouge, d'autres enfin par le Tartre rouge & l'Alun mêlés ensemble. Mais comme des règles générales, pour de pareilles épreuves, doivent être sujettes à bien des exceptions, ou qu'on n'a pu prévoir, ou qui, ayant été prévues, n'ont pu être détaillées sans courir le risque de faire naître de la confusion & des sujets de contestations sans nombre, il est clair que ces règles, données comme trop générales, sont aussi trop rigoureuses dans plusieurs cas, où des couleurs claires demanderoient des sels moins actifs que des couleurs bien chargées, qui peuvent perdre une quantité considérable des particules qui les teignent, sans qu'on y apperçoive des changemens fort sensibles. Il auroit donc fallu prescrire un débouilli presque pour chaque nuance; ce qui étoit impossible, vu leurs variétés. Ainsi l'Air & le Soleil sont la véritable épreuve; & toute couleur qui leur résiste pendant un certain tems, ou qui y acquiert ce que les Teinturiers nomment

ment du *fond*, doit être réputée de bon teint, quand même elle changeroit beaucoup aux débouillis prescrits dans la nouvelle instruction. L'Ecarlate en est un exemple: comme le Savon emporte entierement cette couleur, on l'a soumise à l'épreuve de l'Alun de Rome; & quand elle est de pure Cochenille, elle y doit prendre une couleur pourpre. Cependant si on expose de l'écarlate au Soleil, elle y perd à la vérité son vif, & devient plus foncée, mais cette nuance foncée n'est pas celle que l'Alun lui donne. Ainsi les débouillis ne peuvent pas, dans \* ce cas & dans plusieurs autres, être substitués à l'action de l'air & du Soleil, quant à la parité de l'effet. J'ai cru devoir commencer par ce que je viens de lire, avant que de décrire les procédés qui donnent aux étoffes la couleur rouge, afin qu'on fût d'avance ce que c'est qu'une couleur de bon teint chez les Teinturiers.

\* Pag.  
41. in 4.

La couleur rouge étant une des cinq couleurs primitives de l'art de la Teinture, & l'une des trois avec lesquelles on peut faire mécaniquement presque toutes les couleurs, à l'exception du noir, elle devoit suivre le bleu, dont j'ai traité dans mon premier Mémoire, & être suivie du jaune par lequel je finirai celui-ci, où je mettrai le moins de détails ennuyeux qu'il me sera possible.

Les matières qu'on employe dans l'usage ordinaire, pour faire les rouges de bon teint, sont la racine de Garence & le Kermès. Pour les rouges de feu, dits écarlate, & pour les pourpres & cramoisis, on se sert des parties

ties colorantes de la Gomme-lacque, de la Cochenille mesteque ou cultivée, & quelquefois de la Cochenille sylvestre, qui ne fait pas si beau, dont il faut au moins quatre parties pour faire l'effet d'une seule de mesteque, & qui par conséquent n'est pas beaucoup en usage. On tire encore des rouges assez beaux du *Coccus Polonicus*, autre espèce de petit insecte dont on faisoit autrefois un grand commerce en Pologne, mais dont l'effet n'est pas comparable à celui de la Cochenille. Quant à la Pérelle, l'Orseille des Canaries, préparées, les bois de Brésil, de Sainte-Marthe, de Fernambouc & autres, les rouges qu'ils donnent, en suivant les méthodes consacrées par la routine de l'ouvrier, sont souvent fort beaux, mais de peu de durée, ou parce que leur couleur est trop volatile pour ne pas s'évaporer à l'air, ou parce qu'on n'a pas encore trouvé, comme je l'ai dit, le moyen de la fixer sur les étoffes. Le Roucou, le Safran bâtard bien dégorgé, donnent aussi de fort beaux rouges, mais qui ne résistent pas plus que les précédens. Ainsi l'emploi de ces drogues a été prohibé dans le bon teint.

\* Pag. 42. in 4. \* La Racine de Garence ou de *Rubia Tinctorum*, est la seule partie de cette plante qui serve à la Teinture. De tous les rouges, c'est le sien qui est le plus ténace, quand il est appliqué sur une Laine bien dégraissée, puis préparée par les Sels avec lesquels on l'a fait bouillir pendant deux ou trois heures, sans quoi ce rouge, presque inaltérable après cette



cette préparation du sujet, ne résisteroit pas plus aux épreuves que les rouges des autres ingrédiens de faux teint. C'est ce qui prouve ce que j'ai déjà dit, que les pores de la Laine doivent être non seulement bien nettoyés de la graisse ou transpiration de l'animal, qui peut y être encore restée, malgré le dégraissage ordinaire, qui se fait dans trois parties d'eau & une partie d'urine, mais encore qu'il faut que ces mêmes pores soient enduits d'une couche de quelques Sels que j'ai nommé *durs*, dans mon premier Mémoire, parce qu'ils ne se calcinent point à l'air, & que l'eau de la pluie ni l'humidité de l'air ne peuvent les dissoudre. Tel est le Tartre blanc ou rouge, ou le cristal de Tartre, dont on met pour l'ordinaire un quart ou un tiers dans le bouillon préparant, avec deux tiers ou trois quarts d'Alun.

La racine de Garence la plus belle, vient ordinairement de Zélande, où l'on cultive cette plante dans les Isles de Tergoes, Zirikzée, Sommerdyck & Thoolen: celle de la première de ces Isles est estimée la meilleure. Le terroir en est argilleux, gras & un peu salé. Les terres qu'en général on préfère pour cette culture, sont les terres neuves qui n'ont servi auparavant qu'à des pâturages. Les Zélandois ont obligation de la culture de cette plante & du grand commerce qu'ils font de la racine, aux Réfugiés de Flandres qui la leur ont portée.

On la connoît dans le commerce sous les noms de Garence-grappe, de Garence robée & de Garence non-robée: c'est pourtant la même



racine ; toute la différence pour la qualité , est que la grappe ou robée se prépare avec la racine dépouillée de son écorce , & que la non robée contient cette écorce & les petites racines qui sortent de la racine principale.

\* Pag. 43. in 4. \* L'une & l'autre se fabriquent par un seul & même travail , que je ne détaillerai point ici , pour ne pas allonger inutilement ce Mémoire. Il consiste à trier les plus belles racines pour la première sorte , à les faire sécher avec de certaines précautions , à les moudre , à en séparer l'écorce au moulin , & à conserver le milieu de la racine moulue dans des tonneaux , où on la laisse deux ou trois ans , parce qu'après ce tems elle est meilleure pour la teinture qu'elle ne l'auroit été en sortant du moulin. Si la Garence n'étoit pas enfermée de la sorte , elle s'éventerоit , & la couleur en auroit moins de vivacité. Elle est d'abord jaune dans le tonneau , mais elle rougit & brunit en vieillissant. Il faut , pour l'usage de la teinture , la choisir d'une couleur de Safran , en mottes les plus fermes , & d'une odeur forte , qui cependant ne soit pas désagréable. On la cultive aussi aux environs de Lille en Flandres & dans quelques endroits du Royaume où l'on a reconnu qu'elle croissoit naturellement.

Les Garences qu'on employe dans les Indes orientales & dans le Levant pour la teinture des Cotons , sont un peu différentes de celle de ce país. On les nomme *Chat* à la Côte de Coromandel , où cette racine est apportée des Bois de la Côte de Malabar : c'est le *Chat sauvage*. Le cultivé vient de

Vaour

Vaour & de Tuccorin, mais le plus estimé de tous est le *Chat de Perse*, qu'on nomme *Dumas*. On recueille aussi sur la Côte de Coromandel la racine d'une autre plante nommée *Raye de Chaye*, ou *Racine de couleur*. C'est une racine longue & menue, qui donne au Coton une belle couleur rouge, lorsqu'il a reçu toutes les préparations qui doivent précéder sa teinture & la suivre. On cultive à Kurder, au voisinage de Smyrne, & dans les campagnes d'Ak-hissar & de Yordas, à trois petites journées de la même Ville, une Garence qu'on nomme dans le pays *Chioc-boya*, *Ekme*, *Hazala*. C'est de toutes les Garences la meilleure pour la teinture rouge, selon les épreuves qui en ont été faites. Aussi est-elle beaucoup plus estimée dans le Levant que celle de Zelande que les Hollandois y portent. Cette même Garence \* est nommée par les Grecs modernes *Lizari*, & par les Arabes *Fouoy*. Il y a encore une autre sorte de Garence naturelle au Canada, connue sous le nom de *Tyssavoyana*: c'est une racine extrêmement menue, qui fait à peu près le même effet que notre Garence d'Europe.

Pour teindre un drap blanc bien dégraissé, en rouge de Garence, on le fait bouillir pendant trois heures au moins dans une chaudière, où l'on a mis la quantité d'eau nécessaire, avec 4 ou 5 onces d'Alun de Rome, 1 ou 2 onces de Tartre crud pour chaque livre de drap, & environ un quinzième d'eau sure, qui est une décoction de son de Froment qu'on a laissé aigrir. Après l'avoir retiré de la chau-

dière, on l'exprime légèrement, & on le porte tout humide dans un lieu frais, où on le laisse sept à huit jours, afin que les sels aient le tems d'agir dessus, & de préparer les pores de la Laine à recevoir la teinture. Ce tems étant expiré, on lave ce drap pour emporter les saletés superficielles que le Tartre pourroit y avoir laissées; car les sels qu'on employe en teinture ne sont jamais les plus purs: les Ouvriers sont trop avides de gain pour ne pas choisir ceux qui leur content le moins. Pour teindre ce drap garni de sels, on prépare un nouveau bain d'eau nette, & lorsque cette eau est seulement tiède, ou qu'on peut encore y tenir la main, on y jette une demi-livre de la plus belle Garence-grappe pour chaque livre de drap, on la brouille bien dans la chaudière; quand on s'apperçoit qu'elle a donné sa teinture à l'eau, qui doit toujours rester entre le tiède & le bouillon, on y plonge le drap, que l'on roule sans discontinuer, sur un rouet bas, assujetti au dessus de la chaudière, afin que la couleur prenne uniment. Sans cette agitation continuelle, l'étoffe seroit teinte inégalement, & l'on y verroit des places de différentes couleurs. Lorsque l'eau du bain ne paroît plus colorée, ou qu'elle n'a plus qu'une couleur de paille, c'est une marque que toute la teinture de la Garence s'est appliquée sur le drap: alors on augmente le feu pour faire bouillir cette eau pendant quelques minutes; ce qui achève d'assurer la teinture \* sur l'étoffe, parce que la simple chaleur de l'eau tiède n'auroit pas été suffisante pour la parfaite dissolution du

Tar-

\* Pag. 45.  
in 4.

Tartre crud, resté adhérent aux fibres de la Laine.

Ces rouges de Garence ne sont jamais beaux comme ceux du Kermès, & le sont beaucoup moins que ceux de la Gomme-laque ou de la Cochenille; mais ils content peu, & par conséquent on s'en sert pour les étoffes communes, dont le bas prix ne pourroit pas supporter celui d'une teinture plus chère. Tous les rouges de l'Infanterie & de la Cavalerie sont ordinairement des rouges de Garence, qu'on rend plus vifs quelquefois, en les falsifiant, malgré les défenses, avec des drogues de petit teint.

J'ai déjà dit que la Garence employée sans avoir passé les étoffes au bouillon d'Alun & de Tartre, leur laisse sa couleur rouge; mais elle la donne mal unie, & de plus elle n'a aucune solidité. Ce sont donc les sels qui en assurent la teinture. Ainsi la question est de savoir si c'est simplement en dérochant, pour ainsi dire, les pores de la Laine, c'est-à-dire, en ôtant les restes de la transpiration huileuse du Mouton, qu'on les prépare à recevoir plus immédiatement les particules colorantes de la racine, ou bien si une portion de ces sels, sur-tout de celui des deux qui ne peut être emporté même par l'eau tiède, y reste pour happer, saisir & mastiquer ensuite l'atome colorant dans les pores de la Laine, ouverts & dilatés par la chaleur de l'eau pour le recevoir, & resserés ensuite par le froid pour le retenir. Pour déterminer ceux qui seroient de la première opinion, il n'y a qu'à substituer à



l'Alun & au Tartre crud quelque sel alkali, comme Potasse, lessive clarifiée de Cendres ordinaires, ou autre sel lixiviel pur, mis en proportion convenable pour ne pas fondre la Laine; & ensuite passer l'étoffe dans un bain de Garence, le drap en sortira coloré, mais cette couleur n'aura aucune solidité; la seule eau bouillante en emportera plus des trois quarts. Or on ne peut pas dire qu'un sel alkali fixe soit incapable de dérocher les pores de la Laine de leur suain ou graisse de Mouton, puisque les sels \* lixiviels sont employés avec un succès connu, dans tous les cas où il s'agit d'ôter à une étoffe, de quelque genre qu'elle soit, la graisse qui l'a tachée, & que l'eau seule n'enleveroit pas, puisqu'avec cette graisse étrangère à l'étoffe & le sel alkali il se fait une espèce de savon que l'eau emporte ensuite aisément. De plus, prenez un morceau de drap teint en rouge de Garence selon la méthode ordinaire du bon teint, faites-le bouillir quelque tems dans la solution du sel alkali fixe mis en petite dose, vous détruirez aussi la couleur, parce que l'alkali fixe attaquant les petits atomes de cristall de Tartre ou de Tartre crud, qui tapissent les pores des fibres de la Laine, il s'en compose un Tartre soluble que l'eau dissout, comme on le fait, très aisément, & par conséquent les pores s'étant ouverts dans l'eau chaude de cet essai, l'atome colorant en est sorti avec l'atome salin qui le mastiquoit. Si on lave ce drap dans de l'eau froide, on voit le surplus de la couleur s'y délayer, & il reste d'une couleur demi-fauve ou sale.

Si,



Si, au-lieu de Sel alkali simple, on se sert de Savon; qui est un sel alkali mitigé par l'huile, & qu'on y fasse bouillir pendant quelques minutes un autre morceau de drap teint comme le précédent, le rouge en deviendra plus beau, parce que l'alkali enveloppé d'huile, n'a pu attaquer le sel acide végétal du Tartre crud, & l'ébullition n'a fait que détacher les particules colorantes mal enchaînées: leur nombre diminuant, ce qui en reste, doit donner une couleur moins chargée & plus claire.

J'ajouterai pour surcroît de preuves de l'existence actuelle des fels dans les pores d'une Laine teinte en rouge de Garéncé, que le plus ou le moins de Cristal de Tartre donne des variétés infinies, non seulement de nuances, mais même de couleurs, avec cette seule racine; car si l'on diminue la dose de l'Alun, & qu'on augmente celle du Tartre, on a un rouge canelle, & même si l'on ne met dans le bouillon que du Tartre seul, on perd le rouge, & l'on n'a que du canelle foncé, ou couleur de fauve ou de racine, mais de très bon \* teint, parce que le Tartre crud, \* Pag. 47.  
in 4.  
qui est un sel acide, a tellement dissout la partie qui auroit coloré en rouge, qu'il n'en est resté qu'une très petite quantité avec les fibres ligneuses de la racine; laquelle alors rentre dans la classe des racines communes, qui pour l'ordinaire ne donnent qu'une couleur fauve, plus ou moins foncée, selon la quantité qu'on emploie. Il sera prouvé, dans la suite de ce Mémoire, que l'acide qui rend les rouges plus vifs, les dissout si l'on en met

trop, & les divise en des particules d'une si grande petitesse, qu'elles échappent à la vue. Si, au lieu de Tartre, qui est un sel dur, on employe dans le bouillon avec l'Alun un sel aisément dissoluble, tel que de Salpêtre, pour préparer l'étoffe à recevoir la teinture de la Garence, la plus grande partie de son rouge devient inutile; il disparoit ou ne s'applique pas, & l'on n'a qu'un canelle, à la vérité fort vif, mais qui ne résiste pas, parce que le Salpêtre se redissout trop aisément dans l'eau, où l'on fait dégorger l'étoffe après qu'elle est teinte.

Qu'à la place de ces deux sels on se serve de Sel de Glauber, on a une vilaine couleur fauve, qui ne tient ni à l'air ni aux autres épreuves, parce que ce sel se dissout trop facilement & se calcine de même.

Les sels alkalis volatils ou urineux qui développent de certaines plantes, telles que la Pérelle, l'Orseille des Canaries & d'autres Lichens, un fort beau rouge qu'on n'y auroit pas soupçonné auparavant, développent aussi le rouge de la Garence, mais en même tems ils lui communiquent leur volatilité, en sorte que lorsque j'ai voulu employer de la Garence que j'avois préparée comme on prépare l'Orseille, avec de l'Urine fermentée & de la Chaux vive, je n'ai eu que des couleurs de noisette, plus ou moins claires, mais qui sont solides, parce qu'il n'étoit entré dans le bain que la petite portion du volatil urineux qui humectoit la Garence: que l'ébullition a suffi pour le faire évaporer, & que d'ailleurs le drap étoit suffisamment garni des sels du bouil-

bouillon, fait à l'ordinaire, pour retenir ce qui étoit resté des parties colorantes de cette racine.

\* Quand on applique un rouge pur, celui de la Cochenille, par exemple, sur un drap Pag. 48.  
in 4.

précédemment teint en bleu, & ensuite préparé par le bouillon de Tartre & d'Alun pour recevoir ce rouge, on a un pourpre ou un violet, à proportion de la quantité de bleu, ou de la quantité de ce rouge pur. Le rouge de la Garence ne fait pas le même effet, parce que ce n'est pas un rouge pur comme celui de la Cochenille, & qu'ainsi que je l'ai dit plus haut, il est altéré par le fauve, couleur propre aux fibres ligneuses de cette racine comme aux fibres ligneuses de presque toutes les autres racines communes. Ainsi ce rouge sali par le fauve, fait sur le bleu une couleur de café ou de marron, plus ou moins foncé suivant l'intensité précédente du bleu appliqué le premier. Si on veut que ce café ou ce marron ait un reflet pourpré, il faut nécessairement y employer un peu de Cochenille pour le bon teint, & un peu d'Orseille ou de bois de Brésil pour le petit teint.

C'est afin d'éviter ce fauve des fibres ligneuses de la racine, que les Teinturiers qui font les plus beaux rouges de Garence, ont grand soin de n'employer le bain qu'à tiède, & de retirer l'étoffe trois ou quatre minutes après qu'il a commencé à bouillir; car pour peu que l'eau bouille davantage, la Garence rend un teint considérablement plus terne, parce qu'alors la chaleur de l'eau est assez forte pour que les particules qui colorent en fauve,

fauve, se détachent & s'appliquent avec les particules rouges. On éviteroit cet inconvénient, si dans le tems que la racine de Garence est encore fraîche, on pouvoit trouver le moyen de séparer aisément du reste de cette racine le cercle rouge qui est au dessous de sa pellicule brune, & qui entoure la moelle du milieu: mais ce travail augmenteroit trop le prix de cet ingrédient; & comme ce qu'on en sépareroit ainsi avec beaucoup de patience, ne donneroit jamais un rouge aussi beau que le rouge de la Cochenille, il paroît assez inutile de l'essayer en grand. Tout au plus pourroit-on le tenter pour teindre en rouge les Cotons dont le prix pourroit porter les frais de cette séparation.

\* Pag. 49.  
in 4.

\* La Garence s'employe avec la Cochenille pour faire les demi-écarlates: il en sera parlé à l'article de l'emploi de cet insecte. Je finirai celui-ci par une expérience qui m'a donné un pourpre assez beau sans employer de Cochenille, & sans que le drap eût été d'abord teint en bleu. J'ai fait bouillir un morceau de drap blanc, pesant demi-once, avec 10 grains d'Alun de Rome & 6 grains de Cristal de Tartre. Au bout d'un quart d'heure je l'ai retiré, exprimé & laissé refroidir; puis j'ai ajouté au même bain 24 grains de Garence-grappe: après qu'elle a eu fourni son teint à cette eau encore empreinte des sels, j'y ai fait tomber 20 gouttes d'une dissolution de Bismuth faite dans parties égales d'eau & d'esprit de Nitre, puis j'y ai replongé le drap. Au bout de demi-heure je l'ai retiré, exprimé & lavé; il étoit d'un cramoisi  
pres-



presque aussi beau que s'il eût été fait avec de la Cochenille, & même il avoit assez de fond ou assez de couleur unie pour rester en cet état. Cependant, pour voir quelle seroit la différence en augmentant la teinte, je le replongeai dans le même bain, je continuai de le faire bouillir encore un quart d'heure, & je l'eus d'un pourpre assez vif. Ce pourpre, qui est une découverte en teinture, & qui fournit à la Chymie des conséquences dont il sera parlé dans un autre article de ce Mémoire, ayant été éprouvé par le débouilli de l'Alun, s'y avive & s'embellit; & à celui du Savon, il reste d'un rouge beaucoup plus beau que les rouges ordinaires de Garence.

Si je garde pendant plusieurs jours le drap humecté de son bouillon de Tartre & d'Alun, qu'ensuite je le teigne dans un bain de Garence simple & sans sels, selon la méthode ordinaire, jusqu'à ce qu'il ait pris une couleur canelle vive, & qu'ensuite j'ajoute à ce bain de la même dissolution de Bismuth, je n'aurai qu'une couleur de marron & point de pourpre; ce qui fait voir combien il faut être exact en décrivant les procédés de Teinture, & que c'est par ce défaut d'exactitude que tous les Livres qu'on a publiés sur cet art, ont été jusqu'à présent inutiles, parce qu'on a négligé d'y \* indiquer des circonstances de manipulation absolument nécessaires pour réussir dans la couleur qu'on y cherche. Dans cette seconde expérience le drap a pris trop de sels, ils ont peut-être séjourné trop longtems dessus, & dans la teinture il n'y en avoit pas,

&amp;

\* Pag. 50.  
in 4.

& principalement d'Alun, qui pût précipiter la terre avec le Bismuth sur le teint de la Garence, précipitation qui s'opère par l'adsorption de cette racine. Je me suis peut-être trop étendu sur la pratique des teintures que l'on fait avec la Garence, mais j'ai cru devoir le faire pour être plus court dans les articles qui suivent.

Le Kermès est une Gale-insecte qui croît, qui vit & qui multiplie sur l'*Ilex aculeata cocci glandifera*. C.B.P. On le trouve dans les Garrigues des environs de Nauvert, de Mendemian & de Narbonne, mais en plus grande quantité en Espagne, du côté d'Alicante & de Valence. Les païsans du Languedoc le viennent vendre tous les ans à Montpellier & à Narbonne, aussi-tôt qu'ils en ont fait la récolte. Ceux qui l'achètent pour l'envoyer à l'étranger, l'étendent sur des toiles, & ont soin de l'arroser avec du Vinaigre pour tuer des vermineaux qui font quelquefois dedans, & qui produisent une poudre rouge, qu'en Espagne sur-tout, on sépare de la coque, après l'avoir laissé sécher, en la passant par un tamis. On en fait ensuite de grosses balles, & on met au milieu de chacune, dans un sac de peau, de cette poudre, au prorata de la quantité que toute la partie a produite, afin qu'en vendant les balles à différens particuliers, chacun ait sa portion de cette poudre. J'ai cherché de cette poudre à Paris, mais je n'en ai pu trouver chez aucun Marchand. On envoie ordinairement ces balles à Marseille, d'où on les fait passer dans le Levant

stant, principalement à Alger & à Tunis, où l'on assure qu'on fait un grand usage du Kermès dans la teinture.

Cet insecte, que quelques Teinturiers qui s'en servent encore, appellent *graine*, parce qu'il en a la figure, a servi autrefois à faire cette couleur rouge qu'on appelloit *Ecarlate de France*. Les draperies rouges des anciennes

Tapisseries\* sont teintes avec cet ingrédient, & leur couleur, qui dans quelques Ta-  
\* Pag. 31.  
in 4.

pigeries a jusqu'à 200 ans d'ancienneté, n'a presque rien perdu de sa vivacité. On connoit à présent cette couleur sous le nom d'*Ecarlate de Venise*, parce qu'elle y est extrêmement en usage, & qu'on y en fait plus qu'en aucun autre endroit de l'Europe. Le gout en a passé en France & dans la plupart des autres pays, parce qu'elle a effectivement moins de feu, & qu'elle est plus brune que l'écarlate moderne à laquelle on est accoutumé; mais elle a sur elle l'avantage de se soutenir plus longtems, & de n'être point tachée par la boue & par les liqueurs acres.

Voici de quelle manière on doit faire cette écarlate de Graine, qui n'est plus guère en usage que pour les Laines destinées aux tapisseries. On commence par ébrouer la Laine filée, c'est-à-dire, que pour 20 livres, on met dans la chaudière un demi-boisseau de Son, enfermé dans un sac, avec la quantité d'eau nécessaire pour que cette Laine y soit bien abreuvée; on la fait bouillir une demi-heure, après quoi on la retire de l'eau, on l'exprime, ou on la laisse égoutter pendant ce tems-là on prépare le bouillon, qui est

com-

composé d'environ un quart d'eau sure & de trois quarts d'eau de rivière, dans laquelle on met 4 livres d'Alun de Rome & 2 livres de Tartre rouge. Quand ce bain est bouillant, on y plonge les écheveaux de Laine, les tournant de tems en tems sur les bâtons qui les enfilent, & au bout de deux heures on les lève, & les ayant exprimés foiblement, on les enferme dans un sac de toile qu'on porte à la cave, où on les laisse cinq ou six jours, comme on a fait l'étoffe préparée pour le rouge de Garence. Le sixième jour on prépare un nouveau bain d'eau de rivière la plus claire, & lorsqu'elle commence à être tiède, on y jette 12 onces de Kermès pulvérisé, pour chaque livre de Laine, au cas qu'on veuille une écarlate bien pleine ou bien fournie de couleur. Si le Kermès étoit trop vieux, il en faudroit au moins livre pour livre. Quand le bain commence à bouillir, on y met la Laine, qui doit être encore humide: en cas qu'on l'eût laissé sécher, \* il faudroit l'humecter de nouveau dans de l'eau tiède; ce qui est une règle générale pour toutes les couleurs, parce que si on mettoit les Laines ou les étoffes, sèches, dans les bains de teinture, jamais elles ne prendroient la couleur également. Après que la Laine aura resté une bonne heure dans ce bain, où l'on doit avoir tourné & retourné les écheveaux autour de leurs bâtons, on la laissera égoutter, on l'exprimera & on la lavera en eau courante. Le Teinturier peut profiter du reste de son bain encore coloré, ce qui s'appelle une *saite*, & y teindre d'autres Lai-

\* Pag.  
2. in 4.



nes préparées par le bouillon des sels comme les précédentes, en des couleurs qui seront des nuances dégradées de la première. On peut donner un peu plus d'éclat à cette couleur, qui est rouge de sang, en passant la Laine dans un bain d'eau plus que tiède, où l'on a fait fondre une petite quantité de Savon. A la vérité, le Savon la *rose* un peu, c'est-à-dire, lui donne un petit œil tirant sur le cramoisi, mais elle en est plus belle. L'Eau-forte mise en petite quantité sur le bain de Kermès, ou encore mieux la Composition pour l'écarlate, dont il sera parlé ci-après, rend la couleur encore un peu plus agréable, mais alors elle est sujette à tacher à la boue.

Ce qui rend le rouge de Kermès aussi solide que celui de la Garence, c'est qu'il est appliqué sur une Laine préparée de même par des sels qui résistent à l'action de l'air & du Soleil: c'est aussi vraisemblablement parce que cet insecte s'étant nourri de la sève d'un arbrisseau astringent, a conservé cette propriété de donner plus de ressort aux parois des pores de la Laine pour se resserrer plus vite & plus fortement, quand elle sort de l'eau bouillante & qu'on l'expose à l'air froid. Que ce soit par cette raison, ou parce qu'il se fait avec les astringens une précipitation de la terre de l'Alun, j'ai remarqué que toutes les racines, les écorces, les fruits & les autres matières qui ont quelque adstriction, donnent toutes des couleurs de bon teint, en les employant avec l'Alun & le Tartre crud. Il sera encore parlé de cette précipitation dans l'article de la Cochenille.

\* On

\* Pag. 53. in 4. \* On peut faire une écarlate moins brillante que celle de la Cochenille pure, en mettant dans le bain moitié Kermès, moitié Cochenille, & ajoutant un peu de Composition.

La couleur en est plus solide que celle de la Cochenille seule, mais aussi elle n'est pas si belle. C'est cette couleur qu'on nomme *Ecarlate demi-graine*. La plupart des Teinturiers n'étant plus dans l'usage d'employer le Kermès, lui substituent la racine de Garence, qui leur coûte moins, lorsqu'ils ont des demi-écarlates à teindre.

En employant le Kermès seul avec la Crème de Tartre & la Composition, sans ajouter d'Alun, on a en un seul bain un canelle vif, au-lieu d'un rouge, par la raison ci-devant dite, que les acides réduisent les rouges en parties si ténues, que la plupart échappent à la vue. Mais si on passe ce canelle dans un bain d'Alun, on fait reparoitre une partie de ce rouge.

Avec la Crème de Tartre, la Composition & l'Alun, ce dernier mis en plus grande quantité que les deux autres, le Kermès donne une couleur de lilas.

Si à l'Alun & au Tartre on substitue le Tartre vitriolé, & qu'on ajoute la Composition, on a un gris d'agate, dans lequel à peine apperçoit-on un peu de rouge, parce que l'acide de la Composition a trop divisé le rouge de l'ingrédient colorant, & que le Tartre vitriolé ne contenant point la terre de l'Alun, n'a pu rassembler suffisamment d'atomes rouges. Mais ces gris d'agate tiennent aux épreuves, parce que le Tartre vitriolé est un

un sel dur, qui, comme le Tartre crud, ne se calcine point aux rayons du Soleil, & ne peut être dissout par l'eau de la pluie.

Le Sel de Glauber employé avec le Kermès, détruit entièrement son rouge, & donne un gris terreux qui ne tient pas aux épreuves, parce que ce sel ne résiste, ni à l'eau, qui le dissout très vite, ni aux rayons du Soleil, qui le réduisent aisément en poussière.

Le Vitriol vert & le Vitriol bleu, substitués séparément à l'Alun, mais employés avec le cristal de Tartre, détruisent \* pareillement \* <sup>Pag. 54.</sup> ou voilent la couleur rouge du Kermès par <sup>in 4.</sup> leurs parties métalliques. Dans ces deux expériences, le Kermès agit comme le feroit la Noix de galle ou le Sumach, & par conséquent il précipite le Fer du Vitriol vert, qui teint le drap en gris-brun, & le Cuivre du Vitriol bleu, qui teint le sien en olivâtre. Quand à la place du Vitriol bleu je mets une dissolution de Cuivre dans l'Eau-forte, j'ai aussi une couleur olivâtre; ainsi la précipitation du métal est suffisamment démontrée.

Le Vitriol blanc de Goslar, dont la base n'est pas encore exactement connue, étant employé avec le cristal de Tartre, change le rouge du Kermès en violet; & si à ce Vitriol blanc je substitue la teinture rougeâtre, extraite de la mine de Bismuth par le moyen de l'Eau-forte & ensuite par le Sel commun, ce qui fait l'Encre sympathique singulière sur laquelle j'ai donné un Mémoire en 1737, j'ai un violet semblable, seulement un peu plus foncé. Cette identité de couleur met sur la voye pour trouver la base du Vitriol blanc.

Car

Car comme la teinture de la mine de Bismuth, qui donne l'Encre sympathique bleue, ne fait cet effet que parce qu'elle contient la matière bleue du Smalt & une petite portion de Bismuth, il est très vraisemblable que le Vitriol blanc qui, avec le Kermès, donne un violet à peu près semblable, ne fournit cette teinte bleue au rouge du Kermès que parce qu'il contient aussi une certaine quantité de ce Smalt & de Bismuth, que l'acide sulfureux, vague dans les entrailles de la terre, a extraite de cette mine; & l'on a d'autant plus de raison de le croire, que tout le Vitriol blanc qui vient de Goslar, est tiré d'une Mine qui fournit du Plomb, de l'Arsenic, du Bismuth & plusieurs autres matières dont les récrémens, fondus ensuite avec le Sable & un Sel alkali, se vitrifient en une masse bleue qu'on nomme le *Safre*. Pour augmenter encore le vraisemblable de ces conséquences, j'ai fait un essai de teinture avec l'Alun, la crème de Tartre & le Kermès; j'ai ajouté au bain une certaine quantité de dissolution de Bismuth, & j'ai eu un violet encore plus vif que le violet donné par l'Encre sympathique.

\* Pag 55.  
in 4.

\* Toutes les fois qu'on employe avec le Kermès des acides mis en trop grande quantité, soit acide du Vitriol, du Nitre ou du Sel commun, le jus de Citron ou le Vinaigre, même l'Eau sure, on fait disparaître, comme je l'ai déjà dit, le rouge des particules colorantes, & l'on n'a que des canelles vifs, ou des canelles tirans sur l'aurore. Les sels alkalis fixes ne détruisent pas de même ce rouge, mais ils le rosent & le salissent, en sorte



forte que le drap se trouve teint d'une couleur de lilas terne.

Ce seroit trop allonger ce Mémoire que de décrire séparément les résultats des 50 expériences que j'ai faites avec cet ingrédient, différemment altéré par des sels & des dissolutions métalliques: elles ne feroient pas même d'une grande utilité pour l'art de la Teinture, puisqu'un grand nombre des couleurs qu'elles m'ont fournies, peuvent se tirer beaucoup plus aisément des ingrédients communs ou moins chers que le Kermès. Je passe à l'article de la Cochenille.

La Cochenille fine, qu'on nomme *Messe-Cochenille*, que ou *Tescalle*, est un insecte dont on fait une récolte considérable dans le Mexique. Les naturels du pais & les Espagnols, qui n'ont que de petits établissemens, le cultivent, c'est-à-dire, qu'ils ont soin de le retirer de dessus la plante qui le nourrit, avant la saison des pluies. Ils font mourir & sécher ce qu'ils ont dessein d'en vendre, & conservent soigneusement le reste, pour le faire multiplier quand la mauvaise saison est passée. Cet insecte se nourrit & se multiplie sur une espèce d'*Opuntia*, qu'on nomme *Topal*. Il peut se conserver dans un lieu sec pendant des siècles entiers sans se gâter, & j'en ai une petite quantité qu'on a envoyée d'Amsterdam avec toutes les preuves requises de 130 ans d'ancienneté; cependant cette Cochenille est aussi entière que si elle arrivoit de l'Amérique, & fait en teinture le même effet qu'une Cochenille nouvelle.

\* Pag.  
56. in 4.

La Cochenille *sylvestre* ou *campeffiane* nous vient aussi de la Vera-cruz. C'est dans les Bois du Nouveau Mexique que les Indiens vont la chercher. L'insecte s'y nourrit, y croît, \* y multiplie sur les *Opuntias* non cultivés qui y sont en abondance. Il y est exposé, dans la saison des pluies, à toute l'humidité de l'air, & il y meurt naturellement. Cette Cochenille est toujours beaucoup plus menue que la Cochenille fine ou cultivée; sa couleur est meilleure ou plus solide, mais elle n'a jamais le même éclat, & d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de profit à l'employer, puisqu'il en faut quatre parties, & quelquefois plus, pour tenir lieu d'une seule partie de Cochenille fine.

On trouve aussi quelquefois à Cadix de la Cochenille avariée: c'est de la Cochenille fine qui a été mouillée de l'eau de la mer, à l'occasion de quelque naufrage, tel que celui de la Flotte de la nouvelle Espagne au Canal de Bahama en 1734. Ces sortes d'accidens en diminuent considérablement le prix; car comme le Sel marin rose le teint de la Cochenille, celle-ci ne peut servir qu'à faire des pourpres, qui encore ne sont pas des plus beaux. Il s'est pourtant trouvé un particulier en 1735, qui avoit le secret de l'employer presque aussi avantageusement pour l'écarlate que la Cochenille la plus saine. Ce secret n'est pas difficile à découvrir, mais il en faut laisser jouir l'inventeur, & ne pas le priver de la récompense qu'il en peut espérer dans des tems où l'on en auroit besoin.

L'écarlate couleur de feu, connue autrefois sous le nom d'*Ecarlate de Hollande*, aujourd'hui  
sous

sous celui d'*Ecarlate des Gobelins*, & dont Kunkel attribue la découverte à un Chymiste nommé *Kuffer*, est la plus belle & la plus éclatante couleur de la teinture ; elle est aussi la plus chère, & l'une des des plus difficiles à porter à sa perfection. On ne peut même guère déterminer quel est ce point de perfection : car indépendamment des différens goûts qui partagent les hommes sur les couleurs, il y a aussi des goûts généraux, pour ainsi dire, qui font que dans un tems des couleurs sont plus à la mode que dans d'autres. Ce sont alors ces couleurs de mode qui sont des couleurs parfaites. Autrefois on vouloit des écarlates pleines, foncées, d'une couleur que la vue\* supportât aisément. Aujourd'hui on les veut orangées, pleines de feu ; & dont l'œil ne puisse soutenir l'éclat. Je ne déciderai point lequel de ces goûts mérite la préférence, mais je vais donner la manière de les faire d'une façon & de l'autre, & de toutes les nuances qui tiennent le milieu entre ces extrémités, ce qui dépend de la quantité de l'acide, ou de ce qu'on nomme la *Composition*.

\* Pag.  
57. in 4.

Il n'y a point de Teinturier qui n'ait une recette particulière pour faire l'écarlate, & chacun est persuadé que la sienne est la meilleure. Cependant la réussite ne dépend que du choix de la Cochenille & de l'eau qui doit servir à la teinture, & aussi de la manière de dissoudre l'Etain qui entre dans la Composition ; car ce métal, mal choisi ou dissout sans précaution, est souvent la cause du peu d'éclat d'une écarlate, faite d'ailleurs avec tous les soins possibles. Comme c'est par cette dis-

solution qu'on donne la couleur vive de feu au teint de la Cochenille, qui sans cette liqueur acide seroit naturellement de couleur cramoisie, je vais donner la manière de préparer la Composition qui m'a le mieux réussi.

Je prends 8 onces d'Esprit de Nitre, qui est toujours plus pur que l'Eau-forte commune & de bas prix, employée ordinairement par les Teinturiers. Je m'assure par les méthodes connues des Chymistes, qu'il ne contient point d'acide vitriolique. J'affoiblis cet acide nitreux en versant dessus 8 onces d'eau de rivière filtrée : j'y dissous peu-à-peu une demi-once de Sel ammoniac bien blanc, pour en faire une Eau régale, parce que, comme on le fait, l'Esprit de Nitre n'est pas le dissolvant de l'Etain. Enfin j'y ajoute 2 gros seulement de Salpêtre de la troisième cuite. On pourroit le supprimer, mais je me suis aperçu qu'il contribuoit à unir la couleur, c'est-à-dire, à la faire prendre plus également. Dans cette Eau régale affoiblie je fais dissoudre une once d'Etain d'Angleterre en larmes, que j'ai grénailé auparavant; mais je ne fais tomber ces petits grains d'Etain dans le dissolvant, que les uns après les autres, attendant que les premiers soient dissouts avant que d'en mettre de nouveaux, afin d'éviter la \* perte des vapeurs rouges qui s'éleveroient en grande quantité, & qui se dissiperoient si la dissolution du métal se faisoit trop précipitamment. Ces vapeurs sont nécessaires à conserver, & comme Kunckel l'avoit observé de son tems, elles contribuent beaucoup à la vivacité de la couleur, soit parce que c'est un acide qui s'é-

vapo-



vaporeroit en pure perte, soit qu'elles contiennent un sulfureux qui donne de l'éclat à la couleur. Cette méthode est beaucoup plus longue, à la vérité, que celle des Teinturiers, qui versent d'abord leur Eau-forte sur l'Etain grénaillé, & qui attendent qu'il se fasse une vive fermentation, & qu'il s'en élève beaucoup de vapeurs, pour l'affoiblir par l'eau commune. Quand mon Etain est ainsi dissout peu-à-peu, la Composition de l'écarlate est faite, & la liqueur est d'une belle couleur de dissolution d'Or, sans aucune boue précipitée ni sédiment noir, parce que je me fers d'un Etain pur, sans alliage, & tel qu'il coule dès la première fonte de sa mine dans les fourneaux de Cornouailles, au-lieu qu'il est rare de trouver de l'Etain à petit chapeau qui ne laisse pas de sédiment noir au fond du vaisseau. Cette dissolution de l'Etain, très transparente quand elle est nouvellement faite, s'épaissit & devient laiteuse & opaque dans les grandes chaleurs de l'Eté. La plupart des Teinturiers sont dans l'opinion qu'alors elle est tournée, & qu'elle n'est plus bonne à rien. Cependant j'ai reconnu que la mienne, malgré ce défaut, faisoit l'écarlate aussi vive que si elle fût restée limpide. De plus, dans les tems froids elle reprend sa première transparence; ce qui, à la vérité, n'arrive pas si exactement à la Composition qui n'a pas été préparée avec les précautions que j'ai indiquées. Il est nécessaire d'avertir qu'il faut tenir cette dissolution dans un grand flacon bouché d'un bouchon de cristal.

En supposant qu'on ait de la Composition

\* Pag.  
79. in 4.

déjà préparée, il faut, pour teindre un drap blanc en écarlate, le bien humecter d'abord, en le mettant dans de l'eau de rivière un peu plus que tiède pendant un bon quart d'heure, puis le retirer, l'exprimer légèrement & le garder humide, afin qu'il \* se teigne plus uniformément. Il faut aussi de l'eau de rivière la plus pure pour tirer le teint de la Cochenille: on n'y réussiroit pas de même avec de l'eau de puits, ou avec toute autre eau crue & gypseuse. Il est même assez convenable de préparer l'eau de rivière, pour peu qu'elle soit suspecte, en mettant dans la chaudière un sac de toile blanche, rempli de Son de froment, ou de quelque racine douce & mucilagineuse, comme de Guimauve, ratissée & coupée par tranches.

Il faut environ une once & demie de Cochenille fine, pulvérisée & passée par un Tamis fin, pour teindre une aune de drap blanc, humecté comme on vient de le dire, & que je suppose du poids de 2 livres ou environ lorsqu'il est sec. Cette dose de Cochenille s'emploie en deux fois, savoir, un tiers pour le bouillon qui prépare le drap, & lui donne en même tems une couleur de rose vive, & les deux autres tiers pour la rougie ou second bain qui achève de le teindre. On pourroit, à la rigueur, faire de l'écarlate en un seul bain, mais j'ai reconnu qu'elle n'en sort pas si parfaite. Pour le bouillon, on met dans une chaudière d'Etain fin 30 à 40 pintes d'eau de rivière; lorsqu'elle est un peu plus que tiède, on y ajoute 2 onces de Crème de Tartre bien pulvérisée & 4 gros de Cochenille en poudre fine, on brouille bien l'eau du bain, & aussitôt.

tôt qu'elle est prête à bouillir, on y ajoute 2 onces au moins de Composition. Elle change tout d'un coup la couleur du bain, qui, de cramoisi brun qu'il étoit, devient de couleur de sang artériel. Aussitôt que le bain a commencé à bouillir, on y plonge le drap, & on l'y tourne & retourne pendant une heure & demie, après quoi on le leve, on l'exprime, & on le lave dans l'eau froide. Dès cette première préparation, il est d'une couleur de rose très vive, & l'eau du bain, qu'il faut jeter, n'est presque plus colorée. Pour la rougie, on remet dans la chaudière d'Etain la même quantité d'eau que la première fois, une once de Cochenille pulvérisée, qu'on remue bien jusqu'à ce que le bain soit fort chaud, ensuite on y ajoute une once ou une once & demie de Composition, & ordinairement point de \* Cristal de Tartre, parce que le drap en a retenu suffisamment du premier bouillon pour assurer la teinture. Lorsque l'eau de ce second bain commence à bouillir, on y replonge le drap, & on l'y fait bouillir jusqu'à ce qu'il ait pris toute la couleur de la Cochenille, & que l'eau n'ait plus qu'une couleur de paille; ce qui va à une demi-heure ou trois quarts d'heure. On le leve alors, & on l'évente pour le refroidir subitement, afin de condenser les sels, puis on le lave à la rivière. Quelques Teinturiers ajoutent dans la rougie une demi-once d'Amidon, qu'on a bien délayé auparavant dans de l'eau chaude; mais cette matière colante s'applique quelquefois inégalement sur le drap, & empêche le teint de la Cochenille de s'y déposer uniment, ce

\* Pag.  
60. in 4.

qui le fait paroître de couleur plus vive dans des endroits que dans d'autres: ainsi on peut supprimer cet ingrédient avec avantage. Un drap teint, comme je viens de le dire, a du fond, paroît nourri de couleur, & la vue peut la supporter sans se fatiguer. Si on met plus de Composition que la dose ci-devant indiquée, on a une écarlate plus jaune ou plus couleur de feu, qui fait de la peine à regarder longtemps, qui se brunit assez vite à l'air, & qui a encore un défaut plus considérable, c'est que la Laine est tellement altérée par le trop d'acide, que le moindre effort déchire le drap.

Les demi-écarlates se font de même que les écarlates: ils ne sont pas si beaux, mais ils sont plus solides, parce qu'on y met une partie de belle Garence avec deux parties de Cochenille. Mais pour avoir le même vif que trois parties de Cochenille donneroient, si on l'employoit seule, on ajoute un peu plus que la dose ordinaire de Composition, ce qui diminue la bonté de l'étoffe, & la rend un peu rude au toucher. Par conséquent il vaudroit beaucoup mieux tolérer dans les écarlates de mode qui ont cette couleur jaune qui plait tant depuis quelques années, une petite quantité de *Terra merita*, laquelle, avec la Cochenille, donne une couleur de feu fort vif, quoique peu solide, que de permettre d'altérer le drap par une trop grande quantité d'acide.

\* Quant à la théorie de cette couleur, je crois qu'on peut la concevoir ainsi. La Cochenille infusée ou bouillie dans de l'eau pure, donne une couleur cramoisie tirant sur le  
pour-



pourpre; c'est sa couleur naturelle. Mettez de cette infusion dans un verre, & versez dessus de l'Esprit de Nitre bien pur, goutte à goutte, vous éclaircirez tellement cette couleur, qu'après avoir passé par différentes nuances, elle deviendra jaune; si vous en mettez encore, à peine vous appercevrez-vous qu'il y ait eu originairement du rouge dans la liqueur du verre: ainsi j'ai cru devoir dire que l'acide détruit ce rouge, & qu'en le dissolvant il le divise en des parties si ténues, que l'œil ne peut plus les appercevoir. Si dans l'expérience vous employez de l'acide vitriolique, les premiers changemens de la couleur vous donneront des nuances pourprées, puis des couleurs de lilas claires, enfin des couleurs de chair pâles. Ce bleuâtre qui se mêle au rouge pour faire du pourpre, peut venir d'une petite portion de Fer dont toute l'huile de Vitriol est rarement exemte.

Dans le bouillon de l'écarlate on ne met pour tout sel que de la Creme de Tartre; on n'y ajoute point d'Alun comme dans le bouillon des autres couleurs, parce qu'il roseroit la teinture. Cependant il faut une matière terreuse blanche, une chaux, qui, avec les parties rouges de la Cochenille, puisse faire une sorte de Lacque, laquelle s'enchasse dans les pores de la Laine à l'aide du Cristal de Tartre. On trouve cette chaux blanche dans la dissolution d'un Etain bien pur. Qu'on fasse l'expérience de cette teinture dans quelque petit vaisseau de terre vernissée, & lorsque la Cochenille a communiqué toute sa teinture à l'eau chaude, qu'on y verse de la Composition

goutte à goutte, & qu'on examine avec une loupe ce qui se passe à chaque instillation de goutte, on verra qu'il se forme un petit cercle blanchâtre où se fait une fermentation assés vive, & l'on appercevra la chaux d'Etain, qui se sépare d'abord blanche, se teindre presque sur le champ de la couleur vive dont le drap sera teint dans la suite de l'opération.

\* Pag. 362. in 4. Pour preuve que cette \* chaux blanche de l'Etain est nécessaire à cette couleur, c'est que si on employoit la Cochenille avec l'Esprit de Nitre seul & le Cristal de Tartre, on auroit un fort vilain cramoisi. Si l'on se servoit de la dissolution de quelque autre métal dans le même acide, comme de Fer ou de Mercure, on auroit du premier, un gris de cendre foncé, & du second une couleur de maron jaspée, sans qu'on pût appercevoir dans l'un ni dans l'autre aucun vestige du rouge de la Cochenille. Or comme après ce que je viens de dire, il est très raisonnable de supposer que la chaux blanche de l'Etain ayant été teinte par les parties colorantes de la Cochenille que l'acide du dissolvant a avivées, il s'en est formé une espèce de Lacque terreuse, dont les atomes se sont introduits dans les pores de la Laine, dilatés pendant la chaleur de l'eau bouillante: on peut croire aussi qu'ils s'y sont mastiqués avec le Cristal de Tartre alors dissout, & que ces pores s'étant contractés fort vite par le froid subit communiqué au drap en l'éventant, ces particules colorées s'y trouvent suffisamment enchassées pour être de bon teint. Si par la suite l'air leur fait perdre leur première vivacité, cette perte n'est pas toujours

jours la même en tous lieux; elle est relative aux matières hétérogènes dont l'air est empreint. On fait par expérience qu'à la campagne, & sur-tout dans les lieux élevés, un drap écarlate conserve beaucoup plus longtems son oeil vif que dans les grandes villes, où les vapeurs alkalines urineuses sont plus abondantes. De même la boue de la campagne, qui, hors des grandes routes, n'est ordinairement qu'une terre délayée par l'eau des pluies, ne tache pas l'écarlate ainsi que la boue des villes, où il y a des matières urineuses, & souvent beaucoup de Fer dissout, comme dans les boues de Paris. Or on fait que toute matière alkaline détruit l'effet d'un acide. C'est par cette raison que si l'on fait bouillir un morceau de drap écarlate avec une lessive de Cendres ou de Potasse, on rend d'abord cette couleur pourprée, & en continuant de le faire bouillir, on l'enlève entièrement, parce qu'il se fait avec le Sel alkali & le Cristal de Tartre, ainsi que jé l'ai déjà dit, un \* Tartre soluble que l'eau dissout & détache aisément de dessus le drap. Tout le mastic des parties colorantes est détruit alors, & elles rentrent dans la lessive des sels.

Je n'ajouterai ici des trente expériences que j'ai faites avec la Cochenille, que celles qui sont les plus singulières.

Le Zinc, par exemple, dissout dans l'Esprit de Nitre, en convertit le rouge en ardoise violet.

Le Sel de Saturne mis à la place du Cristal de Tartre, fait un lilas.

Le Tartre vitriolé fait par la Potasse & le

Vitriol, détruit le rouge de la Cochenille, & ne donne qu'un gris d'agate.

Le Bismuth dissout en Esprit de Nitre, puis mis dans un vaisseau de Fer blanc avec un bain de Cochenille, fait un lilas terne; le même, en vaisseau de Cuivre, donne un gris de tourterelle fort beau & fort vif.

La dissolution de Cuivre dans l'Esprit de Nitre, fait un cramoisi sale.

Celle d'Argent de coupelle, une couleur de cannelle un peu fauve.

La Cochenille & l'Arsenic donnent un cannelle un peu plus vif que le précédent.

L'Or dissout en Eau régale, donne une couleur de marron vergetée, qui fait paroître le drap comme s'il eût été fabriqué avec des Laines de différentes couleurs.

Le Mercure dissout par l'Esprit de Nitre, fait à peu-près le même effet.

Le Sublimé corrosif brule & détruit le drap.

Le Sel de Glauber, seul, détruit le rouge de la Cochenille, comme fait le Tartre vitriolé, & donne comme lui un gris agathé, mais qui n'est pas de bon teint.

Enfin, la teinture extraite de la mine de Bismuth, convertit le rouge de la Cochenille, comme celui du Kermès, en un pourpre violet presque aussi beau que si l'on eût appliqué ce rouge sur un drap précédemment teint en bleu céleste.

Chacun de ces effets singuliers demanderoit un grand nombre d'expériences pour tâcher d'en découvrir la cause; \* mais je prie qu'on

\* Pag.  
(4. in 4.)

me dispense, quant à présent, de ces détails, qui ne feroient pas s'il falloit rapporter dans ce



ce Mémoire tout ce qui a été fait à leur occasion.

On peut employer aussi le rouge de la Gomme-laque à faire des écarlates, & si elles n'ont pas tout l'éclat de l'écarlate faite avec la Cochenille seule, elles ont l'avantage d'avoir plus de solidité. La Gomme-laque la plus estimée pour les teintures, vient de Siam; c'est la plus riche en couleur: elle doit être adhérente à de petits bâtons ou branches d'arbres. Il faut la choisir la plus rouge intérieurement, & le plus tirant sur le noir à l'extérieur. Il paroît par l'examen particulier que Mr. Geoffroy en a fait, que ce ne peut être qu'une sorte de Ruche approchant en quelque façon de celles que les Abeilles & d'autres insectes ont coutume de travailler.

Quelques-uns l'emploient pulvérisée & enfermée dans un sac de toile pour teindre les étoffes; mais cette méthode est mauvaise, car il passe toujours au travers des mailles de la toile quelque portion de la Gommérésine qui se fond dans l'eau bouillante de la chaudière, & qui s'attache sur le drap où elle tient si fort, quand il est refroidi, qu'on est obligé de le gratter avec un couteau.

D'autres la réduisent en poudre, & la font bouillir dans l'eau: après qu'elle y a rendu toute sa teinture, ils laissent refroidir le bain. La partie résineuse se dépose au fond: on décante l'eau colorée, & on la fait évaporer à l'air, où pour l'ordinaire elle s'empuantit, & lorsqu'elle a pris une consistance de cotignac,

on la met dans des vaisseaux pour la conserver. Mais sous cette forme il est assez difficile de déterminer au juste la quantité qu'on en emploie. C'est ce qui m'a fait chercher le moyen d'avoir cette teinture séparée de la gomme-résine, sans être obligé de faire évaporer une si grande quantité d'eau pour l'avoir sèche & la réduire en poudre. Je supprime le détail de tous les essais que j'ai faits avec l'eau de chaux affoiblie, avec la décoction du cœur d'Agaric, avec la décoction de la racine d'Aristoloché ronde, recommandée pour cela dans un ancien *Codex* de la Faculté\* de Médecine de Paris, parce que l'eau laisse bien à la vérité une partie du teint qu'elle a tiré, sur le filtre où je la verse, mais elle passe encore trop colorée, & il faudroit l'évaporer pour avoir toute la teinture; c'est cette évaporation que je voulois éviter. Ainsi j'ai eu recours à quelque autre racine mucilagineuse qui ne donnât point de teinture à l'eau, mais dont le mucilage pût retenir les parties colorantes, & restât avec elles sur le filtre. La racine de grande Consoude est ce qui jusqu'à présent m'a le mieux réussi. Je l'emploie sèche & en poudre grossière, & j'en mets un demi-gros par pinte d'eau, que je fais bouillir un bon quart d'heure, ensuite je la passe par un linge, & je la verse très-chaude sur de la Gomme-laque pulvérisée & passée par un tamis de crin. Elle en tire sur le champ une belle teinture cramoisie. Je mets le vaisseau en digestion pendant 12 ou 15 heures, ayant soin d'agiter sept ou huit fois la Gomme qui se tient au fond. Ensuite je décante l'eau char-

\* Pag.  
65. in 4.

chargée de la couleur, dans un vaisseau assez grand pour que les trois quarts puissent rester vuides, & je le remplis d'eau froide. Je verse dessus quelques gouttes d'une forte dissolution d'Alun de Rome: le teint, devenu mucilagineux par la préparation précédente, se précipite; & si l'eau qui le surnage, paroît encore colorée, j'ajoute quelques gouttes de la dissolution d'Alun pour achever la précipitation, ce que je continue jusqu'à ce que l'eau qui surnage le précipité, soit aussi décolorée que de l'eau ordinaire. Quand le mucilage cramoisi s'est bien affaîssi au fond du vaisseau, je tire l'eau claire avec un siphon, & je verse le reste sur un filtre de papier pour achever de l'égoutter, & le faire sécher ensuite au Soleil. Si la première eau mucilagineuse n'avoit pas tiré tout le teint de la Gomme, c'est-à-dire, si cette Gomme n'étoit pas restée couleur de paille il faudroit verser dessus de la nouvelle décoction de grande Consoude toute bouillante, & répéter tout ce qui a été fait pour la première extraction de sa teinture.

De cette manière, je sépare toutes les parties colorantes que la Gomme-laque peut fournir; & comme je fais sécher \* ensuite cette teinture extraite pour la pulvériser, je fais <sup>66. in 4.</sup> ce que cette Gomme m'en a rendu, & je suis plus sûr aussi des doses que j'emploie dans la teinture des étoffes, que ne sont ceux qui se contentent d'évaporer l'eau teinte en consistance d'extrait, parce que celui qui sera resté le plus humide, sera le moins colorant. Une Gomme-laque bien choisie, détachée de ses bâtons, ne donne de teinture sèche & réduite en

\* Pag.

en poudre qu'un peu plus du cinquième & un peu moins du quart de son poids. Ainsi il n'y a pas un avantage si grand que bien des gens se l'imaginent, à l'employer à la place de la Cochenille. Mais on peut, pour rendre la couleur écarlate plus solide qu'elle ne l'est ordinairement, l'employer dans le premier bain ou bouillon, & se servir de Cochenille pour la rougie.

Si l'on veut faire de l'écarlate avec le teint de la Lacque, extrait selon ma méthode & mis en poudre, il y a une précaution à prendre pour le délayer, qui est inutile quand on se sert de la Cochenille, parce que si on le mettoit, comme elle, dans l'eau du bain prête à bouillir, il se passeroit plus de trois quarts d'heure de tems en pure perte pour le Teinturier, avant qu'il fût entièrement dissout. Ainsi, afin d'aller plus vite, je mets la dose de cette teinture sèche, que j'ai dessein d'employer, dans un grand vaisseau de Fayence ou d'Etain fin : je verse dessus un peu d'eau chaude ; & lorsqu'elle est bien humectée, j'y ajoute la quantité nécessaire de Composition pour l'écarlate, agitant le mélange avec un pilon de verre. Cette poudre, qui paroïssoit d'un pourpre sale & foncé, prend alors en se dissolvant, un rouge couleur de feu extrêmement vif. J'en verse la dissolution dans le bain, où j'ai mis fondre d'abord le Cristal de Tartre, & aussitôt que l'eau de ce bain est bouillante, j'y plonge le drap, l'y faisant tourner & retourner jusqu'à ce qu'il soit teint. Tout le reste de l'opération n'a rien de différent de celle qui donne l'écarlate par la Cochenille. Je crois  
avoir



avoir observé cependant que l'extrait de la Gomme-lacque, préparé selon ma méthode, fournit environ un neuvième de teinture plus que la \* Cochenille, au moins plus que celle dont je me suis servi pour faire cette compa-  
raison. \* Pag. 67. in 4

Si l'on substitue au Cristal de Tartre & à la Composition quelque sel alkali fixe ou de l'eau de chaux, le rouge vif de la Gomme-lacque se convertit en couleur de lie de vin.

Si à la place de ces altérans on emploie le Sel ammoniac seul, on a des couleurs de cannelé ou de marron clair, selon qu'il y a plus ou moins de ce sel.

Mais toutes ces expériences ne conduisent à rien d'utile pour la Teinture, puisqu'au-lieu d'embellir la couleur rouge de la Lacque, qui est ce que l'on doit chercher, elles la changent de telle sorte, qu'on ne tire de cette drogue de prix que des couleurs communes & ternes, qu'on tireroit à bien meilleur compte des ingrédiens les plus communs. On peut faire la même réflexion sur toutes les expériences faites avec la Cochenille, & que j'ai ci-devant rapportées. Cependant il n'est pas difficile d'appercevoir que toutes ces expériences, inutiles pour le Teinturier, ne sont pas méprisables pour le Physicien qui chercheroit la cause de ces changemens dans les couleurs matérielles; & le peu que j'en ai dit, suffit pour faire voir que cette matière est une des plus fécondes qu'on puisse traiter.

Le *Coccus Polonicus* est un petit insecte *Coccus Polonicus*  
rond, un peu moins gros qu'un grain de Co-  
rian-

riandre. On le trouve adhérent aux racines du *Polygonum cocciferum*, plante nommée *Kosmarzeck* par les Polonois, qui est la même que le *Polygonum Germanicum incanum flore majore perenni* de Rai, & que Mr. de Tournefort a nommée *Alchimilla gramineo folio majore flore*. Selon Mr. Brey, on trouve cet insecte en abondance dans le Palatinat de *Kievie*, voisin de l'Ukraine, vers les Villes de Ludnow, Piatka, Stobdyszcze, & dans d'autres lieux déserts ou sablonneux de l'Ukraine, de la Podolie, de la Volhinie, du grand Duché de Lithuanie, & même dans la Prusse du côté de Thorn. Ceux qui en font la recolte, savent que c'est immédiatement après le Solstice d'Ete que le *Coccus* est mûr & plein de son suc purpurin. Ils ont à la main une\* petite bêche creuse, faite en houlette, & qui a un manche court: d'une main ils tiennent la plante; ils la levent de terre avec l'autre main armée de cet instrument, ils en détachent ces petites bayes ou insectes ronds, & remettent la plante dans le même trou pour ne la pas détruire, ce qu'ils font avec une grande dextérité. Ayant séparé le *Coccus* de la terre par le moyen d'un crible fait exprès, ils prennent garde qu'il ne se convertisse pas en vermisseau. Pour l'en empêcher, ils l'arrosent de vinaigre, & aussi quelquefois d'eau la plus froide, puis ils le portent dans un lieu chaud, mais avec des précautions, ou l'exposent au Soleil pour le sécher lentement, parce qu'un dessèchement trop prompt leur feroit perdre leur belle couleur. Quelquefois ils séparent ces petits insectes de leurs vésicules, en les pressant doucement avec l'extrémité des doigts, alors ils

en.

en forment de petites masses rondes. Il faut faire cette expression avec beaucoup d'adresse & d'attention, autrement le suc colorant seroit résout par une trop forte compression, & la couleur pourpre se perdrait. Les Teinturiers achètent beaucoup plus cher cette teinture réduite en masse, que quand elle est encore en grains. Bernard de Bernitz, de la Dissertation duquel j'ai emprunté une partie de ce que je viens de dire, ajoute qu'autrefois les Seigneurs Polonois qui avoient des terres dans l'Ukraine, affermoient avantageusement la récolte du *Coccus* aux Juifs, & le faisoient recueillir par leurs Vassaux; que les Turcs & les Arméniens qui achetoient cette drogue des Juifs, s'en servoient à teindre la Laine, la Soye, les crins & les queues de leurs chevaux; que les femmes Turques s'en peignoient les extrémités des doigts d'une belle couleur incarnate; qu'autrefois les Hollandois achetoient aussi le *Coccus* fort cher, & qu'ils l'employoient avec moitié de Cochenille; que de la teinture de cet insecte on pouvoit avec la Craye lavée, faire une Lacque aussi belle que la Lacque de Florence, & qu'on en préparoit un beau rouge pour la toilette des Dames en France & en Espagne.

Soit que toutes ces propriétés soient exagérées, soit que \* le *Coccus* qu'on m'a envoyé de Dantzick fût éventé ou trop vieux, je n'ai jamais pu en tirer, en le traitant ou comme le Kermès, ou comme la Cochenille, que des lilas, des couleurs de chair, des cramoisis, plus ou moins vifs, & je n'ai pu parvenir à en faire de l'écarlate. D'ailleurs celui que j'ai

cm-

\* Pag.  
69. in 4.

employé, a couté presque aussi cher que la belle Cochenille, & ne fournit pas la cinquième partie de la teinture que rend cet insecte du Mexique. C'est apparemment pour cette raison que le commerce de cet ingrédient est extrêmement tombé, & qu'on ne le connoît plus que de nom dans la plupart des Villes d'Europe qui ont quelque réputation pour leurs teintures. La Cochenille a pris le dessus, & a fait abandonner toutes ces autres drogues qui lui sont inférieures.

Je ne donnerai point le détail des vingt-quatre expériences que j'ai faites, parce que j'ai suivi à peu-près les mêmes procédés qui ont été décrits dans les articles précédens, & il suffit, à ce que je crois, de faire voir à la Compagnie la Carte des Echantillons.

Il me reste, avant que de finir ce Memoire, à dire quelque chose des essais que j'ai faits pour assurer le mieux qu'il est possible, la teinture rouge que les Teinturiers du petit teint font avec les différentes espèces de bois connus sous le nom général de *bois de Brésil*, & qui, selon leur méthode ordinaire, est toujours de faux teint. Prévenu que ce défaut doit être imputé au manque de sels dont ils épargnent la dépense, se contentant de mouiller les étoffes, sans les faire bouillir avec le Tarte & l'Alun, avant que de les mettre dans la chaudière où est leur teinture de Brésil, j'ai essayé la méthode du bon teint, & je puis presque me flater d'avoir réussi; au moins un des essais de rouge que j'ai faits avec le Fernambouc, a résisté à l'air pendant trois mois du mauvais tems de l'Hiver dernier sans rien



rien perdre de sa couleur. Si un autre essai, fait de même, résiste à l'action du Soleil de l'Été prochain, ce sera sans contredit une découverte très utile pour la Teinture, & alors j'en rendrai le procédé public : \* car il y a une grande apparence que ce qui aura réussi avec un de ces bois, réussira de même avec tous les autres bois de teinture, quels qu'ils soient.

\* Pag.  
70. in 4.

Je puis encore ajouter qu'il est possible de faire avec l'Orseille des Canaries, des rouges résistans à l'air, presque aussi beaux que ceux qu'on nomme *semi-écarlates*. Ces deux articles sont réservés pour un autre Mémoire, qui servira de supplément à celui-ci.

## D U J A U N E.


J'ai peu de chose à dire sur cette couleur : les ingrédiens qui la donnent, ne sont pas rares ; presque toutes les Plantes qui ont des fleurs jaunes la fournissent, & même ordinairement de bon teint, en supposant cependant que l'étoffe ait été préparée par le bouillon d'Alun & de Tartre. Les plantes le plus en usage, & dont la couleur est regardée comme la plus solide, sont la Gaude, la Sarrette, la Généstrole, le Fenu-Grec & le bois jaune. La Gaude est de toutes, celle qui est le plus généralement employée, quand on veut un jaune vrai : la Sarrette & la Généstrole sont meilleures pour les Laines ou étoffes qu'on destine à mettre en verd, parce que leur couleur naturelle tire un peu sur le verdâtre. Le Fenu-Grec & le bois jaune donnent des nuances un peu différentes. Mais en variant la dose des sels,

sels, la quantité de l'ingrédient colorant & le tems de l'ébullition, on peut faire de chacune de ces plantes, des nuances à l'infini. J'en ai une preuve dans les essais que j'ai faits avec la fleur de *Virga aurea Canadensis*, qui deviendra utile à l'Art de la Teinture, si quelqu'un se met en devoir de la cultiver & de la multiplier: je crois même qu'il pourroit y trouver un profit considérable.

La couleur jaune se traite comme les rouges de Garence; ainsi il est inutile d'entrer dans des détails qui ne seroient que des répétitions.

\* Pag. 71. in 4. De toutes les expériences rapportées dans ce Mémoire, il résulte, & je le répète, que sans les Sels qui sont en usage \* dans l'art de la Teinture, il n'y a point de couleur ténace ni solide: qu'il faut que les pores des fibres ou filets de la Laine dont on a fabriqué les étoffes, ou dont on doit les fabriquer, soient nettoyés, aggrandis, enduits, puis resserrés, pour que l'atome colorant y soit retenu, pour ainsi dire, comme un diamant dans le chaton d'une bague; que si l'on examine par le microscope, un brin de Laine teinte & un brin de Laine non teinte, mais bien nette, on y appercevra une différence extrêmement sensible, qui ne peut guère être attribuée qu'à cette mécanique; qu'il n'y a point d'ingrédient colorant, de la classe du bon teint, qui n'ait une faculté astringente, plus ou moins grande; que cela suffit pour en conclurre assez vraisemblablement, qu'il se précipite une portion de la terre de l'Alun; que cette terre, avec les sucs colorans, forme une espèce de Lacque, peu

peu différente de celle des Peintres, mais infiniment plus fine; que les ingrédiens de faux teint peuvent devenir plus ténaces, en leur fournissant l'astriktion qui leur manque, par quelque drogue qui en ait abondamment, & qu'alors le bouillon de Tartre & d'Alun rendra leur teinture beaucoup plus solide; que dans les couleurs où l'on ne peut employer l'Alun, il lui faut substituer un autre corps qui fournisse à ce suc colorant une base aussi blanche que celle de l'Alun; que l'Etain pur donne cette base dans la teinture en écarlate; que lorsque tous ces petits atomes de Lacque terreuse colorée se sont introduits, pendant & par l'ébullition, dans les pores dilatés du sujet, l'enduit tartareux qui les tapisse, sert à y mastiquer ces atomes; & qu'enfin le resserrement des pores occasionné par le froid, achève l'opération, en les y retenant si obstinément, que rien ne peut plus les en détacher.



## \* DEMONSTRATIONS

## DE LA REGLE DE DESCARTES,

*Pour connoître le nombre des Racines positives & négatives dans les Equations qui n'ont point de Racines imaginaires.*

Par Mr. l'Abbé DE GUA (a).

**D**ESCARTES a donné sans démonstration, à la page 108 de sa Géométrie (Edit. de Paris, an. 1705), la fameuse Règle que j'entreprends de démontrer dans ce Mémoire, & qui est tout à la fois, & très utile, & très simple. On connoît de ceci, dit cet Auteur, combien il peut y avoir de Racines vrayes & combien de fausses en chaque Equation, à sçavoir, il y en peut avoir autant de vrayes que les signes  $+$  &  $-$  s'y trouvent de fois être changés, & autant de fausses qu'il s'y trouve de fois deux signes  $+$ , ou deux signes  $-$  qui s'entresuivent, &c.

Ces mots *il peut y avoir*, que Descartes répète deux fois dans cette proposition, évitant au contraire constamment l'expression *il y a*, marquent assez qu'il n'a pas regardé la Règle qu'il avoit découverte, comme absolument générale, & qu'il a vu au contraire qu'elle devoit seulement avoir lieu, lorsque les Racines que les

Equa-

(a) Juiller 1742.



Equations peuvent avoir , seroient toutes réelles.

Pour se convaincre de cette vérité de fait, qu'il n'est pas inutile de constater, ainsi qu'on le verra plus bas, il pourroit suffire de rapprocher ici deux autres propositions du même Ouvrage; dans l'une, qu'on trouve à la page 106, & qui est la première où l'Auteur ait parlé du nombre des Racines, il s'exprime ainsi: *Scachés donc qu'en chaque Equation autant que la quantité inconnue a de dimensions, autant peut-il y avoir de diverses Racines, c'est-à-dire, de valeurs de cette quantité; & dans l'autre, page 117, où il donne l'idée des quantités\* imaginaires, il s'énonce en cette sorte: Au reste* 73. *tant les vraies Racines que les fausses ne sont pas toujours réelles, mais quelquefois seulement imaginaires, c'est-à-dire, qu'en peut bien en imaginer toujours autant que j'ai dit en chaque Equation, mais qu'il n'y a quelquefois aucune quantité qui corresponde à celles qu'on imagine.*

\* Pag.  
in 4.

Ces trois passages rassemblés prouvent sans doute que Descartes a distingué le nombre des Racines qu'une Equation a en effet, c'est-à-dire, selon lui, le nombre de ses Racines réelles, du nombre des Racines qu'une Equation peut avoir en général, dans lequel se trouvent comprises aussi ses Racines imaginaires. On ne peut donc conclure de sa Règle, qu'une Equation quelconque a le nombre des Racines positives ou négatives, désigné par cette règle, qu'autant que cette Equation a réellement toutes les Racines qu'elle peut avoir en général, & eu égard à son degré, c'est-à-dire, qu'autant qu'elle n'a point de Racines imaginaires.

D'ailleurs les Racines imaginaires ne sont, à proprement parler, ni positives, ni négatives, & ainsi l'énoncé de la règle deviendroit contradictoire, si l'on vouloit que cete règle s'étendît aux Equations, qui renferment des Racines imaginaires; car dans ce cas le nombre de Racines, tant positives que négatives, qu'elle fourniroit en somme, seroit évidemment plus grand que le nombre des Racines positives ou négatives, que l'Equation auroit en effet.

Mais si ces inductions semblent l'une & l'autre assez justes, il n'étoit pas néanmoins absolument nécessaire, pour justifier Descartes, d'entrer dans un pareil détail, puisque cet Auteur s'est expliqué lui-même dans la suite sur ce point d'une manière précise. Je trouve cette explication dans la 77.<sup>me</sup> Lettre du troisième Tome. *Sa seconde objection*, dit Descartes dans cette Lettre, en parlant de Fermat, *est une fausseté manifeste; car je n'ai pas dit dans l'art. 8. du 3.<sup>me</sup> Livre ce qu'il veut que j'aye dit, à sçavoir qu'il y a autant de vraies Racines que les signes  $+$  &  $-$  se trouvent de fois changés, ni n'ai eu aucune intention de le dire: j'ai dit seulement qu'il y en peut autant avoir, & j'ai montré expressément, art. 17. du 3.<sup>me</sup> Livre* \* (c'est l'endroit que nous venons de citer sur les Racines imaginaires) *quand c'est qu'il n'y en a pas tant, à sçavoir, quand quelques-unes de ces vraies Racines sont imaginaires.* Pourra-t-on voir sans étonnement que longtems après un éclaircissement aussi formel, divers Auteurs dont nous parlerons tout-à-l'heure, aient imputé à Descartes d'avoir étendu sa règle aux Equations qui n'ont point toutes leurs Racines réelles?

Quel-

\* Pag.  
74. in 4.

Quelque nombre de Disciples & de Commentateurs qu'ait eu ce grand Géomètre dans l'espace de près d'un Siècle, il paroît néanmoins que personne n'est encore parvenu à démontrer la règle dont nous parlons. Ce fait est attesté en particulier par le célèbre Mr. Wolf, à qui l'histoire des Mathématiques est si bien connue, & par l'illustre aveugle Mr. Saunderson, de la Société Royale de Londres, & Professeur de Mathématiques à Cambridge, dont l'Ouvrage posthume ne paroît que de l'année dernière. *Tertium hoc Theorema*, dit Mr. Wolf au chap. 5. de son Analyse, art. 330, *quod Harriottus per inductionem invenit, nemo hactenus demonstrare potuit.* (Harriot est un Auteur Anglois, postérieur à Viète, & antérieur à Descartes). Pour Mr. Saunderson, il s'exprime ainsi dans ses Elémens d'Algèbre (a) : *Cette règle est attribuée communément à notre compatriote Harriot, qui a été sans contredit le premier inventeur des propriétés générales des Equations qui ont été données jusqu'ici* (il veut sans doute

(a) This rule is usually ascribed to our contryman Harriott, who was undoubtedly the first discoverer of those general properties of Equations hitherto delivered, or to be delivered. But whosoever it was that first hit upon it, this is certain that he left not demonstration of it, nor have i ever met with one in any treatise of Algebra, that has hitherto fallen into my hands, though most of them make mention of the rule. And indeed whoever considers the immense number of cases that must necessarily come under consideration in a demonstration of this nature, will not be very ready to attempt it universally. . . . On the other hand it seems much more probable that this rule was found out by experience than from any regular investigation of it. . . . Page 683. *Of the elements of Algebra by Nic. Saunderson.*

\* Pag.  
75. in 4.

doute parler de celles qu'il a données jusque-là dans son Livre, & encore cela n'est-il pas véritable, selon que je le ferai voir ailleurs), ou qui pourront l'être dans la suite. Mais quel que soit celui qui l'a imaginée le \* premier, il est certain qu'il n'en a point laissé de démonstration ; je n'en ai même jamais trouvée aucune dans les différents Traités d'Algèbre qui sont tombés jusqu'ici entre mes mains, quoique la plupart de ces Traités fassent mention de la règle. En effet, si l'on considère le nombre immense de cas auxquels il faudroit faire attention dans une démonstration de ce genre, on n'aura pas grande envie de la chercher généralement . . . . D'ailleurs il paroît plus que probable que cette règle a été trouvée plutôt par expérience ou observation, que par des recherches méthodiques.

Si nous pensons comme ces deux Professeurs au sujet du fait dont il est ici principalement question, nous ne jugeons pas de même qu'on doive attribuer à Harriot la découverte de la règle qu'on donne communément à Descartes. Au contraire, après avoir lu le Livre d'Harriot avec toute l'attention possible, nous n'y avons rien trouvé qui eût véritablement rapport à cette règle, desorte que nous nous croyons obligés à rétablir, pour ainsi dire, Descartes dans la possession qu'on voudroit injustement lui ravir.

C'est sans doute le 41.<sup>me</sup> chapitre du Traité d'Algèbre de Wallis, qui a été l'occasion de l'erreur de Mr. Wolf & de Mr. Saunderson. On fait que ce Traité est en partie historique. On n'ignore pas non plus que Wallis n'a rien oublié dans cet Ouvrage, pour arracher en quelque façon à Viète & à Descartes leurs découvertes algébriques, dont il se plaît au con-  
trai-



traire à revêtir Harriot son compatriote. C'est dans cette vue qu'il a placé au chapitre 41.<sup>me</sup>, où se trouve l'histoire d'Harriot, presque tout ce que l'Algèbre & l'Analyse contiennent de plus intéressant. Il y fait donc mention de notre règle, qu'il déduit par une espèce d'induction, des exemples d'Harriot; mais il oublie, sans doute à dessein, de remarquer que cette induction ne fut jamais apperçue de l'Auteur dont il parle. Il se sert même dans la suite, de cette expression, *de horum priore Cartesium consentientem habemus*, pour donner à entendre que Descartes n'avoit fait en cela que copier Harriot, & il le marque plus expressément peu après en ces termes: *Cum itaque Cartesius, in \* Geometria sua, à sola forsan inspectione casuum ab Harriotto enumeratorum hanc sine limitatione habet regulam.....omnino erratum est*: 76. in 4. \* Pag. outre qu'il suppose encore ici que Descartes a cru sa règle générale pour toutes sortes d'Equations, *hanc sine limitatione habet regulam*, & plus bas, *absque cautione illa perperam omissa, quam interponere debuisset*, quoique, selon que nous l'avons déjà prouvé, rien ne soit moins fondé que ce reproche.

Pour réfuter Wallis sur l'article dont il est ici principalement question, nous ne nous servirons que du témoignage de Wallis lui-même, & de Wallis parlant dans le même Ouvrage. Il conteste dans l'endroit que nous venons de citer, que la règle pour le discernement des Racines appartienne à Descartes; plus bas, au chapitre 53, page 215, il continue à la vérité de proscrire cette règle, à cause de son prétendu défaut de limitation, mais

commençant alors à se contredire, il ne fait plus difficulté de la donner à son véritable Auteur: *Cum autem*, dit-il en parlant de la règle de Descartes pour résoudre les Equations du 4.<sup>me</sup> degré, *hoc unicum esse dico quod in Harriotto non habetur, vel expressis verbis, vel ipso oculo conspicuum, hanc excipio regulam quam habet Cartesius pro estimando numero radicum . . . . . Cartesianum utique hoc est, sed falsum est, habetque Harriottus regulas certiores*; dernière assertion qui certainement est encore peu exacte, ainsi que j'aurai occasion de le prouver dans un autre Ouvrage.

Wallis au reste n'est pas le seul qui ait attaqué la règle que nous nous proposons de démontrer. Le Journal des Savans de l'année 1684, nous apprend à la page 250, que Rolle la taxoit aussi de fausseté: *Il seroit à souhaiter, lisons-nous dans ce Journal, que cette règle, qui est en effet très commode, fût aussi certaine que quantité d'autres que cet Auteur a données; mais Mr. Rolle, ayant eu occasion de l'examiner, a observé qu'elle n'est pas générale, & ayant communiqué ses observations à Messieurs de l'Académie Royale des Sciences, ces Messieurs sont demeurés d'accord qu'il y a plusieurs cas où elle ne se trouve pas véritable*. Le Journaliste donne ensuite \* deux exemples de ce genre; mais comme dans ces exemples il se trouve des Racines imaginaires, on voit que la difficulté de Rolle étoit la même que celle de Wallis, & qu'elle naissoit du malentendu dont nous avons fait mention au commencement de ce Mémoire.

C'est ce que remarqua fort bien le P. Prestet de l'Oratoire, dans la 2.<sup>de</sup> Edit. de ses Elém.

Liv. 8, p. 362. Cet Auteur avoit précédemment jugé suffisante une espèce de preuve par induction qu'il avoit donnée de la règle en question; mais ayant depuis reconnu son erreur, il crut devoir en convenir publiquement: il faisit donc cette occasion pour répondre à Wallis & à Rolle, & il le fit en donnant à la règle le sens que nous lui avons donné. C'est en effet le même que Schooten avoit déjà anciennement fixé en ces termes: *Notandum hæc concernere Equationes quæ producuntur ex suis Radicibus in se invicem ductis, &c.* (Voyez la Géométrie de Descartes, Edit. de 1659, p. 285). C'est semblablement celui que les autres Commentateurs, & en particulier le P. Rabuel Jésuite, ont constamment suivi depuis; enfin, ce qui devoit sur-tout avoir fait cesser depuis longtems toutes disputes sur ce sujet, c'est celui que Descartes avoit déterminé lui-même dans le passage de ses Lettres que nous avons cité plus haut.

La remarque de Rolle insérée dans le Journal des Savans & la réponse du P. Prestet ne pouvoient manquer de réveiller l'attention de l'Académie. Elle vit avec surprise que le premier de ces deux Auteurs lui attribuoit ses propres pensées, & elle crut devoir le désavouer. Duhamel, qui en étoit alors Secrétaire, fit donc mention dans son Histoire, de l'Observation de Rolle, que ce Géomètre avoit, dit-il, communiquée à la Compagnie avant que d'en être Membre, & il ajouta que l'Académie ayant chargé Cassini & de la Hire d'examiner sa critique, ils avoient rapporté que Schooten avoit déjà fait la même remarque, mais que

cet Auteur prétendoit que Descartes même n'avoit pas donné sa règle pour générale.

~ Pag. 78.  
in 4.

\* Depuis ce tems l'illustre Mr. Halley est le seul Auteur de ma connoissance qui ait continué de prendre la règle de Descartes dans un sens différent de celui qu'on doit lui donner. Au reste, quoique ce savant Anglois ne se soit point assez garanti de l'erreur où l'entraînoit l'autorité de ceux qui l'avoient précédé, on ne peut pourtant pas le soupçonner, ainsi que Wallis son compatriote, d'avoir embrassé cette opinion par un motif peu juste; il avoit donné dans les Transactions Philosophiques du mois de Mai 1694 à Viète, Auteur François, tous les éloges qu'il mérite, & dans l'Ouvrage dont il est question maintenant, & qui se trouve à la fin de l'Arithmétique universelle, Edit. de 1732, sous ce titre, *de numero Radicum*, il reprend Descartes, mais comme il est permis de reprendre un Grand-homme, il lui applique, ainsi qu'à Harriot, qu'il reprend aussi, & avec plus de raison, ce vers d'Horace, *Quandoque bonus dormitat Homerus*, & il conclut en ces termes, *Fallit itaque regula Cartesii ubi tot veras dari Radices..... pronuntiat, frustra etiam in commentariis suis palma hoc excusante Schootenio*. Sans doute que la décision de l'Académie n'étoit point encore parvenue à la connoissance de Mr. Halley, lorsqu'il composoit le Mémoire dont ces paroles sont extraites.

Mais si cette décision a dû en effet fixer le sens véritable de la règle de Descartes, n'auroit-elle pas du en même tems exciter de plus en plus les Géomètres à chercher une démonstration rigoureuse de cette règle, au-lieu de se  
con-



contenter de la déduire par induction, comme on doit présumer que Descartes l'avoit fait; ou de l'inspection seule des Equations numériques, ou de la formation des Equations Algébriques par la multiplication de leurs Racines supposées connues? Un silence si constant sur une vérité qu'on pouvoit désormais regarder presque comme un principe, & dont cependant on n'appercevoit point encore l'évidence, n'étoit-il point en quelque sorte peu honorable pour les Mathématiques? Ce sont-là les considérations qui ont sur-tout contribué à m'animer dans ma recherche, & je leur dois principalement les \* deux Démonstrations différentes que ce Mémoire renferme.

\* Pag.  
79. in-4.

La première de ces Démonstrations sera plus longue, mais plus directe que l'autre; j'ai cru ne la devoir point omettre, parce qu'elle contient des divisions & des subdivisions de cas poussées plus loin qu'elles ne le sont communément dans les Démonstrations d'Algebre. Quant à la seconde, elle a sur-tout l'avantage de dépendre en partie d'une application assez singulière de la Géométrie à l'Algebre. Cette application, que je regarde comme un principe fort fécond, me servira en particulier dans un autre Mémoire, où je lui donnerai plus d'étendue, à découvrir des règles générales pour connoître le nombre des Racines réelles ou imaginaires, positives ou négatives, dans une Equation quelconque, en supposant néanmoins, si la proposée est d'un degré au-dessus du quatrième, & qu'elle ne doive avoir ni toutes ses Racines réelles,

ni toutes ses Racines imaginaires, qu'on sache  
ou résoudre ou construire les Equations de  
degrés inférieurs.



## PREMIERE DEMONSTRATION DE LA REGLE DE DESCARTES.

### L E M M E.

(a) Une Equation quelconque n'ayant que des  
Racines réelles, si l'on prend dans cette Equation  
trois termes consécutifs, dont le premier & le  
dernier aient le même signe, & dont les coeffi-  
ciens soient respectivement F, G & H, leurs ex-  
posans étant tels qu'on voudra, le quarré du co-  
efficient intermédiaire, G sera nécessairement plus  
grand que le rectangle FH des deux coefficients  
extrêmes.

### D E M O N S T R A T I O N.

Soit l'Equation proposée celle qu'on voit à  
la Figure première; qu'on écrive de suite au  
dessous d'elle toutes les progressions Arithmé-  
tiques ascendantes qu'on apperçoit dans cette  
Figure, de façon que la première de ces pro-  
gressions ayant commencé au 1.<sup>er</sup> terme de la  
proposée, la seconde au 2.<sup>d</sup>, la troisième au  
3.<sup>me</sup>,

(a) Fig. 1.

3.<sup>me</sup>, & ainsi de suite, on parvienne \* enfin \* Pag. à une où l'unité se trouve précisément placée 30. in 4. sous  $F$ , le premier des trois coefficients donnés; & qu'on écrive de même au-dessus de la proposée, mais dans un ordre contraire, c'est-à-dire, en allant de droite à gauche, toutes les autres progressions arithmétiques qu'on voit encore dans la Figure, jusqu'à ce que l'unité s'étant éloignée continuellement & de plus en plus du dernier terme de la proposée, elle se trouve enfin précisément au-dessus de  $H$ , le dernier des trois coefficients donnés.

Cela étant fait, si l'on multiplie chaque terme de la proposée par chacun de tous ceux qui lui correspondent dans toutes les progressions, tant supérieures qu'inférieures, on appercevra sans peine:

1. Que le produit qui viendra de cette multiplication n'aura que trois termes, lesquels seront correspondans aux trois termes de la proposée, qui auront eu  $F, G, H$ , pour coefficients; car tous les autres termes de ce produit, s'il pouvoit en avoir d'autres, auroient zéro pour un de leurs facteurs, & ainsi ils doivent nécessairement s'évanouir.

2. Que si de ce produit on forme une Equation nouvelle, le premier terme de cette nouvelle Equation aura pour coefficient  $F$  multiplié successivement par tous les facteurs compris dans ces deux progressions  $(1, 2, 3, \dots \&c. m)$ ,  $(3, \dots \&c. n - m - 2, n - m - 1, n - m)$ , c'est-à-dire, par tous ceux qui sont placés dans la ligne verticale où se trouve  $F$ .

De même le coefficient du second terme de cette Equation sera composé de  $G$ , & de tous

les facteurs compris dans ces deux progressions  $(2, 3, \dots \&c. m, m+1), (2, 3, \dots \&c. n-m-2, n-m-1)$ , lesquels se trouvent dans la même verticale que  $G$ .

Et enfin le coefficient de son dernier terme se formera de  $H$ , & de tous les facteurs placés directement ou au-dessus, ou au-dessous de  $H$ , c'est-à-dire, de tous ceux que comprennent ces deux progressions  $(3, \dots \&c. m, m+1, m+2), (1, 2, 3, \dots \&c. n-m-2)$ .

\* Pag. 81. in 4. \* La nouvelle Equation prendra donc nécessairement cette forme

$$\begin{aligned} & (1, 2, 3, \dots \&c. m). \overline{(3, \dots \&c. n-m-2. n-m-1. n-m)} \\ & \quad F x^{n-m} \\ & + (2, 3, \dots \&c. m. m+1). \overline{(2, 3, \dots \&c. n-m-2. n-m-1)} \\ & \quad G x^{n-m-1} \\ & + (3, \dots \&c. m. m+1. m+2). \overline{(1, 2, 3, \dots \&c. n-m-2)} \\ & \quad H x^{n-m-2} = 0. \end{aligned}$$

Mais comme les facteurs  $3, 4, 5, \dots \&c. m$  sont communs à toutes les progressions inférieures, & que de même les facteurs  $3, 4, 5, \dots \&c. n-m-2$  sont communs à toutes les progressions supérieures, on pourra par conséquent diviser à la fois les trois termes de cette Equation par tous les facteurs compris dans ces deux progressions  $(3, 4, 5, \dots \&c. m), (3, 4, 5, \dots$

$\&c. n-m-2)$ , aussi bien que par  $x^{n-m-2}$ , ce qui la réduira à cette forme  $1, 2, n-m-1, n-m$ .

$$F x^2 + 2. m+1. 2. n-m-1. G x + m-1. m+2. I. 2. H = 0.$$

Et la divisant encore par le nombre 2, commun à tous les termes, & ôtant de son expression le facteur inutile 1, on parviendra à

cette



cette dernière forme  $\frac{n-m-1}{m+1} \cdot \frac{n-m}{m+2} Fx^2 + 2 \cdot \frac{n-m-1}{m+1} \cdot \frac{n-m}{m+2} Gx + \frac{n-m-1}{m+1} \cdot \frac{n-m}{m+2} H = 0$ .

Or l'Equation proposée n'ayant que des Racines réelles, celle-ci qui n'est que du second degré, ne pourra manquer d'avoir aussi ses deux Racines réelles; car il est démontré dans plusieurs Ouvrages, & en particulier dans l'Analyse démontrée du P. Reyneau, que si une Equation quelconque n'a que des Racines réelles, & qu'on la multiplie terme à terme, & successivement par les termes correspondans de différentes progressions arithmétiques descendantes jusqu'à zéro, ou ascendantes depuis zéro, de façon qu'à chaque multiplication elle perde successivement & par ordre un de ses derniers, ou un de ses premiers termes, cette Equation ne peut acquérir par de pareilles multiplications aucune Racine imaginaire. Cette propriété suit nécessairement de ce que les Racines d'une Equation quelconque, multipliée \* terme à terme par les termes correspondans d'une progression arithmétique de l'espèce qu'on vient de décrire, sont toujours les limites ou des Racines que la proposée elle-même auroit eues avant cette multiplication, ou bien de ces mêmes dernières Racines élevées à l'exposant négatif  $-1$ ; & elle pourra aussi se déduire du troisième des Théorèmes qui doivent servir à notre seconde Démonstration de la Règle de Descartes.

On aura donc par la nature des Equations du second degré, dont les termes extrêmes ont le même signe, & dont toutes les Racines

doivent être réelles,  $\frac{1}{4} \times 4. m + 1. n - m - 1.$

$$G^2 > \frac{n - m - 1. n - m. m + 1. m + 2. FH.}{m + 1. n - m - 1.}$$

Ou  $\frac{m + 1. n - m - 1.}{m + 2. n - m} \cdot G^2 > FH.$

Mais  $m + 1$  est plus petit que  $m + 2$ , & semblablement  $n - m - 1$  est plus petit que  $n - m$ , & par conséquent  $\frac{m + 1}{m + 2} \times \frac{n - m - 1}{n - m}$  est plus petit que 1. Donc à fortiori  $1 \times G^2$ , ou  $G^2$  est plus grand que  $FH. \dots C.Q.F.D.$

# SCHOLIE.

La Démonstration que nous venons de donner de ce Lemme, a beaucoup de rapport à d'autres que deux illustres Géomètres Anglois, M<sup>rs</sup>. Mac-Laurin & Campbell ont employées dans des Ouvrages qu'on trouve, & dans les Transactions Philosophiques, & à la fin de la dernière édition de l'Arithmétique universelle de Newton: comme néanmoins ces deux Auteurs ne s'étoient pas proposés précisément de tirer de leurs principes la même vérité que nous venons de démontrer dans ce Lemme, & dont nous aurons immédiatement besoin dans la suite, il n'auroit pu par cette raison nous suffire de les citer, & c'est ce qui a fait que nous avons cru devoir nous étendre de nouveau sur ce sujet, quoique semblable à celui qu'ils avoient déjà traité. Nous avons au reste tâché d'y répandre plus de jour qu'ils n'avoient fait.

## \* COROLLAIRE.

\* Page  
83. in 4.

Les mêmes choses que ci-dessus ayant toujours lieu,  $p$  étant de plus une quantité quelconque, & n'ayant aucun égard aux signes  $+$  &  $-$ ; si l'on suppose  $pF > G$ , il s'ensuivra nécessairement que  $pG$  sera aussi  $> H$ .

Car par le Lemme  $GG > FH$ , ou  $pGG > pFH$ , ou (divisant des deux côtés par  $GH$ )  $\frac{pG}{H} > \frac{pF}{G}$ : or  $\frac{pF}{G} > 1$ , puisque par la supposition  $pF > G$ . Donc à plus forte raison  $\frac{pG}{H}$  sera  $> 1$ , c'est-à-dire, que  $pG$  sera  $> H$ .  
C. Q. F. D.

## D E F I N I T I O N S.

Nous appellerons dans la suite, du nom générique de *Combinaison de signe*, l'assemblage de deux termes consécutifs quelconques d'une Equation proposée, soit qu'ils soient joints par le même signe dont est précédé le premier d'entre eux, soit qu'ils le soient par le signe contraire.

Le terme de la Combinaison qui y sera situé vers la gauche, en sera nommé l'*Antécédent*, & on nommera l'autre le *Conséquent*.

Si l'Antécédent & le Conséquent ont le même signe, la Combinaison s'appellera *Permanence*, & si les signes de l'Antécédent & du Conséquent sont différens, on nommera la Combinaison *Variation*. Que si l'un des termes

mes de la Combinaison manquoit , alors on pourroit supposer à ce terme manquant un Coefficient infiniment petit , positif, ou négatif, & regarder en conséquence indifféremment la Combinaison comme Variation ou comme Permanence.

T H E O R E M E I.

(a) Si l'on multiplie une Equation quelconque, dont toutes les Racines soient réelles, par un binome quelconque  $x + p$ , dont le second terme soit positif, ainsi que le premier, il y aura précisément autant de variations de signe dans le produit, qu'il y en aura eu dans la proposée.

\* D E M O N S T R A T I O N.

\* Pag.  
84. in 4.

Soit l'Equation proposée celle qu'on voit à la Figure seconde, & on observera d'abord que chaque terme du produit aura été formé par la combinaison de la proposée au-dessous du conséquent de laquelle il se trouvera; de plus, que pour le former il aura fallu multiplier l'antécédent de cette combinaison par  $p$ , & son conséquent par  $x$ , de façon qu'un terme quelconque du produit, lequel proviendra d'une des permanences de la proposée, ne pourra manquer d'avoir le même signe que les deux termes de cette permanence; & par conséquent tant que les permanences auront lieu dans la proposée, en allant de gauche à droite, c'est-à-dire, tant que tous les termes de la proposée continueront d'avoir le même signe  $+$ , autant de tems aussi les permanen-

ces

(a) Fig. 2.



ces auront-elles lieu dans le produit, & il ne paroîtra jusqu'alors aucune diversité entre le produit & la proposée, eu égard au nombre des variations ou des permanences.

Soit donc  $F^{x^n-m} - G^{x^n-m-1}$  la première variation de la proposée, comptant toujours ses termes de gauche à droite, & il pourra naître trois cas; le premier, que  $pF$  soit  $= G$ , le second que  $pF$  soit  $< G$ , & le troisième que  $pF$  soit  $> G$ .

Or il est d'abord facile d'appercevoir que le premier de ces trois cas doit être regardé comme compris dans les deux autres, c'est-à-dire, que l'égalité parfaite de  $pF$  avec  $G$  doit ici être considérée comme une inégalité d'un excès ou d'un défaut infiniment petit.

En effet l'égalité parfaite de  $pF$  & de  $G$  devroit évidemment faire manquer un des termes du produit: elle introduiroit donc nécessairement dans ce produit deux combinaisons qui ne pourroient être nommées variations ou permanences qu'autant qu'à la place de zéro, coefficient du terme manquant, on substituerait un infiniment petit négatif ou positif, regardant l'égalité comme imparfaite.

Mais il s'agit ici de comparer le nombre des variations\* du produit avec le nombre des variations de la proposée, & ainsi toute combinaison, soit du produit, soit de la proposée, doit y être considérée ou comme variation ou comme permanence. Il est donc nécessaire que nous regardions en effet l'égalité comme imparfaite, & ce ne sera qu'après avoir prouvé qu'il doit y avoir autant de variations dans le produit que dans la proposée,

$pF$

\* Pag. 85. in 40

$pF$  étant ou  $\triangleleft G$ , ou  $\triangleright G$ , que nous pourrions conclurre que la même chose devra encore arriver, si l'on suppose  $pF = G$ .

Dans le second cas où  $pF$  est supposé  $\triangleleft G$ , le terme du produit situé précisément au-dessous de  $G_{x^n-m-1}$ , sera nécessairement de même signe que  $G_{x^n-m-1}$ . Donc, puisque  $G_{x^n-m-1}$  a le signe  $-$ , il se trouvera dans le produit une variation précisément au-dessous de celle qu'on aura supposée dans la proposée, & ainsi il n'y aura encore aucune diversité entre le produit & la proposée, eu égard au nombre des variations.

Mais si  $pF$  est  $\triangleright G$ , ce qui fait le troisième & le dernier des cas que nous avons distingués ci-dessus, alors la variation  $F_{x^n-m} - G_{x^n-m-1}$  de la proposée sera suivie ou d'une permanence  $- G_{x^n-m-1} - H_{x^n-m-2}$ , ou d'une nouvelle variation  $- G_{x^n-m-1} + H_{x^n-m-2}$ .

Si elle l'est d'une permanence, le terme du produit qui proviendra de la variation  $F_{x^n-m} - G_{x^n-m-1}$  aura à la vérité le signe  $+$ , mais celui qui proviendra de la permanence  $- G_{x^n-m-1} - H_{x^n-m-2}$  aura le signe  $-$ , & ainsi une des combinaisons de la proposée s'étant changée dans le produit de variation en permanence, la combinaison suivante de la proposée se changera à son tour de permanence en variation, de façon qu'il restera encore jusqu'à présent un même nombre de variations dans le produit & dans la proposée.

Mais si la première variation de la proposée  $F_{x^n-m} - G_{x^n-m-1}$  est immédiatement suivie d'une autre variation  $- G_{x^n-m-1} + H_{x^n-m-2}$ ,

$H_{x^n-m-2}$ , alors le terme que cette seconde variation introduira dans le produit, ne pourra \* manquer d'avoir le signe — ; car dans ce dernier cas les termes  $F_{x^n-m}$ ,  $H_{x^n-m-2}$ , extrêmes entre les trois  $F_{x^n-m}$ ,  $G_{x^n-m-1}$ ,  $H_{x^n-m-2}$  ayant le même signe, &  $pF$  étant par hypothèse  $> G$ ,  $pG$  sera à plus forte raison  $> H$ , selon le Corollaire du Lemme que nous avons démontré ci-dessus ; & par conséquent des deux variations consécutives qu'on aura supposées dans la proposée il n'y aura que la première qui dans le produit puisse se changer en permanence ; & par un raisonnement semblable, quelque nombre de variations consécutives qu'on puisse supposer dans la proposée, on prouvera qu'après la multiplication il n'y en aura jamais eu qu'une d'elles qui dans le produit ait pu se changer en permanence.

\* Pag.  
86. in 4.

Or, ou bien ces variations consécutives de la proposée aboutiront enfin à une permanence, & cette permanence devant par les raisons rapportées ci-dessus, se changer dans le produit en variation, elle rétablira encore l'égalité entre les nombres des variations du produit & de la proposée, de façon qu'on pourra appliquer de nouveau sur une autre suite de combinaisons de la proposée les mêmes raisonnemens que nous avons déjà faits sur la première, & ainsi de suite en suite.

Ou bien les variations, soit de la première suite, soit de toute autre, continueront dans la proposée jusqu'à son dernier terme, & par conséquent le pénultième terme du produit, c'est-à-dire, celui qui sera précisément au

des-

deffous du dernier terme de la proposée, aura nécessairement un signe différent de celui du dernier terme de la proposée, selon qu'on peut le conclurre de ce qui a été dit ci-dessus. Mais le produit finit au dernier terme de la proposée, multiplié par  $p$ , & ainsi les derniers termes du produit & de la proposée ne peuvent manquer d'être de même signe; il naîtra donc delà dans le produit une variation à laquelle il n'en répondra point dans la proposée, & qui rétablira encore dans ce dernier cas l'égalité parfaite entre les nombres des variations du produit & de la proposée. C. Q. F. D.

\* Pag.  
87. in 4.

### \* COROLLAIRE.

Le nombre de permanences que pourra avoir le produit dont il a été question dans le Théorème précédent surpassera toujours d'une unité le nombre de permanences de la proposée; car 1. le nombre des termes du produit doit surpasser d'une unité le nombre des termes de la proposée, & par conséquent le nombre des combinaisons du produit doit surpasser aussi d'une unité le nombre des combinaisons de la proposée. 2. Toute combinaison est nécessairement ou variation, ou permanence. 3. Enfin il y a précisément, selon le Théorème que nous venons de démontrer, autant de variations dans le produit que dans la proposée. Donc, &c.

### T H E O R E M E II.

*Si l'on multiplie une Equation quelconque, dont*  
*tou-*



toutes les Racines soient réelles, par un binôme quelconque  $x - p$ , dont le second terme soit négatif, le premier étant au contraire positif, il se trouvera autant de permanences dans le produit que dans la proposée.

## D E M O N S T R A T I O N .

Elle seroit semblable à celle du Théorème précédent, à l'exception qu'il faudroit dire ici des permanences ce qu'on a dit dans ce dernier Théorème des variations, & réciproquement.

Que s'il paroît trop long de revenir sur toutes les divisions & subdivisions des cas qu'on a été obligé de parcourir dans la démonstration précédente, en voici une d'un autre genre qui suppose la première, & dont on pourra se contenter.

Qu'on change de  $+$  en  $-$ , & de  $-$  en  $+$  les signes de tous les termes pairs, soit du produit, soit de la proposée, & par-là 1. dans chacune de ces deux Equations toutes les permanences se changeront en variations, & toutes les variations en permanences. 2. Les Racines de l'une & de l'autre deviendront de négatives positives, & de positives \* négatives, ainsi que l'enseignent les règles les plus communes de l'Algèbre. 3. Le produit, après avoir été changé, représentera celui qu'on auroit pu former en multipliant la proposée changée, non par  $x - p$ , mais par  $x + p$ ; & par conséquent, selon le Théorème premier, le nombre des variations du produit changé doit être le même que celui des variations de la

\* Pag.  
88. in 4.

la proposée changée. Mais nous venons d'observer que les nombres des variations du produit changé & de la proposée changée doivent être les mêmes que les nombres des permanences du produit non changé & de la proposée non changée. Donc, &c.

C O R O L L A I R E.

Le nombre des variations de ce dernier produit surpassera d'une unité le nombre des variations de la proposée.

T H E O R E M E III.

QUI CONTIENT LA REGLE DE DESCARTES.

*Une Equation quelconque dont toutes les Racines sont réelles, en a autant de positives qu'elle a de variations, & autant de négatives qu'elle a de permanences.*

D E M O N S T R A T I O N.

On peut conclurre facilement des Corollaires des deux Théorèmes précédens que, si l'on multiplie par  $x + p$  une Equation quelconque dont toutes les Racines soient réelles, elle acquiert par cette multiplication une nouvelle permanence, & que de même elle acquerreroit une nouvelle variation si on la multiplioit par  $x - p$ . Or une Equation de cette espèce peut être supposée formée par la multiplication d'autant de binomes dont le dernier terme soit positif, ou d'autant de perma-

nences simples qu'elle a de Racines négatives, & d'autant de binomes dont le dernier terme soit négatif, c'est-à-dire, d'autant de *variations simples* qu'elle a de Racines positives. Donc, &c.



\* SECONDE DEMONSTRATION \* \* Pag. 89. in 4.  
DE LA REGLE DE DESCARTES.

THEOREME I.

*Si tous les termes d'une Equation ont le même signe, ou que quelqu'un de ces termes ayant zéro pour coefficient, ils puissent au moins tous être supposés de même signe, il sera généralement vrai que cette Equation ne pourra avoir de Racines réelles positives, soit qu'elle puisse, ou qu'elle ne puisse pas avoir des Racines imaginaires.*

DEMONSTRATION.

Toute valeur positive qu'on pourroit donner à  $x$  laisseroit évidemment en ce cas le même signe à tous les termes de la proposée: par conséquent elle ne pourroit opérer que ces termes se détruisant les uns les autres, leur somme fût  $= 0$ . Donc il ne peut résulter aucune valeur positive réelle pour  $x$  de la supposition que la somme de tous les termes de la proposée soit  $= 0$ , c'est-à-dire que la proposée ne peut avoir de Racines réelles positives. C. Q. F. D.

THEO-

## THEOREME II.

Qu'on rétablisse dans la proposée tous les termes qui pourroient y manquer ; en leur donnant à chacun un coefficient infiniment petit , accompagné de l'un des deux signes à volonté ; de façon qu'elle se trouve avoir par-là autant de combinaisons déterminées qu'elle aura de Racines. Qu'on multiplie outre cela la proposée terme à terme par une progression arithmétique , dont l'unité soit la différence , & dans laquelle zéro se trouve sous un des termes de la variation à détruire. Je dis qu'on pourra toujours supposer qu'il se soit détruit par cette opération une des variations de la proposée à volonté.

## DEMONSTRATION.

Soit  $F x^n - G x^{n-1}$  la variation à détruire, & qu'on écrive au-dessous la partie de progression 1, 0. Cette progression portera nécessairement le terme négatif \* — 1 sous le terme de la proposée qui suivra immédiatement  $- G x^{n-1}$ , & que nous pouvons nommer  $H x^{n-2}$ . Cela posé, il pourra arriver deux cas, savoir que  $H$  soit positif ou négatif.

Dans le premier cas la proposée auroit eu deux variations consécutives, & à ces deux variations de la proposée il répondroit dans le produit une variation & une permanence, soit qu'on supposât positif le coefficient zéro de son terme manquant, correspondant à  $G$ , soit qu'on supposât ce coefficient négatif.

Dans



Dans le second cas, & si l'on suppose positif le coefficient zéro dont nous venons de parler, ce qu'on est évidemment en droit de supposer, il viendra dans le produit deux permanences, au-lieu d'une variation & d'une permanence qui se trouvoient dans la proposée; ainsi dans ces deux cas, & n'ayant égard qu'aux deux combinaisons que nous avons considérées, on peut toujours *supposer* avoir détruit par la multiplication la variation de la proposée qu'on avoit dessein de détruire.

Et quant aux autres combinaisons de la proposée que nous n'avons pas examinées, elles ne peuvent se changer dans le produit de variation en permanence, ou de permanence en variation, puisque les deux termes de chacune d'elles doivent avoir pour multiplicateurs des nombres de même signe.

Enfin il est évident qu'on auroit pu faire un raisonnement semblable, si la variation à détruire avoit été  $-F^{x^n} + G^{x^n} - 1$ , au-lieu d'être  $F^{x^n} - G^{x^n} - 1$ ; il auroit fallu en ce cas se servir, non de la partie de progression 1, 0, mais de la partie de progression 0, 1, & elle auroit porté le terme négatif  $-1$ , non sous le terme de la proposée qui auroit suivi la variation en question, mais sous celui qui l'auroit précédée.

#### C O R O L L A I R E.

Par conséquent une Equation quelconque où se trouvent un nombre  $n$  de variations, peut être multipliée par  $n$  progressions arithmétiques, telles qu'il en résulte un produit

*Mém.* 1741.

F

où

• Pag. où \* tous les termes puissent être supposés de  
91. in 4. même signe, & qui, selon le Théorème premier, ne puisse avoir de Racines réelles positives.

## THEOREME III.

Soit la proposée  $a + bx + cx^2 + ex^3 \dots +$   
 $\&c. = 0$ , si on la multiplie terme à terme par  
 les termes correspondans de la progression  $-n$ ,  
 $-n + 1$ ,  $-n + 2$ ,  $-n + 3 \dots \&c.$   $n$   
 étant un nombre entier quelconque, & que le pro-  
 duit résultant, & réduit lui-même en Equation  
 ait un nombre  $r$  de Racines réelles positives, la  
 proposée n'en pourroit avoir au plus qu'un nombre  
 $r + 1$  de pareilles.

## DEMONSTRATION.

Qu'on suppose  $y$  égal à la somme des ter-  
 mes de la proposée multipliée par  $x^{-n}$ , & il  
 est d'abord évident que  $y$  représentera l'or-  
 donnée d'une Courbe de l'espèce qui est re-  
 présentée dans la Figure troisième, c'est-à-  
 dire, telle qu'aucune de ses ordonnées ne la  
 puisse rencontrer en plus d'un point, & que  
 sa première ordonnée en soit asymptote. De  
 plus, on appercevra facilement que cette  
 Courbe ne pourra couper son axe, c'est-à-dire,  
 avoir une ordonnée  $= 0$  du côté des  $x$  posi-  
 tives, qu'aux points que pourront déterminer  
 les Racines réelles & positives de la proposée;  
 & enfin elle ne pourra avoir de *Maxima*, du  
 côté des  $x$  positives, qu'aux points détermi-  
 nés par les Racines réelles positives de l'Equa-  
 tion provenant de la multiplication terme à  
 terme

terme de la proposée par les termes correspondans de la progression arithmétique  $-n$ ,  $-n+1$ ,  $-n+2$ ... &c. mais l'inspection seule de la Figure de la Courbe en question, *Voy. Figure 3.* prouve que cette Courbe ne sauroit avoir un nombre  $r+1$  d'intersections avec son axe, du côté des  $x$  positives, qu'elle n'ait au moins un nombre  $r$  de *Maxima*, du côté des  $x$  positives. Donc la proposée ne sauroit avoir un nombre  $r+1$  de Racines positives réelles, sans que l'Equation résultante du produit n'en ait au moins un nombre  $r$  de pareilles. Donc \* celle-ci en ayant un nombre  $r$ , celle-là n'en peut avoir au plus qu'un nombre  $= r+1$ . *\* Pag. 92. in 4.*

Il est presque inutile d'avertir ici que les contingences de la Courbe avec l'axe doivent être prises pour deux intersections infiniment proches, & entre lesquelles on peut toujours concevoir un *Maximum*; que les contingences accompagnées d'inflexion doivent être prises pour trois intersections infiniment proches, entre lesquelles on doit concevoir deux *Maxima*, &c. Il suffira, pour se rendre cette vérité sensible, de jeter les yeux sur la Figure quatrième.

### SCHOLIE.

De même que nous avons prouvé dans le dernier Théorème que la proposée ne pouvoit avoir qu'une Racine positive de plus que l'Equation faite du produit de la proposée, multipliée terme à terme par une progression arithmétique quelconque; de même aussi aurions-nous pu faire voir qu'elle ne pouvoit

— 1201

F. 2

avoir

avoir qu'une Racine négative de plus que cette dernière Equation. Or il s'ensuit delà, 1. que l'Equation faite du produit peut avoir deux Racines imaginaires de plus que la proposée, & non davantage; 2. que si cette Equation a une Racine de moins que la proposée, ce qui arrive lorsque le zéro de la progression par laquelle on doit multiplier tombe sur le premier ou sur le dernier terme de la proposée, en ce cas la nouvelle Equation doit avoir précisément autant de Racines imaginaires que la proposée, ce qui comprend la Proposition dont nous avons fait usage dans le Lemme de la première Démonstration.

## C O R O L L A I R E.

En général, la proposée étant multipliée par un nombre  $s$  de progressions arithmétiques quelconques, si le dernier produit n'a qu'un nombre  $r$  de Racines positives réelles, la proposée n'en pouvoit avoir au plus que  $r+s$ .

## T H E O R E M E IV.

*La proposée ne peut avoir plus de Racines réelles positives, que de variations.*

## \* D E M O N S T R A T I O N.

Soit  $s$  le nombre des variations de la proposée, & la multipliant par un nombre  $s$  de progressions arithmétiques convenables, on parviendra, ainsi qu'on l'a prouvé dans le Corollai-



rollaire du Théorème second, à un produit qui, étant réduit en Equation, ne pourra avoir aucune Racine positive réelle. Donc, selon le Corollaire du Théorème troisième, la proposée n'en pouvoit avoir au plus qu'un nombre  $= 0 + 1$ , ou 1. C. Q. F. D.

## THEOREME V.

*La proposée ne peut avoir plus de Racines réelles négatives que de permanences.*

## DEMONSTRATION.

Qu'on change de  $+$  en  $-$ , & de  $-$  en  $+$  les signes de tous les termes pairs de la proposée, & toutes les combinaisons de la proposée se changeront par-là de permanence en variation & de variation en permanence, ainsi que nous l'avons déjà observé dans le second Théorème de la première Démonstration. De plus, quoique la proposée puisse avoir à présent des Racines imaginaires, ce que nous ne supposons point alors, il n'en sera cependant pas moins vrai que toutes ses Racines deviendront de positives négatives, & de négatives positives, puisqu'après le changement elle aura pour Racines les valeurs de  $-x$ , & non celles de  $x$ , comme auparavant. Or après le changement elle ne pourroit, suivant le dernier Théorème, avoir plus de Racines positives réelles que de variations. Donc avant le changement elle ne pouvoit avoir plus de Racines réelles négatives que de permanences. C. Q. F. D.

## THEOREME VI.

QUI CONTIENT LA REGLE DE DESCARTES.

*Si la proposée n'a que des Racines réelles, elle en aura nécessairement autant de positives qu'elle aura de variations, & autant de négatives qu'elle aura de permanences.*

\* Pag.  
94. in 4.

## \* DEMONSTRATION.

La proposée, suivant la supposition, ne peut avoir de Racines imaginaires; & ainsi elle doit avoir autant de Racines réelles, positives ou négatives, que de combinaisons. Mais par le Théorème quatrième, elle ne peut avoir en général plus de Racines positives réelles que de variations. Donc elle ne peut avoir moins de Racines réelles négatives que de permanence. De même la proposée ne pouvant en général, selon le Théorème cinquième, avoir plus de Racines réelles négatives que de permanences, on prouvera que, puisque dans la supposition présente elle n'a point de Racines imaginaires, elle ne peut avoir moins de Racines réelles positives que de variations. Donc la proposée, dans la supposition présente, ne peut avoir ni plus ni moins de Racines positives que de variations, & semblablement elle ne peut avoir ni plus ni moins de Racines négatives que de permanences. Donc elle devra avoir exactement autant de Racines positives que de variations, & autant de Racines négatives que de permanences. C. Q. F. D.

# COROLLAIRES

## DE LA REGLE DE DESCARTES.

### COROLLAIRE I.

S'il manque quelque terme dans la proposée, & que restituant successivement ce terme manquant, en lui donnant d'abord  $+ 0$ , & puis  $- 0$ , pour facteur, ces deux restitutions successives fassent naître dans la proposée des nombres différens de variations & de permanences, ce sera une marque qu'il y aura nécessairement dans la proposée des Racines imaginaires. En effet, si l'on vouloit supposer de plus dans ce cas que la proposée pût avoir toutes ses Racines réelles, cette nouvelle supposition conduiroit, au moyen de la Règle de Descartes, à deux conclusions sur le nombre des Racines, qui seroient contradictoires l'une à l'autre. Donc, &c.

### \* COROLLAIRE II.

\* Pag.  
95. in 4.

S'il manque dans une Equation quelconque plusieurs termes de suite, ou contigus, l'Equation aura au moins en ce cas deux Racines imaginaires.

La démonstration peut se déduire du Corollaire précédent.

### COROLLAIRE III.

Et si les termes manquans d'une Equation ne sont point consécutifs, mais que les deux

termes voisins d'un de ces termes manquans ayant le même signe, en ce cas l'Equation aura encore nécessairement des Racines imaginaires.

La démonstration de ce Corollaire est aussi contenue dans le Corollaire premier.

#### COROLLAIRE IV.

Et si les transformations qui sont propres à faire manquer un terme quelconque de la proposée, en augmentant sa Racine d'une quantité réelle & convenable, devoient faire manquer aussi un des termes immédiatement voisins, ou bien devoient donner le même signe aux deux termes immédiatement voisins, la proposée ne pourroit manquer encore d'avoir des Racines imaginaires. Ce Corollaire est une suite des précédens, & nous ferons voir dans l'Ouvrage que nous devons donner sur le nombre des Racines dans toute sorte d'Equations, qu'il renferme la condition essentielle pour juger si une Equation a des Racines imaginaires, c'est-à-dire, qu'il ne peut y avoir de Racines imaginaires dans une Equation quelconque, qu'autant qu'une transformation réelle, propre à faire manquer un de ses termes, peut aussi, ou faire manquer en même tems un des deux termes immédiatement voisins, ou donner un même signe à ces deux termes.

#### COROLLAIRE V.

Enfin, si l'Equation étant multipliée par un binome quelconque  $x+p$ , ou  $x-p$ , le produit





F I C

2,

3,

...

& c

...

— 2,  $n - m$

— 1,  $n - m$

—  $m$ ,  $n - m$

—  $n - m$  —  $+ G x^n$

$m$

— 1,

$m$

— 2,

$m$

...

& c

...

3

2

F I G

$F x^{n-m}$  —


—  $n - m$  —

duit résultant de cette multiplication n'a pas exactement le même nombre de variations ou de permanences que la proposée, c'est encore \* une marque, suivant les deux premiers Théorèmes de la première Démonstration, que cette Equation doit nécessairement avoir quelques Racines imaginaires. \* Pag. 96. in 4.

## S C H O L I E.

Le second, le 3.<sup>me</sup> & le 4.<sup>me</sup> Corollaires doivent naturellement faire soupçonner que, si les conditions qu'ils renferment avoient lieu plusieurs fois, & successivement dans une même Equation, elles ne désigneroient pas seulement deux Racines imaginaires, mais même autant au moins de paires de Racines imaginaires qu'elles auroient eu lieu de fois : ce qui est vrai en effet : mais comme c'est une propriété qu'il ne seroit pas facile, selon que nous pouvons en juger, de déduire des principes que nous avons établis jusqu'ici, qu'au contraire elle est la suite nécessaire de quelques propositions fort simples qui seront établies dans le Mémoire sur le nombre des Racines, que nous avons déjà promis, & que d'ailleurs elle se rapporte plus naturellement à ce second Mémoire qu'à celui-ci ; toutes ces raisons nous déterminent à différer de la démontrer, ainsi que l'inverse dont nous avons parlé à la fin du 4.<sup>me</sup> Corollaire. Quant à présent, il ne nous reste plus qu'à faire remarquer, en finissant, que la seconde des deux Démonstrations que nous avons données de la Règle de Descartes, est un peu plus conforme que

la première à l'énoncé de l'Auteur. En effet, si l'on retranchoit de cette seconde Démonstration son dernier Théorème, qui est le seul où nous aions supposé réelles toutes les Racines de la proposée, on pourroit conclure généralement des cinq autres, *qu'une Equation quelconque peut avoir autant de Racines positives que les signes  $+$  &  $-$  s'y trouvent de fois être changés, & autant de négatives qu'il s'y trouve de fois deux signes  $+$ , ou deux signes  $-$  qui s'entresuivent.* Or cette conclusion répond à l'énoncé de Descartes pris dans la plus grande précision.



## \* OBSERVATIONS

SUR LA REUNION

DES FRACTURES DES OS.

*Premier Mémoire.*

Par Mr. DU HAMEL (a).

**I**L y a longtems qu'on a reconnu que la dissection de différens genres d'Animaux étoit bien propre à jeter de grandes lumières sur l'anatomie de l'Homme. De combien, en effet, de découvertes brillantes n'est-on pas redevable à cette espèce de travail, que l'on connoît sous le nom d'*Anatomie comparée*.

Je.

(a) 22. Avril 1741.

Je n'ai pas dessein de parler ici de la simple dissection de différens genres d'Animaux; quelque exacte qu'on la suppose, elle ne pourra jamais produire que des matériaux, précieux à la vérité, mais qui attendent, pour être véritablement utiles, qu'un Anatomiste physicien sache comparer adroitement le même Viscère pris dans nombre d'Animaux de différens genres; pour en tirer des conséquences utiles; ou sur les usages de ce Viscère, ou sur sa vraie organisation, ou même sur son développement & son accroissement.

Il faut convenir que cette espèce d'anatomie a des avantages que n'a point celle qui se borne à la dissection des Cadavres humains; outre que le même Viscère se présente dans différentes espèces d'Animaux sous des formes particulières qui peuvent être très favorables à nos recherches: on fait encore que les Cadavres sont rares pour beaucoup d'Anatomistes, & quand ils en auroient un grand nombre à leur disposition, ce ne sont que des Cadavres, au lieu que l'Anatomiste peut disposer à son gré de la vie des Animaux, & en sacrifier tant qu'il voudra pour son instruction.

Quelquefois il parviendra à leur causer des maladies, & \* il les pourra disséquer pour en connoître le progrès; d'autres fois, s'il est assez heureux pour les guérir des maladies dont il aura été l'auteur, il pourra essayer de découvrir par la dissection l'effet des remèdes qu'il aura employés. \* P25.  
98. in p.

Il ne seroit pas raisonnable d'épargner dans cette occasion la vie des Animaux, elle ne peut jamais être employée plus utilement, & il



en périra toujours plus pour flater notre gout, que le Scapel des Anatomistes n'en sacrifiera à des recherches utiles, qui ont pour but la conservation de notre santé & la cure des maladies.

C'est cette route si heureusement frayée par les Malpighi, les Grew, les Leeuwenhoek, les Duverney, les Perault, que j'ai toujours essayé de suivre; & si, lorsque j'ai travaillé à l'anatomie de la Poire, j'ai été assez heureux pour présenter avec quelque ordre la disposition des organes qui s'offroient à ma vue, j'avoue que j'en suis redevable aux connoissances que j'avois de l'anatomie des Animaux; il en est tout autrement aujourd'hui, c'est l'*anatomie végétale* qui m'a éclairé sur celle des Animaux, ce sont les recherches que j'avois faites sur la réunion des Arbres rompus, qui m'ont conduit à faire une découverte également importante pour la Physique, pour l'Anatomie & pour la Chirurgie, sur la formation du Cal dans les fractures des Os.

Dans le Mémoire (a) que je lus à l'Académie en 1738, où j'examinois l'effet que la Racine de Garence produit sur les Os des animaux qui en ont usé quelque tems dans leurs alimens, j'annonçai que mes expériences m'avoient fait appercevoir quelque chose d'intéressant sur la formation du Cal osseux qui réunit les os rompus; mais j'avertis en même tems que je n'en parlerois à l'Académie que quand de nouvelles expériences m'auroient rendu plus certain de ce que je croyois avoir

ap-

(a) Ce Mémoire est imprimé dans le Vol. de 1739. p. 1.

aperçû. je les ai exécutées ces expériences, elles m'ont assuré que je ne m'étois pas trompé, & c'est ce qui m'engage à proposer une nouvelle idée que je crois bien fondée, sur la formation de cette grosseur osseuse qu'on nomme le *Cal*, & qui réunit les os fracturés.

\* On se contente de dire ordinairement que cette grosseur est formée par un épanchement du suc osseux qu'on suppose qui transsude ou de l'os même, ou des parties voisines, & on croit que ce suc osseux soude l'un à l'autre les deux bouts d'os rompus, à peu-près comme les Plombiers soudent avec de l'étain deux bouts de tuyau. D'autres ont cru qu'outre cet épanchement du suc osseux, les extrémités des fibres osseuses rompues s'allongeoient & se joignoient les unes aux autres, à peu-près comme le font les parties molles.

Je fais bien que ces explications ne satisfaisoient guère les bons Anatomistes, & que s'ils en faisoient quelquefois usage dans leurs leçons, ou dans leurs Ouvrages, ce n'étoit qu'en attendant qu'on eût découvert quelque chose de mieux; car si l'on peut trouver dans les Livres d'Anatomie quelques idées différentes de celles que je viens de rapporter, ces idées n'étant point fondées sur des expériences bien suivies, n'ont point été adoptées, elles ont été traitées de pur système, & mises au nombre de ces productions de l'Esprit humain, qui courent risque d'être à chaque instant démenties par l'expérience, & désavouées par la Nature.

J'ai évité cette route incertaine, & on ne

trouvera dans ce Mémoire qu'un enchaînement d'expériences d'où naissent des conséquences simples, qui m'ont conduit insensiblement à mieux connoître comment la Nature opère la réunion des fractures.

## PREMIERE EXPERIENCE.

Je rompis ce gros os de la jambe d'un Pigeon qu'on connoît sous le nom de l'os du *pilon*; j'en fis sur le champ la réduction, & j'y appliquai un bandage convenable à la partie & au sujet.

D'abord la jambe & la cuisse enflèrent; mais cette enflure se dissipa au bout de deux ou trois jours. Quand après ce tems on défaisoit le bandage, on ne sentoît à travers les chairs qu'une petite éminence à peu-près de la grosseur d'une fève, qui recouvroit & enveloppoit la fracture. Ce Pigeon \* mourut d'accident, ce qui me mit à portée d'examiner ce que la Nature avoit déjà opéré pour la réunion de l'os de cet animal.

Quand j'eus enlevé tous les muscles, je trouvai l'os dans l'état naturel, excepté que le lieu de la fracture étoit recouvert par une tumeur molle qui étoit de la grosseur d'une fève blanche, & qui diminuant de grosseur par les deux extrémités, prenoit la figure d'une olive, ou plutôt celle d'un fuseau.

Pour peu qu'on forçât l'extrémité de l'os, on s'appercevoit bien que la réunion de la fracture étoit encore bien foible; il n'auroit pas été difficile de tout déranger.

J'ouvris la tumeur que je viens de décrire, & j'apperçus l'os, qui n'avoit point changé d'état,

tat, il étoit absolument tel que je l'aurois trouvé, si je l'avois examiné immédiatement après la rupture; ce n'étoit donc que la tumeur molle dont je viens de parler; qui assujettissoit les deux bouts de cet os; mais qu'est-ce qui formoit cette tumeur, & que devoit-elle devenir dans la suite? Je me fis ces questions, & je me proposai de les éclaircir.

A l'égard de la première, j'étois déjà bien sûr que la tumeur n'avoit pas d'adhérence considérable avec les parties qui la recouvroient.

Je croyois bien avoir apperçu quelques vaisseaux & quelques fibres qui s'y inféroient, mais je savois qu'elle n'avoit point d'union intime avec les muscles voisins, elle s'en étoit détachée avec trop de facilité.

En la disséquant avec la plus grande attention, je la trouvai plus adhérente à l'os, cependant ce n'étoit que par des fibres fort déliées, avec un peu de patience je la détachai en entier, & l'os resta aussi net & aussi uni que l'os de l'autre jambe, qui étoit resté dans son état naturel; mais en suivant toujours la dissection, j'arrivai enfin à la partie mince de la tumeur, & je me trouvai n'avoir plus à détacher que le périoste, qui est, comme l'on fait, une membrane assez forte qui recouvre tous les os.

\* Tout cela me parut très singulier & fort différent des idées le plus généralement reçues en Anatomie. \* Pag. 101. in 4.

Je redoublai donc d'attention, & je parvins à diviser la tumeur en plusieurs lames qui aboutissoient toutes au périoste, lequel se divisoit aussi par couches, & je m'assurai dès lors

lors que la tumeur dont je parle, étoit véritablement une continuation du périoste qui s'étoit tuméfié dans le lieu de la fracture; il me restoit à savoir ce que devoit devenir cette tumeur, tout me paroissoit indiquer qu'elle étoit destinée à former le cal; sa situation, car elle enveloppoit l'os précisément sur le lieu de la rupture; sa nature, car elle étoit de la même consistance que le sont les os avant qu'ils soient endurcis; sa texture, car elle étoit formée de plusieurs couches comme le sont les os. Cependant, malgré toutes ces probabilités (tant il est difficile d'abandonner des idées auxquelles on est attaché depuis longtems), j'avois peine à me persuader que le périoste pût devenir osseux, & qu'on lui fût redevable de la réunion des os rompus; ainsi je me proposai de faire d'autres expériences pour essayer d'éclaircir un fait qui me paroissoit mériter de l'être avec tout le soin possible.

Je pris dans cette intention six Pigeonneaux qui avoient déjà leurs plumes; on leur cassa à chacun une jambe comme dans l'expérience précédente, on en fit de même la réduction qu'on assujettit par un petit bandage, on les marqua pour les reconnoître, & on les nourrit avec soin.

## SECONDE EXPERIENCE.

La gangrène se mit à la jambe d'un de ces Pigeonneaux, à ce que je crois, parce que le bandage étoit trop serré, car j'ai remarqué dans toutes mes expériences que rien n'étoit



si dangereux que de trop serrer l'appareil, sur-tout dans les premiers jours, qui est un tems où le membre rompu ne manque guère de se tuméfier assez considérablement, ce Pigeonneau mourut donc deux jours après l'opération.

Je disséquai sa jambe rompue, & je trouvai le périoste \* déjà fort épaissi auprès de la fracture; je parvins à le diviser en plusieurs \* Pag. 102. in 4. lames, & celle qui touchoit à l'os me parut plus ferme que la plus extérieure qui étoit enveloppée par les muscles: au reste l'os rompu étoit fort uni sur toute sa superficie, & les extrémités fracturées étoient dans le même état que si l'os eût été rompu dans l'instant.

Cette expérience, il est vrai, n'apprend rien de plus que celle que j'ai rapportée en premier lieu, cependant elle m'a fourni tout ce que j'en espérois, la confirmation de mes premières observations, puisqu'elle prouve que le périoste se tuméfie sur le lieu de la fracture, & que l'os rompu reste dans le même état qu'il étoit dans le tems qu'il avoit été rompu.

Je remarquerai seulement une fois pour toutes les expériences suivantes, où cette circonstance s'est trouvée la même, que vis-à-vis la fracture le périoste étoit teint intérieurement d'un peu de sang qui venoit des vaisseaux de la moelle, & qu'il y avoit en cet endroit un petit épanchement d'une liqueur lymphatique.

### TROISIEME EXPERIENCE.

Pour suivre les changemens qui arrivoient à la tumeur dont j'ai parlé, je fis tuer un Pigeon-

Pigeonneau deux jours après celui de la seconde expérience, ce qui faisoit quatre jours, à compter du jour de la fracture.

La tumeur étoit plus considérable que dans l'expérience précédente, tant pour son épaisseur que pour son étendue, elle me parut aussi être plus ferme; je la disséquai, & je remarquai que les deux bouts d'os rompus dans la longueur de deux lignes ou de deux lignes & demie; à compter du lieu de la fracture, étoient lisses, unis, & tels qu'ils auroient été si la rupture eût été faite dans l'instant.

Après cette petite distance l'os prenoit un peu plus de grosseur, & la surface en étoit inégale ou raboteuse.

En grattant ces inégalités avec la pointe du Scapel, je les trouvai moins dures que le reste de l'os, & elles se détachèrent par grains.

\* Pag. 103. in 4. \* La lame intérieure de la tumeur étoit cartilagineuse & plus ferme que la lame la plus extérieure, qui paroissoit membraneuse.

Enfin dans l'endroit de l'os où il y avoit des rugosités, la lame intérieure de la tumeur étoit plus adhérente à l'os que dans ceux où l'os étoit lisse, le reste étant comme dans les autres expériences, & servoit seulement à confirmer mes premières observations.

Mais voila déjà un commencement d'ossification, voila probablement une lame du périoste qui s'est attachée à l'os, & les lames intérieures étant plus fermes que les extérieures, paroissent devoir s'ossifier à leur tour: c'est la confirmation de ces faits qu'on doit attendre des expériences suivantes.

QUA--

## QUATRIEME EXPERIENCE.

Deux jours étant écoulés, c'est-à-dire, six jours après la fracture, on tua le troisieme Pigeonneau.

Quoique l'os de celui-ci se fût rompu en flûte ou de biais, tout se trouva néanmoins assez conforme aux observations précédentes, la tumeur étoit seulement plus raffermie, elle étoit un peu diminuée de grosseur, & elle se divisoit plus sensiblement par lames.

Mais une circonstance particulière à cette expérience, c'est que dans la réduction les deux bouts d'os rompus n'avoient pas été mis bien exactement l'un au bout de l'autre, de sorte qu'ils avançoient l'un sur l'autre de près de trois lignes, ce qui m'a donné occasion de remarquer,

1. Que l'épaississement du périoste étoit peu considérable entre les deux os, en comparaison de ce qu'il étoit dans toutes les parties qui touchoient aux chairs.

2. Le périoste, qui étoit déchiré, paroissoit entre les deux os par des fibres qui s'étendoient d'un des bouts fracturés à l'autre.

Enfin la tumeur n'étoit pas d'une figure régulière comme dans les expériences précédentes, mais elle s'inclinoit un peu en suivant le pli du périoste.

\* Au reste les bouts rompus étoient restés, \* Pag. comme dans les expériences précédentes, tels 104. in 4. qu'ils étoient le jour de la fracture.

## CINQUIEME EXPERIENCE.

Huit jours après, en prenant toujours la date de celui de la fracture, je fis tuer le quatrième Pigeonneau, la tumeur se trouva encore plus endurcie, & moins grosse que dans l'expérience précédente.

Je disséquai le périoste, & j'enlevai la portion de la tumeur qui étoit cartilagineuse, mais je n'apperçus plus la fracture, elle étoit recouverte par une incrustation osseuse, qui, à la vérité, n'étoit pas encore fort épaisse.

Je fendis ensuite cet os suivant sa longueur, & je trouvai le vieil os dans l'intérieur, qui se distinguoit aisément de ce qui s'étoit formé depuis la fracture, tant par sa dureté & sa densité qui étoit plus grande, que par sa couleur qui étoit plus blanche.

On voit par cette suite d'expériences que la tumeur cartilagineuse qui enveloppe la fracture, s'endurcit peu-à-peu, & on ne peut plus douter qu'elle ne produise le cal osseux, dont la formation faisoit le principal objet de mes recherches; mais ce cal est encore bien foible: continuons de suivre son progrès.

## SIXIEME EXPERIENCE.

Le cinquième Pigeonneau fut tué dix jours après celui de la fracture.

En suivant le périoste depuis une des épi-physes jusqu'à la tumeur, on voyoit sensiblement cette membrane s'implanter dans le cal, ou, pour parler plus clairement, on voyoit que les lames du périoste s'épaississoient pour  
for-

former la portion de la tumeur qui n'étoit pas encore endurcie, & plusieurs fibres de la partie intérieure du périoste qu'on avoit peine à détacher de l'os, s'implantoient dans la portion du cal, qui étoit déjà ossifiée.

\* Au reste, tout étoit comme dans l'expérience précédente, la tumeur étoit seulement <sup>\* Pag. 105. in 4.</sup> un peu moins grosse; circonstance à laquelle il est à propos de prêter attention. Les tumeurs dont je parle, augmentent de grosseur pendant quelques jours, mais elles en diminuent beaucoup, à mesure que l'ossification fait du progrès.

#### SEPTIEME EXPERIENCE.

On ne tua le sixième Pigeonneau que quinze jours après celui de la fracture, pour que le cal fût mieux formé; je m'attendois à trouver la tumeur entièrement ossifiée, comme je l'avois vue plusieurs fois après un pareil intervalle de tems, mais je fus trompé; une playe (que j'avois faite à l'aîle de ce même Pigeonneau, dans des vues particulières que je rapporterai dans une autre occasion) avoit rendu cet animal malade, & le cal n'étoit guère mieux formé que celui de l'expérience précédente, ainsi la partie extérieure de sa tumeur étoit cartilagineuse, l'intérieure étoit osseuse. Ayant fendu l'os suivant sa longueur, on voyoit clairement que les bouts fracturés n'avoient point contribué à la formation du cal, & qu'étant l'un au bout de l'autre, ils étoient seulement assujettis par une espèce de virole.



virole osseuse que formoit l'endurcissement de la partie intérieure de la tumeur.

Les expériences que je viens de rapporter, jettent certainement un grand jour sur la formation du cal osseux qui opère la réunion des fractures, elles m'ont fourni une suite d'observations qui concourent toutes à prouver qu'il est produit par l'épaississement & l'ossification du périoste.

Cette découverte remet tout dans l'ordre naturel, car il est bien moins surprenant de voir le périoste s'ossifier, qu'il ne l'est de voir des glandes, des vaisseaux sanguins & des membranes devenir de vrais os. Ces phénomènes ne sont pas rares, il n'y a point d'Anatomiste qui n'en ait observé, & qui ne sache que tous les os ont été mous dans leur principe.

Si l'on demandoit pourquoi le périoste se tuméfie sur le \* lieu de la fracture, je pour-  
 \* Pag. 106. in 4. rois faire remarquer que les parties aponévrotiques & les tendineuses sont sujettes à se tuméfier, & le prouver particulièrement par les bosses qui viennent à la tête quand on s'y est frappé, mais j'aime mieux m'en tenir au fait; on voit que le périoste se tuméfie, c'est une observation qui ne peut être affoiblie par les raisonnemens.

Néanmoins pour tirer des éclaircissements de tout ce qui me paroissoit capable d'en fournir, je me suis proposé d'examiner comment s'opéroit la cicatrice des os, en examinant le progrès de la guérison de quelques playes légères que je leur faisois à dessein.

Je pris pour cela deux Pigeonneaux, du même

même âge que ceux qui avoient servi aux expériences précédentes, un petit Chien âgé seulement de quinze jours, & un jeune Agneau. Je piquai assez profondément le gros os de la jambe de ces animaux, tantôt avec une fine aiguille, tantôt avec la pointe d'un compas qui faisoit les playes plus considérables, & d'autres fois avec un poinçon encore plus gros.

Un des Pigeonneaux fut tué trois jours après qu'on lui eut fait les petites playes dont je viens de parler. L'autre Pigeonneau ne fut tué que huit jours après le commencement de l'expérience. On laissa le petit Chien vivre quinze jours & l'Agneau un mois.

Dans l'examen que je fis de l'os du Pigeonneau qui avoit été tué le premier, je vis que le périoste s'épaississoit vis-à-vis le petit trou qu'on avoit fait à l'os, & ce trou étoit rempli par un bouchon que formoit l'épaississement du périoste. Je disséquai cette membrane, en commençant à la détacher de l'os vers un des condyles, & sans la moindre difficulté le petit bouchon sortit du trou & resta attaché au périoste, dont on voyoit clairement qu'il faisoit partie.

En disséquant le second Pigeonneau, je trouvai le petit mamelon beaucoup plus adhérent à l'os.

L'adhérence étoit si considérable dans le petit Chien, qu'il ne me fut pas possible de le détacher de l'os, je remarquai \* seulement que le périoste étoit plus attaché à l'os dans cet endroit qu'ailleurs; enfin l'union étoit si parfaite à l'os de l'Agneau, qu'on avoit beaucoup de peine à reconnoître l'endroit de la piquûre.

Ces

\* Pag.  
107. in 4.

Ces expériences lèvent, je crois, les principales difficultés qu'on avoit sur la réunion des fractures & sur la formation des cicatrices qui opèrent la guérison des playes des os; car si on avoit peine à concevoir que des fibres dures & roides, comme le sont celles des os, fussent capables de s'allonger, de s'étendre & de se souder les unes aux autres, on a lieu d'être satisfait quand on voit que ce sont les fibres molles, ductiles & expensibles du périoste qui se gonflent, qui prêtent, qui s'allongent, qui se soudent.

On ne fera point non plus en peine de savoir d'où transude le suc osseux qu'on croyoit nécessaire pour former le cal, & pour remplir les playes des os, puisqu'on voit que c'est le périoste qui, après avoir rempli les playes des os, ou s'être épaissi autour de leurs fractures, prend ensuite la consistance de cartilage, & acquiert enfin la dureté des os.

L'utilité du périoste ne sera donc plus réduite à donner de la sensibilité aux os, comme quelques Anatomistes l'ont pensé, ou à modeler les os, comme d'autres l'ont cru, ou, suivant un sentiment assez généralement reçu, à assujettir les vaisseaux qui vont s'insérer dans la substance des os. On voit par les observations que j'ai rapportées, que cette membrane qui enveloppe tous les os, est toujours prête à réparer les dommages qu'ils auroient pu souffrir.

Mais si ce que je viens de dire sur la réunion des os, est vrai, si le cal est véritablement produit par un endurcissement du périoste qui forme autour de la fracture une virole

role osseuse, on doit, lorsque les fractures sont bien réunies, plusieurs années après la formation du cal, trouver dans l'intérieur de la virole osseuse dont je viens de parler, les deux bouts de l'os rompu, séparés l'un de l'autre.

J'ai scié dans cette intention plusieurs de ces os calleux que M<sup>rs</sup>. Winslow, Morand & Hunauld conservoient dans \* leurs Cabinets, & j'ai plusieurs fois trouvé une séparation sensible entre les deux bouts d'os rompus, mais d'autres fois je n'ai pu appercevoir cette séparation. \* Pag. 103. in 4.

L'envie que j'avois d'éclaircir un fait qui ne quadroit pas avec mes expériences, m'engagea dans de nouvelles recherches. Je rompis la jambe d'un jeune Agneau, la réduction en fut faite sur le champ avec toute l'exactitude possible, & on ne le tua qu'au bout de quatre mois.

Je trouvai le cal fort petit & très uni, je le sciai en différens sens, mais il ne me fut pas possible de distinguer les extrémités du vieil os.

Cette expérience me conduisit à penser que la réunion des fractures étoit d'autant plus exacte, que les animaux étoient plus jeunes, ce qui me détermina à examiner encore avec plus d'attention que je ne l'avois fait, toutes les circonstances qui accompagnent la formation du cal, sur-tout à l'égard des animaux extrêmement jeunes, comme sont ces petits Pigeonneaux qui ne font que d'éclore. Voici quelles ont été mes observations.

1. J'ai quelquefois remarqué que l'épaissif-  
Mém. 1741. G se-



fement du périoste qui enveloppe les fractures, se prolongeoit pour remplir l'intervalle qui se trouvoit entre les bouts d'os rompus, précisément comme j'ai dit que le périoste s'allongeoit pour remplir les petites playes des os; or cette interposition est bien propre à rendre l'union de l'os plus exacte qu'elle ne le seroit, si les os n'étoient assujettis que par la virole osseuse dont j'ai parlé plus haut.

2. Il m'a paru que dans les jeunes animaux cette membrane intérieure des os, qu'on peut appeller le *périoste interne*, se gonfloit, de même que le périoste externe, qu'elle s'ossifioit comme lui, & que ces deux membranes se pouvoient unir l'une à l'autre. Or il est clair qu'en supposant ce concours du périoste interne, la réunion des fractures en sera encore plus parfaite, & je rapporterai dans la suite des expériences qui prouveront que ce concours du périoste interne n'est pas une pure supposition.

\* Pag. 109. in 4. \* 3. On fait que les os des jeunes animaux sont très tendres, on apperçoit un grand nombre de vaisseaux qui les traversent, & si ces os tendres ont longtems resté à l'air, on voit que la partie vraiment osseuse est très peu de chose en comparaison de celles qui étoient molles; ainsi on peut dire que ce ne sont pas de véritables os, mais une matière qui tient le milieu entre les os & les cartilages, & je prouverai ailleurs que ces os tendres conservent encore quelques-unes des propriétés du périoste qui leur a donné naissance, qu'ils peuvent s'étendre un peu & se souder avec le périoste qui les recouvre, lors le



le cal ne sera plus une virole osseuse, mais une masse d'os, telle que m'a paru le cal du jeune Agneau dont j'ai parlé.

Enfin dans la dissection que j'ai faite de beaucoup de fractures, j'ai vu que quelquefois les lames osseuses qui se détachent du périoste, se joignent au vieil os jusqu'au bord de la fracture, au-lieu que d'autres fois il y avoit un bout d'os auprès de la fracture, qui restoit lisse, qui n'augmentoît point de grosseur. Il me paroît probable que ces endroits sont ceux où dans le tems de la fracture le périoste s'est séparé de l'os, car j'ai des raisons de penser que cette membrane ne se rejoint point à l'os quand elle en a une fois été séparée. Mais indépendamment de cette conjecture & de toute autre, il reste toujours pour certain que la réunion sera plus parfaite toutes les fois que les lames osseuses du cal s'attacheront au vieil os jusqu'aux bords de la fracture.

Il ne faut donc pas être surpris de trouver des fractures qui sont bien plus intimement réunies les unes que les autres, puisqu'indépendamment des circonstances que je viens de rapporter, la réduction peut n'avoir pas été bien faite, l'os peut s'être rompu par éclats, le périoste peut avoir été tellement endommagé, qu'il ait besoin lui-même de se guérir, & beaucoup d'observations, entre lesquelles on doit particulièrement compter celles que Mr. Hunauld a communiquées à l'Académie au commencement de cette année, prouvent qu'il y a des Sujets où l'ossification se fait bien plus promptement que dans d'autres.

\* Pag. 110. in 4. \* J'ai dit au commencement de ce Mémoire que les expériences que j'avois faites sur la réunion des Arbres rompus, avoient beaucoup contribué à me faire prendre une juste idée de la réunion des fractures; pour faire sentir combien grande est dans cette occasion l'analogie entre les Végétaux & les Animaux, il faudroit rapporter un grand nombre d'expériences & d'observations que j'ai faites sur la réunion des playes des Arbres.

Il faudroit prouver que les fibres ligneuses ne contribuent pas plus à la réunion des playes des arbres, que les fibres osseuses à celle des os.

Il faudroit faire voir que l'écorce des arbres peut fort bien être comparée au périoste des os, & que la playe d'un arbre est remplie par un allongement de l'écorce comme les playes des os le sont par les productions du périoste.

Si le périoste forme une virole dure qui assujettit les os rompus, on peut faire voir une pareille virole ligneuse qui remédie à la rupture des arbres.

Il me seroit aisé de prouver que l'écorce s'épaissit sur l'endroit où un arbre a été rompu, comme j'ai fait voir que le périoste se tuméfie sur les fractures.

Pour peu qu'on ait quelque connoissance de l'économie végétale, on conviendra que l'écorce, de même que le périoste, commence à s'endurcir par la partie intérieure, & qu'après la parfaite réunion on voit sur les arbres rompus une éminence fort semblable à celle qui enveloppe les fractures des os.

Mais

Mais l'étendue des dissertations académiques ne me permet pas de suivre plus loin cette analogie, non plus que de rapporter les expériences qui l'établissent.

Ce n'est pas là le seul point de discussion que je me trouve obligé de renvoyer à un autre Mémoire; les recherches que j'ai faites sur la réunion des fractures, m'ont conduit à des découvertes beaucoup plus étendues, puisqu'elles roulent sur le développement & l'accroissement général des os; point d'anatomie qui est intéressant, qui a beaucoup occupé les \* Anatomistes, qui cependant n'a été encore qu'ébauché, & sur lequel je crois être en état de jeter un grand jour, sur-tout depuis que j'ai trouvé le moyen de suivre l'accroissement des os, lorsqu'ils sont recouverts par les muscles & les tégumens, presque avec autant de précision que s'ils étoient continuellement exposés à notre vue; moyen qui me met en état d'établir très positivement, non seulement tout ce qui appartient à l'accroissement des os pris en général, mais même tout ce qui regarde l'accroissement de chaque os en particulier. Ce fera-là la partie curieuse de mon travail, qui me mettra à portée de discuter ensuite plusieurs articles qui regardent les Maladies des Os, & j'espère que mes recherches pourront être de quelque utilité pour leur traitement.

\* Pag.  
III. in 4.

## EXPLICATION DES FIGURES.

1. **L**'Os du Pigeonneau de la seconde expérience.

On doit remarquer la Tumeur *A* qui est sur l'endroit où l'Os s'étoit rompu.

2. Le même Os où le Périoste tuméfié est disséqué.

On doit remarquer les extrémités *A* de l'Os rompu, qui sont dans le même état qu'elles étoient au moment de la fracture.

Le Périoste *B*, qui est disséqué.

La Bande *CC*, qui forme quelquefois une éminence qui se prolonge entre les bouts de l'Os rompu, & quelquefois une espèce de petite gouttière.

3. L'Os du Pigeonneau de la troisième expérience.

On doit remarquer,

*A*, le Périoste disséqué.

*BB*, endroits où l'Os a commencé à acquérir un peu de grosseur.

*CC*, les bords de l'Os qui sont lisses, unis, & de la même grosseur qu'ils étoient dans le tems de la fracture.

4. L'Os du Pigeonneau de la quatrième expérience, le Périoste étant disséqué, & l'Os fendu suivant sa longueur.

On doit remarquer,

*A*, le Périoste disséqué.

\* *B*, la nouvelle couche osseuse qu'on a faite un peu trop épaisse, & qu'on a marquée en brun pour la rendre plus apparente.

*C*, la rupture.

5. L'Os

5. L'Os du Pigeonneau, dont le Cal est bien formé.  
*A*, le Périoste disséqué.

*B*, le Cal.

6. Plusieurs Os de différentes Volailles, qui ont été mal réduits, & sur lesquels on voit,

*A*, les extrémités des Os rompus qui n'ont pu contribuer à la formation du Cal.

*B*, le Cal, qui par les plis qui y sont marqués, & par sa forme, paroît être produit par l'ossification du Périoste.

7. Les extrémités *C* de ces Os paroissent considérablement augmentées: ils sont creux, ce qui peut venir, ou de ce que ces Os ont été affligés de quelques maladies, ou de ce qu'ils auroient été rompus lorsque l'animal étoit fort jeune.

8. L'Os d'un Homme adulte, qui a été rompu avec éclats, & dont le Cal commençoit d'avoir acquis de la solidité quand l'Homme mourut.

Quand Mr. Morand m'eut donné cet os, je le sciai en différens sens, & je remarquai qu'il n'y avoit pas véritablement de cal, mais qu'il s'élevoit des espèces des végétations, tant du Périoste que de la membrane médullaire, & que ces végétations osseuses formoient toute la réunion qui avoit pu se former depuis la fracture.





\* Pag. 113. in 4. \* *SUR LA HAUTEUR APPARENTE  
DU TROPIQUE DU CANCER,*



*Observée en 1740 avec un Secteur de six pieds  
de rayon.*


Par Mr. CASSINI DE THURY (a).


**T**OUT ce qui a rapport à la connoissance de l'obliquité de l'Ecliptique, a toujours été regardé comme très précieux en Astronomie : c'est dans cette vue que l'on observe tous les ans avec un très grand soin les hauteurs méridiennes du Soleil dans le tems des Solstices ; que des Astronomes non contents des observations qu'ils avoient faites dans leurs climats, des méthodes qu'ils avoient employées, qui leur paroissoient difficiles & trop composées, ont entrepris des voyages dans les endroits de la Terre qu'ils jugèrent les plus propres pour parvenir à cette connoissance, & pour y pratiquer des méthodes plus simples qu'ils avoient imaginées : en effet ils ne pouvoient pas, sans avoir bien constaté cet élément, déterminer le vrai lieu du Soleil, des Planètes, & en général de tous les corps célestes, ni par conséquent contribuer à la perfection de l'Astronomie.

La plupart de leurs observations sont rapportées

(a) 17. Juin 1741.






















portées dans les Mémoires de l'Académie, les détails & leurs circonstances y sont exposées dans le plus grand jour, & il est aisé de juger par tout ce qui a été fait pour approfondir cette matière, combien elle étoit délicate & digne de l'attention des Astronomes.

Cependant lorsqu'en examinant les résultats des observations, on vient à discuter tous les élémens qui entrent nécessairement dans le calcul des réductions qu'il y faut faire, & sur la plupart desquels les Astronomes ne sont point d'accord, & à apprécier le degré de précision qu'on peut attendre \* des Instru-  
mens qui y ont été employés, il ne paroît pas, de l'aveu même des Observateurs, qu'il aient porté cette connoissance jusqu'au dernier terme de la précision qu'il est permis d'espérer.

Il ne faut que consulter les registres des observations de plusieurs Astronomes, comparer des hauteurs déterminées dans un même lieu avec différens & souvent avec les mêmes Quart-de-cercles, pour être convaincu que leurs instrumens étoient insuffisans ou plutôt trop imparfaits pour une recherche aussi délicate. Je ne parle pas seulement ici des instrumens à pinnule & autres mis en usage par les anciens Astronomes, mais même de ceux dont se sont servis les Observateurs les plus modernes. Mr. le Monnier a fait voir dans les Mémoires de l'Académie de 1738, que l'instrument de Mr. de la Hire, celui dont il s'est servi principalement pour ses observations, donnoit les hauteurs des Etoiles près du Zénith trop grandes de près d'une minute, ce qu'il a prouvé par les propres observations.



de cet Astronome. Les observations que Messieurs de l'Académie ont faites en dernier lieu à Amiens avec le Secteur de Mr. Graham, font assez voir combien l'instrument de Mr. Picard, qui passoit pour un des meilleurs de son tems, étoit éloigné de la précision qu'il en avoit osé espérer. Enfin toutes celles que nous avons faites dans l'étendue de la Méridienne, nous confirment de plus en plus l'imperfection de ces instrumens, les doutes que nous pouvons avoir sur les observations pour lesquelles ils ont été employés, enfin le besoin que nous avons de nouveaux éclaircissements.

Mais bien-loin d'être étonnés des différences que nous venons de faire remarquer, & de tâcher de les concilier par des corrections souvent trop forcées, n'en voyons-nous pas évidemment la cause dans la construction même de ces instrumens ? En effet, étoit-il possible, avant que l'on eût adapté les Micro-mètres aux Quart-de-cercles, de prendre & d'estimer les hauteurs avec la même précision que nous les observons aujourd'hui au moyen de cette addition, dont nous \* sommes redevables au Chevalier de Louville; au-lieu qu'il falloit remuer l'instrument dans le tems de l'observation; il ne s'agit plus présentement que de faire mouvoir un fil, de l'éloigner ou de l'approcher jusqu'à ce qu'il concoure exactement avec le point dont on veut déterminer la hauteur, ce qui s'exécute sans causer aucun dérangement à l'instrument. Cette considération doit bien plus avoir lieu dans les grands Secteurs, qui sont plus difficiles à manier,

\* Pag.  
115. in 4.

nier, plus sujets par conséquent à se décaler, à se déranger de leur plan, & il n'y a point de doute que ce ne soit la principale source des erreurs que l'on a trouvées dans les observations de Mr. Picard & dans celles de la Méridienne.

L'exactitude que nous avons reconnue dans les divisions de notre Secteur, sa solidité éprouvée par un transport de plus de 400 lieues, le peu de variation que nous avons remarqué dans la direction de son zénith en quatre stations différentes, enfin l'accord de toutes les observations faites, en différens tems & lieux, sembloient nous promettre une si grande précision, que nous avons jugé devoir l'employer pour vérifier un des points les plus importans en Astronomie, la hauteur apparente du Tropique du Cancer, d'où dépend principalement l'obliquité de l'Ecliptique. Je m'y suis trouvé d'autant plus engagé, que cette observation comparée à celles que nous avions faites l'année précédente à Bourges, pouvoit être employée très utilement pour déterminer la différence des parallèles entre ces deux lieux, & peut-être même avec plus de précision que par les Etoiles, qui outre les variations que l'on a remarquées dans leurs positions en différens tems de l'année, sont sujettes à d'autres irrégularités dont on ne connoît pas encore les règles, au-lieu que la hauteur solsticiale ne varie point sensiblement d'une année à l'autre.

On ne jugea point devoir attendre le jour même du Solstice pour observer la hauteur apparente du Soleil, une seule observation ne

\* Pag. 116. in 4. suffit pas, lorsqu'il s'agit d'établir un fait douteux, & il est toujours avantageux de multiplier les \* observations autant qu'il est possible, pour voir & de quelle manière elles s'accordent, & de quel degré de précision elles sont susceptibles ; d'ailleurs l'on peut calculer, sans courir aucun risque de tomber dans la moindre erreur, l'Equation qui convient à chaque hauteur prise avant & après le Solstice, pour les rapporter toutes à une même, qui est la hauteur solsticiale que l'on cherche.

On pouvoit avec notre Secteur, dont le zénith répond à  $26^{\circ} 23'$  de la division, prendre des hauteurs du Soleil, lorsque sa distance au Zénith est de  $26^{\circ} 23'$ , c'est-à-dire, quinze jours avant & après le Solstice ; mais comme le limbe de cet instrument ne comprend que  $51^{\circ} 20'$ , nous ne pouvons profiter d'un des principaux avantages de ces instrumens, qui consiste à prendre les hauteurs d'un même objet dans les deux sens, ce qui sert non seulement à avoir leurs hauteurs absolues, mais même à sous-diviser l'erreur qui pourroit être dans la division. L'on verra que nous n'avons point négligé cet avantage dans les observations de Bourges, où le Soleil, dans le tems du Solstice, est plus élevé de près de 2 degrés qu'à Paris ; on y a suppléé dans les observations de Paris, en déterminant le zénith de l'instrument par les hauteurs réciproques de différentes Etoiles, & principalement de l'Etoile  $\alpha$  de l'Ourse.

*Observations de l'Etoile  $\alpha$  de l'Ourse.*

Le 15 Juillet le fil à plomb

marquoit...  $28^{\circ} 10' 23'' 48'''$  }Le 16.....  $28 \ 10 \ 20 \ 0$  }Le 17.....  $28 \ 10 \ 21 \ 23$  }Milieu  $28^{\circ} 10' 21'' 44'''$ 

On retourna l'instrument.

Le 18 le fil à plomb

marquoit...  $24 \ 35 \ 58 \ 28$  }Le 23.....  $24 \ 35 \ 57 \ 26$  }Milieu  $24 \ 35 \ 58 \ 2$ Somme....  $52 \ 46 \ 19 \ 46$ Zénith du Secteur...  $26 \ 23 \ 9 \ 53$ Donc la distance appar. de l'Etoile  $\alpha$  au Zén. est de  $1 \ 47 \ 11 \ 51$ 

\* Le tems ne permit de commencer les observations du Soleil que le 15 du mois de Juin, & elles furent continuées jusqu'au 30 du même mois. Dans cet intervalle de tems on fit huit observations des hauteurs méridiennes du Soleil. On avoit d'abord eu une grande attention à diriger l'instrument dans le plan du Méridien, & à placer le fil à plomb sur le point de la division, le plus près de la hauteur d'un des bords du Soleil, pour que le fil du Micromètre n'eût qu'un très petit espace à parcourir; & pour ne rien négliger de ce qui peut tendre à une plus grande précision, l'on avoit déterminé l'épaisseur du fil d'argent, qui fut trouvée de  $6'' 12'''$ , & l'on y a eu égard dans chaque observation où le bord du Soleil rasoit exactement le fil du Micromètre. Je ne crois pas que l'on ait encore poussé le scrupule aussi loin, ce n'est pourtant que par ces petites attentions ou espèces de raffinemens que l'on peut espérer de faire de nouveaux progrès dans l'Astronomie.

*Observations des Hauteurs méridiennes du Soleil, réduites au tems du Solstice.*

|                                                 | 15 Juin       | 16 Juin        | 18 Juin       |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Observation du bord supér. du Soleil . . . . .  | 1° 10' 47" 0" | 1° 13' 0" 0"   | 1° 16' 2" 3"  |
| emi-diamètre du fil . . . . .                   | 3 6           | 3 6            | 3 6           |
| Observations corrigées . . . . .                | 1 10 43 54    | 1 12 56 54     | 1 15 58 57    |
| énith du Secteur . . . . .                      | 26 23 9 53    | 26 23 9 53     | 26 23 9 53    |
| ist. du bord sup. du Soleil au Zénith . . . . . | 25 12 25 59   | 25 10 12 59    | 25 7 10 56    |
| emi-diamètre du Soleil . . . . .                | 15 48 0       | 15 48 0        | 15 48 0       |
| istance du centre du Soleil au Zénith . . . . . | 25 28 13 59   | 25 26 0 59     | 25 22 58 56   |
| ist. du Soleil au Tropique . . . . .            | 6 50 0        | 4 39 0         | 1 34 0        |
| istance du Trop. du Cancer au Zénith . . . . .  | 25 21 23 59   | 25 21 21 59    | 25 21 24 56   |
|                                                 | 25 Juin       | 26 Juin        | 27 Juin       |
| Observation du bord supér. du Soleil . . . . .  | 1° 13' 52" 4" | 1° 11' 55" 10" | 1° 9' 33" 48" |
| emi-diamètre du fil . . . . .                   | 3 6           | 3 6            | 3 6           |
| Observations corrigées . . . . .                | 1 13 48 58    | 1 11 52 4      | 1 9 30 42     |
| énith du Secteur . . . . .                      | 26 23 9 53    | 26 23 9 53     | 26 23 9 53    |
| ist. du bord sup. du Soleil au Zénith . . . . . | 25 9 20 55    | 25 11 17 49    | 25 13 39 11   |
| emi-diamètre du Soleil . . . . .                | 15 48 0       | 15 48 0        | 15 48 0       |
| istance du centre du Soleil au Zénith . . . . . | 25 25 8 55    | 25 27 5 49     | 25 29 27 11   |
| ist. du Soleil au Tropique . . . . .            | 3 44 0        | 5 42 0         | 8 4 0         |
| istance du Trop. du Cancer au Zénith . . . . .  | 25 21 24 55   | 25 21 23 49    | 25 21 23 11   |

28 Juin



|                                                      | 28 Juin       | 30 Juin     |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Observation du bord supér.<br>du Soleil. . . . .     | 1° 6' 49" 39" | 1° 0' 0" 0" |
| Demi-diamètre du fil. . .                            | 3 6           | 3 6         |
| Observations corrigées. . .                          | 1 6 46 33     | 0 59 56 54  |
| Zénith du Secteur. . . .                             | 26 23 9 53    | 26 23 9 53  |
| Dist. du bord sup. du Soleil<br>au Zénith. . . . .   | 25 16 23 20   | 25 23 12 59 |
| Demi-diamètre du Soleil. .                           | 15 48 0       | 15 48 0     |
| Distance du centre du So-<br>leil au Zénith. . . . . | 25 32 11 20   | 25 39 0 59  |
| Dist. du Soleil au Tropique.                         | 10 48 0       | 17 38 0     |
| Distance du Trop. du Can-<br>cer au Zénith. . . . .  | 25 21 23 20   | 25 21 22 59 |

La plus grande différence entre les résultats de ces huit observations monte à 3 secondes, ce qui est à peu-près le terme de la précision que l'on peut attendre de notre instrument, où l'intervalle de deux secondes est peu sensible, puisqu'il n'égale point la moitié de l'épaisseur du fil que nous avons supposée de plus de 3 secondes ; d'ailleurs il est impossible que plusieurs observations différentes, fussent-elles faites avec les plus grands & les meilleurs instrumens, se rencontrent précisément dans le même point, mais alors on doit prendre pour vrai un certain point dont le plus grand nombre d'observations s'écarte le moins, & autour duquel elles roulent : ce point est ici 25° 21' 24", que nous supposons être la distance apparente du Tropique du Cancer au Zénith de l'Observatoire.

\* Il nous reste à examiner si cette détermination s'accorde aux observations que nous  
\* Pag. 119. in 41  
avons

160 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE  
avons faites l'année précédente à Bourges ,  
dans un lieu plus méridional que l'Observatoi-  
re de Paris, de  $1^{\circ} 45' 7''$ .

*Observations du Soleil faites à Bourges au Sol-  
stice d'Ete de l'année 1739.*

Le zénith de l'instrument répondoit à ....  
 $26^{\circ} 23' 3''$  de la division.

La face de l'instrument étant tournée vers  
l'Orient, on fit les observations suivantes.

|                                                       | 18 Juin                         | 19 Juin                         | 21 Juin                        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Observation du bord supér.<br>du Soleil. . . . .      | $2^{\circ} 59' 59'' 19'''$      | $3^{\circ} 1' 14'' 17'''$       | $3^{\circ} 2' 33'' 6'''$       |
| Demi-diamètre du fil. . .                             | $3 \quad 6$                     | $3 \quad 6$                     | $3 \quad 6$                    |
| Observations corrigées. . .                           | $2 \quad 59 \quad 56 \quad 13$  | $3 \quad 1 \quad 11 \quad 11$   | $3 \quad 2 \quad 30 \quad 0$   |
| Zénith du Secteur. . . . .                            | $26 \quad 23 \quad 3 \quad 0$   | $26 \quad 23 \quad 3 \quad 0$   | $26 \quad 23 \quad 3 \quad 0$  |
| Distance du bord sup. du<br>Soleil au Zénith. . . . . | $23 \quad 23 \quad 6 \quad 47$  | $23 \quad 21 \quad 51 \quad 49$ | $23 \quad 20 \quad 33 \quad 0$ |
| Demi-diamètre du Soleil. .                            | $15 \quad 48 \quad 0$           | $15 \quad 48 \quad 0$           | $15 \quad 48 \quad 0$          |
| Dist. du centre du Soleil au<br>Zénith. . . . .       | $23 \quad 38 \quad 54 \quad 47$ | $23 \quad 37 \quad 39 \quad 49$ | $23 \quad 36 \quad 21 \quad 0$ |
| Dist. du Soleil au Tropique.                          | $2 \quad 34 \quad 0$            | $1 \quad 19 \quad 0$            | $3 \quad 0$                    |
| Distance du Trop. du Can-<br>cer au Zénith. . . . .   | $23 \quad 36 \quad 20 \quad 47$ | $23 \quad 36 \quad 20 \quad 49$ | $23 \quad 36 \quad 18 \quad 0$ |

La face de l'instrument tournée vers le  
Couchant.

22 Juin

|                                                    | 22 Juin         | 25 Juin         | Comparaison des                                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Observation du bord supér. du Soleil. . . . .      | 49° 43' 35" 51" | 49° 44' 48" 16" | Hauteurs du Soleil, observées le 21 & le 22 Juin pour le zénith du Secteur. |
| Demi-diamètre du fil. . . . .                      | 3 6             | 3 6             |                                                                             |
| Observations corrigées. . . . .                    | 49 43 38 57     | 49 44 51 22     |                                                                             |
| Zénith du Secteur. . . . .                         | 26 23 3 0       | 26 23 3 0       |                                                                             |
| Distance du bord sup. du Soleil au Zénith. . . . . | 23 20 35 57     | 23 21 48 22     | 3° 2' 30" 0"                                                                |
| Demi-diamètre du Soleil. . . . .                   | 15 48 0         | 15 48 0         | 49 43 38 57                                                                 |
| Dist. du centre du Soleil au Zénith. . . . .       | 23 36 23 57     | 23 37 36 22     | 52 46 8 57                                                                  |
| Dist. du Soleil au Tropique. . . . .               | 3 0             | 1 16 0          | 26 23 4 28                                                                  |
| Distance du Trop. du Cancer au Zénith. . . . .     | 23 36 20 57     | 23 36 20 22     | Zénith du Secteur                                                           |

Dans le calcul des observations précédentes, nous avons supposé le zénith de l'instrument tel que nous l'avions déterminé par les observations de différentes Etoiles, quoiqu'il \* parût plus naturel de l'employer tel qu'il résulte des observations du Soleil faites le 21 & le 22 Juin, d'autant plus que le Solstice étant arrivé dans l'intervalle entre ces observations, le Soleil devoit être à peu-près à la même hauteur le 21 & le 22 Juin à midi: cependant comme nous n'avions qu'une seule observation du Soleil faite en ce sens, la seconde étant trop éloignée du Solstice, nous avons jugé devoir nous arrêter à ce qui résultoit d'un plus grand nombre d'observations; d'ailleurs la différence est si petite, que l'on peut employer indifféremment l'une ou l'autre supposition, sans s'écarter dans les résultats, de plus d'une seconde.

Nous supposerons donc la distance du Tropique

\* Page 120, in 4

pique du Cancer au Zénith de l'Observatoire de Bourges, de . . . . .  $23^{\circ} 36' 20''$ .

Mais la différence des parallèles des deux Observatoires, est de . . .  $1^{\circ} 45' 7''$ .

Donc la distance apparente du Tropique du Cancer au Zénith

de Paris, doit être de . . . . .  $25^{\circ} 21' 27''$ .

Cette distance est plus grande de 3 secondes qu'elle ne résulte des observations faites à Paris, & elle le doit être en effet à cause de la réfraction qui rapproche les objets du Zénith d'autant qu'ils en sont plus éloignés; ainsi le Soleil étant plus élevé à Bourges qu'à Paris dans le tems du Solstice, ses hauteurs apparentes ont dû être différemment altérées par la réfraction, d'une quantité qui est de . . . . .  $2''$ ,

laquelle étant retranchée de . . .  $25^{\circ} 21' 27''$ ,

donne la distance apparente du Tropique du Cancer au Zénith

de l'Observatoire de Paris, de . . .  $25^{\circ} 21' 25''$ ,

différente seulement de  $1''$  de celle que nous avons établie par les observations immédiates.

Le raport de ces deux observations, qui est au-delà de tout ce qu'on peut espérer, puisqu'il ne faut point s'attendre à trouver une entière précision dans tout ce qui est genre d'observation, & qui demande de l'exécution & de la pratique, cette conformité, dis-je, dans la comparaison que nous venons de faire, nous sert en même tems de preuve \* de l'exactitude avec laquelle nous avons établi la différence des parallèles entre l'Observatoire de Paris & le lieu où nous avons observé à

Bour-

\* Pag.  
121. in 4.

Bourges, ce qui étoit un des objets de cette recherche.

Nous allons examiner présentement quelle est l'obliquité de l'Ecliptique qui résulte de ces nouvelles observations.

*Détermination de l'obliquité de l'Ecliptique.*

On ne peut douter que la hauteur du Pole de l'Observatoire ne soit connue à 10 secondes près, & ne soit aux environs de  $48^{\circ} 50' 10''$ . Cette détermination résulte des observations faites non seulement dans ce lieu, mais même en différens endroits de Paris, par M.<sup>rs</sup> Picard, le Chevalier de Louville & le Monnier le fils, & nous serons bientôt à portée de la vérifier, lorsque le nouveau Quart-de-cercle que construit le S.<sup>r</sup> Langlois dans la même forme que notre Secteur, sera achevé. A l'égard de la réfraction, les Tables de Mr. de la Hire la donnent à la hauteur de 64 degrés, plus grande de 7 secondes que celle qui est marquée dans la Connoissance des Temps: de plus ce même Astronome regarde l'effet de la parallaxe comme insensible à cette hauteur, tantis que mon Père la suppose encore de  $3''$  à la même hauteur; ainsi il est évident que selon que l'on emploiera l'une ou l'autre de ces deux Tables, il doit en résulter une différence de près de  $10''$  dans l'obliquité de l'Ecliptique.

Mais en attendant que l'on ait vérifié ces différences, nous supposons la réfraction moins la parallaxe, telle qu'elle est marquée dans la Conn. des Temps, & voici ce qui en résulte.

La



La réfraction moins la parallaxe à la hauteur de . . . . . 64° 55' 24",  
 est de . . . . . 25",  
 qu'il faut ajouter à la distance apparente du Tropique du Cancer 25° 21' 24",  
 & l'on aura la distance vraie, de 25 21 49,  
 laquelle étant retranchée de la hauteur du Pole . . . . . 48 50 10,  
 détermine l'obliquité de l'Ecliptique, de . . . . . 23° 28' 21".

\* Pag. 122. in 4. \* Ce seroit ici le lieu d'examiner s'il y a eu une variation réelle & uniforme dans cette obliquité, mais nous ne trouvons ni dans les observations anciennes ni dans les modernes aucun terme exact de comparaison; ainsi quoiqu'il y ait beaucoup d'apparence que cette obliquité diminue, l'on peut toujours douter si les différences que l'on y a remarquées, ne doivent pas être plutôt attribuées aux erreurs des observations qu'à une diminution réelle de cette obliquité. Mr. de la Hire rapporte au commencement de ses Tables astronomiques, que par un grand nombre d'observations qu'il a faites depuis l'année 1681 jusqu'en 1687 qu'il les a publiées, il a trouvé la hauteur apparente du bord supérieur du Soleil au Solstice d'Eté, de 64° 55' 24": si l'on en retranche le demi-diamètre du Soleil, que nous avons supposé de 15' 41", on aura la hauteur du centre du Soleil de 64° 39' 36", dont le complément 25° 20' 24" est la distance apparente du Tropique du Cancer au Zénith de l'Observatoire, plus petite d'une minute que celle que nous avons trouvée en dernier lieu; ainsi.

ainsi dans un espace de près de 50 ans il y auroit eu une diminution d'une minute dans l'obliquité de l'Ecliptique, tandis que selon d'autres observations faites par mon Grand-père en 1656, par Mr. Richer en 1672, on ne trouve qu'une différence de 42 à 34'' dans un intervalle de plus de 80 ans. On observera les mêmes variétés dans la comparaison des observations plus éloignées. Copernic en 1500 n'avoit trouvé cette obliquité que de  $23^{\circ} 28' 24''$ , peu différente de celle d'aujourd'hui, tandis que Tycho, 70 ans après, la suppose de  $23^{\circ} 31' 30''$ ; ainsi on ne peut rien encore établir de certain sur cette matière, il nous suffira pour le présent d'avoir bien constaté la hauteur solsticielle du Soleil, & il est à désirer, pour la perfection de l'Astronomie, que l'on fasse dans la suite une ample provision d'observations & de faits aussi bien avérés, qui pourront être un jour les fondemens & les sources fécondes de plusieurs découvertes qui paroissent réservées aux Siècles à venir.



\* Pag.  
123. in 4.

## \* OBSERVATIONS

SUR LES REMEDES DE MAD.<sup>LE</sup> STEPHENS

POUR LA PIERRE.

*Second Mémoire.*

Par Mr. MORAND (a).

ON a vu dans le premier Mémoire que j'ai donné sur les remèdes de M.<sup>lle</sup> Stephens, des expériences dont il résulte que l'Urine imprégnée de la vertu dissolvante des remèdes, est capable d'entamer la Pierre & d'en décomposer les parties; mais il manquoit à cela des preuves tirées de l'état de la Pierre exposée plus ou moins longtems dans la Vessie même, à l'action de l'Urine devenue médicamenteuse.

Comme j'ai eu connoissance de plus de soixante Malades qui ont usé de ces remèdes pour la Pierre bien constatée dans la Vessie, il étoit difficile que cette preuve échappât à mes recherches: elle m'a été fournie par trois de ces malades, dont ce Mémoire contient une courte histoire.

1. Un homme âgé de 34 ans, ayant les symptomes les plus cruels de la Pierre, fut sondé, & la Pierre fut constatée par la Sonde. Comme il avoit les signes d'un Ulcère à la Vessie, je lui conseillai foiblement l'usage des remèdes, par les raisons détaillées dans

(a) 9. Decembre 1741.

mon

mon premier Mémoire ; cependant il aimait mieux les essayer que de se livrer à l'opération, & les prit pendant trois mois, ses douleurs augmentèrent : il discontinua les remèdes vers la fin de Février 1741, & mourut dans le mois d'Avril.

A l'ouverture de son corps on lui trouva dans la Vessie une Pierre (*Fig. 1.*) du volume d'un gros marron, criblée dans toute sa surface comme une pierre tendre qui auroit été exposée à l'effet d'une chute d'eau, plus profondément entamée à sa face postérieure, & tronquée par en-bas, de façon qu'on juge qu'environ le quart de la Pierre a été détruit. \* Pag. 124. in 4.

En même tems que la Pierre fut trouvée, le jugement que j'avois porté sur l'Ulcère fut vérifié : la Pierre étoit à moitié enchatonnée dans un sac creusé dans la tunique interne de la Vessie, près de l'endroit où elle est percée par l'Urètre, & là cette tunique étoit ulcérée, épaissie & calleuse.

Mais une singularité très digne d'être remarquée, c'est que cette Pierre portoit dans une rainure creusée à sa face latérale gauche, une autre pierre plus petite (*Fig. 2.*) d'une nature toute différente, représentant une portion de Tuyau cylindrique, qui a près d'un pouce de long & quatre à cinq lignes de diamètre. Ce Tuyau est lisse au dehors, il est évidé jusqu'à la moitié de sa longueur par le bout qui regardoit l'Urètre, & n'a plus que l'écorce ; par le bout inférieur il est plein d'un bouchon pierreux qui commençoit à être cerné par en-haut.

De l'état dans lequel ces Pierres ont été trou-

trouvées, je tire les conséquences suivantes, & je dis : premièrement, que la grosse Pierre avoit été entamée dans toute sa surface par l'Urine empreinte de la vertu dissolvante des remèdes ; secondement, que les grains de sable dont elle est composée, ayant peu de liaison entr'eux, & faisant une pierre bien moins compacte que celles qui sont formées par couches, ils ont pu être absolument desunis, & que la Pierre a même été vraisemblablement détruite dans sa partie inférieure, qui est précisément l'endroit où elle a été plus constamment environnée de l'Urine ; troisièmement, que si le malade ne s'étoit point trouvé dans les circonstances fatales qui aggravent son mal, la pierre auroit pu à la longue être détruite en entier par l'usage des remèdes, puisqu'en trois mois de tems elle en avoit éprouvé des effets si marqués.

Si on considère à part le Tuyau pierreux, on sera disposé à croire qu'il a été originai-  
 \* Pag. 125. in 4. rement formé dans l'Uretere, \* qui lui a servi de moule ; mais il est bon d'observer par rapport à la consistance différente des couches, que c'est l'inverse des Pierres de Vessie, car l'écorce du Tuyau est bien plus solide que la matière pierreuse qui le bouche, & peut-être l'Urine dissolvante avoit-elle détruit ce qui manquoit du bouchon.

2. J'ai dit dans mon premier Mémoire que les Pierres meurales ne me paroissent pas susceptibles de l'action des remèdes ; mais comme plusieurs espèces de Pierres sont comprises sous cette dénomination, lorsque leur surface extérieure est hérissée de mamelons pareils à ceux  
 du



du fruit du Meurier, je restrains la proposition à celles qui ont la couleur de mâchefer, & qui sont presque aussi dures que le Marbre : cependant on donne le même nom à des Pierres de couleur de safran ou de rouille de fer, qui sont moins dures que les précédentes, mais qui le sont beaucoup plus que les Pierres blanches, & que celles qui sont faites de grains de sable amoncelés autour d'un noyau ou sans noyau. Je n'aurois pas cru qu'aucune de ces Pierres meurales eût pu être entamée par l'action des remèdes, mais je croi avoir une preuve que celles de la seconde espèce ne leur résistent pas.

Un homme âgé de 74 ans, ayant la Pierre bien constatée par la Sonde, avoit pris pendant trois mois de suite la boisson savonneuse & la poudre. Il en fut soulagé pendant quelque tems : mais les douleurs étant revenues, il se soumit à l'opération de la Taille, qui lui fut faite par Mr. Guérin au mois d'Avril dernier.

On lui tira une Pierre (*Fig. 3.*) grosse comme un petit œuf, aplatie par deux faces dans sa longueur. On ne peut mieux exprimer l'action des Urines sur cette Pierre, qu'en disant qu'elle est cizelée ; elle paroît avoir eu une écorce raboteuse qui a été détruite presque partout, & dont il ne reste que quelques vestiges en sa surface : les couches rougeâtres qui sont sous cette écorce, étant entamées inégalement, on peut compter celles qui sont détruites, & il y a des endroits où on en compte réellement jusqu'à six d'usées.

\* Enfin, la destruction de ces couches a dé-  
couvert une autre couche grise qui commen-

\* Pag. 126.  
in 4.

Mém. 1741.

H

çoit

coit elle-même à être entamée. Excepté la Pierre dont Mr. Hartley parle dans son Supplément, qui étoit cavée par dedans, & percée de plusieurs trous qui la traversoient dans toute son épaisseur, je n'en vois point qui fournisse des preuves plus sensibles de l'opération des remèdes, que celle dont je viens de donner l'histoire.

J'ajouterai en passant, que ce malade a été très bien guéri, ce qui prouve que l'usage des remèdes ayant précédé l'opération n'en empêche point le succès, toutes choses étant d'ailleurs égales.

3. Je crois pouvoir rapporter à ces observations celle qui a été communiquée à l'Académie par Mr. Lieutaud, l'un de ses Correspondans, qui a donné les remèdes de M<sup>lle</sup>. Stephens avec succès à six malades d'Aix en Provence, dont le plus jeune a cinquante ans passés. Un de ces malades ayant pris les remèdes pendant un mois & quelques jours, mourut de l'état misérable où l'avoient mis des souffrances continuelles. On l'ouvrit, on lui trouva une Pierre (*Fig. 4.*) de la grosseur d'un petit œuf de Poule, dont la première couche avoit été presque entièrement emportée: la seconde étoit détruite en plusieurs endroits, & découvrit la troisième qui est d'une couleur plus foncée, de manière que la surface de cette Pierre représente assez bien celle d'un os vermoulu.

Si l'aspect de cette Pierre a pu étonner ceux qui ont assisté à l'ouverture du Cadavre, comme le rapporte M. Lieutaud, ils l'eussent été bien davantage en voyant celles qui font le sujet des observations précédentes. En effet,

Pim-

l'impression du dissolvant y est bien plus marquée, les traces sont bien plus profondes, & l'action des remèdes y est bien mieux démontrée.

Ceux qui se refusent même aux vraisemblances sur cette matière, diront peut-être que ces Pierres, écorchées, entamées, usées, selon moi, par l'effet des remèdes, étoient tel-<sup>\*Pag. 127.</sup> les\* dans la Vessie, indépendamment de l'effet<sup>in 4.</sup> que j'attribue aux remèdes, & la difficulté m'en a été faite.

A cela je réponds deux choses. 1. On n'a vu tant de Pierres si bizarrement ciselées, travaillées, rongées, que depuis que les remèdes de M<sup>re</sup>. Stephens sont en vogue. Pourquoi dans les Cabinets de ceux qui rassemblent des Pierres de Vessie, n'en voit-on pas qui en approchent ? & si par hazard il s'y en trouve, pourquoi sont-elles plus communes à présent ?

2. J'ai une preuve complète que dans l'usage de ces remèdes on rend par la voye des urines, je ne dis pas des écailles, mais des fragmens qui ont la même surface que la Pierre qu'on retrouve ensuite dans la Vessie.

Le malade cité au N<sup>o</sup>. 24. de mon premier Mémoire, m'en a fourni un exemple. Il rendoit très souvent des morceaux de Pierre, hérissés de petites houppes & de mamelons déchiquetés comme le Choux-fleur ; & la Pierre que je lui tirai par l'opération de la Taille, étoit extérieurement garnie de ces mêmes houppes, ainsi que deux petits morceaux trouvés dans la Vessie après sa mort. (*Fig. 5.*)

Si par la dissolution de la Pierre par l'effet des remèdes, on entend sa division en petits

morceaux, je crois en avoir des preuves de reste; il n'en faut plus que de la destruction totale de la Pierre, tirées de l'ouverture des Cadavres; c'est ce que je chercherai avec la même attention que j'ai donnée jusqu'à présent à cette matière.



\*Pag. 28. \* *SUR LA DETERMINATION*  
in 4. *DES SOLSTICES.*

Par Mr. CASSINI DE THURY.

12 Aout  
1741.

**L**Es déterminations astronomiques ont presque toutes un si grand rapport entr'elles, qu'elles peuvent être regardées comme inséparables les unes des autres; telles sont la Réfraction, la Parallaxe, la hauteur du Pole, l'obliquité de l'Ecliptique, & autres élémens qui entrent nécessairement dans presque tous les calculs astronomiques. La connoissance de la Réfraction suppose celle de la hauteur du Pole, tandis que la détermination de la hauteur du Pole est dépendante de la Réfraction; il en est de même de l'obliquité de l'Ecliptique & de presque toutes les autres recherches en Astronomie, desorte que ce n'est que par une espèce de tâtonnement que l'on peut procéder dans toutes ces connoissances. Il est vrai que l'on a cherché & tenté différentes méthodes pour y parvenir par des voies directes, mais comme elles supposent presque toutes des instru-

trumens composés & parfaits, des observations rares, ou des opérations très difficiles, on ne voit point que ceux mêmes qui les ont proposées, en aient fait aucun usage.

Il n'en est pas de même de la Méthode que M<sup>rs</sup>. Flamsteed & Manfredi ont proposée pour déterminer le tems du Solstice, un des élémens les plus importans en Astronomie, puisqu'il entre nécessairement dans la Théorie du mouvement du Soleil, en donnant une époque certaine de son vrai lieu dans le Ciel. Cette Méthode si simple, puisqu'elle ne suppose que des observations, a été pratiquée par différens Astronomes, comme on peut le voir dans les Mémoires de l'Académie de l'année 1738, & ils conviennent tous qu'elle est préférable à toutes celles qu'on avoit mises en usage jusqu'alors.

\* Mais de quel degré de précision cette nouvelle méthode est-elle susceptible ? quel est son <sup>\*Pag. 129.</sup> <sup>in 4.</sup> avantage sur toutes celles qui l'ont précédée ? C'est ce que je me suis proposé d'examiner dans ce Mémoire, & ce qui étoit d'autant plus nécessaire, que mon Père a rapporté dans ses Elémens d'Astronomie une longue suite d'observations des Solstices, tant d'Eté que d'Hiver calculées selon les méthodes ordinaires ; il étoit donc de la dernière importance de s'assurer à quel degré de précision l'on a pu parvenir par la route que l'on a suivie, & jusqu'à quel point on peut compter sur ces déterminations.

Quoique cette matière fût très susceptible d'être discutée par raisonnement, j'ai jugé devoir y procéder d'une autre manière, par la



voie d'expérience, au-lieu de commencer par traiter séparément, & apprécier, pour ainsi dire, les erreurs commissibles, tant de la part de l'Instrument, que de celle de l'Observateur. J'exposerai d'abord les observations mêmes affectées de leurs erreurs; j'examinerai ensuite, en les appliquant aux deux différentes méthodes que l'on a adoptées jusqu'à présent, les différences qui résulteront de cette comparaison, & l'on verra par tous les détails où je suis entré, que j'ai plutôt cherché à donner tous les éclaircissemens que l'on pourroit désirer sur cette matière, qu'à rien ajouter ou diminuer du prix de ces deux méthodes auxquelles je n'ai aucune part.

La méthode que mon Père a employée pour déterminer le tems du Solstice, consiste à comparer plusieurs hauteurs méridiennes du Soleil observées avant & après le Solstice, choisissant celles qui sont de la même quantité, ou au moins qui approchent le plus de l'égalité. Cette méthode, qui étoit directe il y a environ 400 ans, lorsque l'apogée du Soleil étoit au commencement du Cancer où répond le colure des Solstices, a perdu cet avantage, qu'elle ne pourra recouvrer qu'après une longue suite de Siècles. Il suit du mouvement de l'apogée du Soleil, que lorsque le Soleil est à la même hauteur sur l'horison, ou à distance égale du \* colure des Solstices, il ne se trouve plus à la même distance de son apogée, & par conséquent son mouvement à distance égale du Solstice est inégal d'une quantité qui dépend de la distance de l'apogée du Soleil au colure des Solstices, & de la différence

rente distance du Soleil à son apogée dans les deux observations correspondantes; on est donc obligé d'avoir recours à la Théorie du Soleil, & d'emprunter des Tables les Equations nécessaires pour réduire le tems du Solstice apparent ou compliqué des inégalités du mouvement du Soleil, au vrai tems du Solstice qu'on cherche.

Pour donner une idée plus parfaite des principes & des élémens de cette méthode, nous allons en faire l'application à de nouvelles observations que j'ai faites pour déterminer l'heure du Solstice de cette année.

Quoique l'on n'ait besoin pour cette recherche que des hauteurs apparentes du Soleil, indépendantes par conséquent de l'erreur de l'instrument que l'on emploie, il est cependant de la dernière importance de s'assurer qu'il ne lui est arrivé aucune variation dans l'intervalle entre les deux observations correspondantes.

L'instrument dont je me suis servi, doit paroître moins sujet à se déranger que tout autre, étant fixement arrêté & scellé dans l'ancien mur de l'Observatoire; j'ai jugé cependant devoir le vérifier de différentes manières, soit en comparant les hauteurs de la même Etoile, observées dans les deux tems différens, & corrigées par l'aberration, soit en dirigeant la Lunette mobile à un point fixe de l'horison dans le tems que le Thermomètre marquoit le même degré de la température de l'air, soit enfin en examinant si les hauteurs du Soleil observées à la Méridienne & avec notre instrument, différoient toujours de la même quan-

tité. Toutes ces différentes voies ont concouru à prouver que la Lunette mobile du Quart-de-cercle n'a pas varié, & que par conséquent il n'y avoit aucune correction à faire aux observations des hauteurs du Soleil que je vais rapporter.

\* Pag. 131.  
in 4.

J'ai comparé les hauteurs apparentes du bord supérieur \* du Soleil, observées le 21 Mai & le 22 Juillet : la première a été déterminée de  $61^{\circ} 42' 15''$ , la seconde, de  $61^{\circ} 42' 52''$ , plus grande de 37 secondes que la première, & même de 40 secondes, si l'on a égard à la variation du diamètre du Soleil, qui a dû diminuer la hauteur apparente de son bord d'une quantité qui se monte à 3 secondes; le Soleil n'étoit donc pas encore arrivé le 22 Juillet à midi au même parallèle où il répondoit le 21 Mai à la même heure, il s'en falloit d'une quantité de tems qui répond à 40 secondes de déclinaison, proportionnelle à la variation diurne du Soleil en déclinaison, qui résulte des hauteurs observées le 22 & le 23 Juillet, de  $12' 2''$ . On trouvera donc  $1^h 19' 46''$  pour le moment où le Soleil est parvenu à la même hauteur où il a été observé le 21 Mai à midi, après un intervalle de tems de  $62^j 1^h 19' 46''$ , dont la moitié  $31^j 0^h 39' 53''$  étant ajoutée au 21 Mai, détermine le tems du Solstice apparent le 21 Juin à  $0^h 39' 53''$  après midi.

Pour réduire le tems du Solstice apparent au vrai, j'ai déduit des Tables de mon Père tout les élémens que cette réduction suppose, j'ai trouvé le lieu du Soleil le 21 Mai à midi de  $2^f 0^{\circ} 21' 37''$ , celui de son apogée de  $3^f 8^{\circ} 18'$ , son anomalie vraie de  $10^f 22^{\circ} 3'$ , le lieu du So-

Soleil le 22 Juillet à  $1^h 19' 45''$ , de  $3^s 29' 37' 24''$ , son anomalie vraie de  $0^s 21' 20''$ , l'Equation qui convient à la distance du colure des Solstices à l'apogée du Soleil, de  $0^s 16' 24''$ , celles qui répondent aux anomalies vraies du Soleil, l'une de  $1^s 10' 4''$ , l'autre de  $0^s 41' 20''$ : la différence de ces deux Equations est  $0^s 28' 44''$ ; dont la moitié  $14' 22''$ , étant retranchée de  $0^s 16' 24''$ , Equation solsticielle, il reste  $2' 2''$  pour la différence en degré du Solstice apparent au vrai, que le Soleil parcourt en  $49\frac{1}{2}$  de tems; on trouvera donc l'heure du Solstice vrai le 21 Juin à  $1^h 50'$  du matin. On auroit dû, pour une plus grande exactitude, réduire les tems des observations des hauteurs du Soleil au tems moyen; mais comme cette correction ne produit qu'une très petite différence dans le tems du Solstice, on peut la négliger. \*Pag. 132. in 4.

On voit aisément, en suivant les opérations que nous venons de faire, que toute la précision de cette détermination dépend de la certitude des élémens que l'on a employés, & c'est ce dont on pourra juger après l'application que nous allons faire des mêmes observations à la méthode de Mrs. Flamsteed & Manfredi.

L'objet principal de cette méthode est de parvenir à la connoissance de l'heure du Solstice par la seule voie d'observation, d'ailleurs elle n'est proprement qu'une addition à la première, elle suppose de même l'observation des hauteurs égales du Soleil avant & après le Solstice: mais au-lieu d'emprunter des Tables les élémens qui appartiennent à la théorie du So-

leil, elle enseigne le moyen de trouver directement le mouvement vrai du Soleil, en le rapportant à une Etoile fixe : la distance de l'Etoile au Soleil, lorsqu'il est sur un même parallèle, détermine celle de l'Etoile au colure des Solstices, & par conséquent son ascension droite; enfin la distance de l'Etoile au Soleil, connue le jour du Solstice, donne celle du Soleil au colure des Solstices, & par conséquent l'heure du Solstice.

On peut même tirer de cette méthode des connoissances plus générales, car l'ascension droite d'une Etoile une fois connue, on aura celle du Soleil pour tous les jours de l'année où l'on aura déterminé les passages de l'Etoile & du Soleil au Méridien, ou leur différence d'ascension droite: il est vrai que c'est dans la supposition que l'Etoile soit fixe, ou au moins qu'elle n'ait qu'un mouvement apparent en ascension droite; car si on lui attribue quelque mouvement particulier, ou au moins une apparence de mouvement, c'est une considération de plus qui ôteroit à la méthode l'avantage qu'elle a d'être directe.

Comme il est nécessaire, pour faire usage de cette méthode, de connoître la distance du Soleil à une Etoile dans \* trois tems différens, nous avons choisi principalement pour cette recherche, *Arcturus*. Cette Etoile peut s'observer au Méridien dans tous les tems de l'année, & est celle dont on connoît le plus exactement la position dans le Ciel, ayant été employée par divers † Astronomes pour différentes recherches.

Re-

\* Voy. les Mém. de P. A. 1738. pag. 384. & 462.



*Recherche de la distance d'Arcturus au colure  
des Solstices.*

Nous avons déterminé le 21 Mai la différence d'ascension droite entre le Soleil & Arcturus, de  $10^h\ 9'\ 30''$ , qui répondent à  $152^\circ\ 46'\ 41''$ , supposant la révolution des fixes à la Pendule, de  $23^h\ 56'\ 9''$ , telle qu'elle résulte des passages au méridien de cette Etoile, observés le 21 & le 22 Mai.

Le 22 & le 23 Juillet le passage au méridien de la même Etoile a été observé, l'un à  $5^h\ 55'\ 56''$ , & l'autre à  $5^h\ 51'\ 58''$ , après celui du Soleil; donc en supposant la révolution des fixes de  $23^h\ 56'\ 9''$ , on trouvera la différence d'ascension droite entre le Soleil & Arcturus, le 22 Juillet à midi, de  $89^\circ\ 13'\ 0''$ , & le 23 Juillet à la même heure, de  $88^\circ\ 13'\ 40''$ .

Pour connoître la différence d'ascension droite entre le Soleil & Arcturus, au tems où il avoit la même déclinaison, j'ai supposé la variation diurne du Soleil en ascension droite, de  $0^\circ\ 57'\ 20''$ , telle qu'elle résulte des observations du 22 & du 23 Juillet, & j'ai trouvé dans cette proportion  $3'\ 18''$  pour  $1^h\ 19'\ 46''$ , d'où j'ai déduit la différence d'ascension droite du Soleil & de l'Etoile le 22 Juillet à  $1^h\ 19'\ 46''$  de  $89^\circ\ 9'\ 42''$ ; on l'avoit trouvée le 21 Mai de  $152^\circ\ 46'\ 41''$ , la différence est  $63^\circ\ 36'\ 59''$ , dont la moitié  $31^\circ\ 48'\ 29''$  étant retranchée de  $152^\circ\ 46'\ 41''$ , détermine la distance d'Arcturus au colure des Solstices de  $120^\circ\ 58'\ 12''\ \frac{1}{2}$ , & partant son ascension droite de  $210^\circ\ 58'\ 11''\ \frac{1}{2}$ .

L'ascension droite que nous venons de dé-

terminer, n'est que l'apparente, affectée de  
 Pag. 134. l'aberration de cette Etoile qui \* étoit diffé-  
 n 4. rente au tems des deux observations; puisque  
 dans la première elle étoit de  $17''$  à l'Orient,  
 & dans la seconde de  $1''$ . La somme de ces  
 deux aberrations est  $18''$ , dont la moitié  $9''$  est  
 la quantité qu'il faut retrancher de  $210^{\circ} 58'$   
 $11'' \frac{1}{2}$  pour avoir la vraie ascension droite  
 d'Arcturus de  $210^{\circ} 58' 2'' \frac{1}{2}$ .

Mais si cette correction est nécessaire pour  
 trouver la vraie ascension droite d'une Etoile  
 quelconque, elle devient inutile dans le cas  
 présent où il s'agit de déterminer le tems du  
 Solstice, puisqu'on n'a besoin que de l'ascen-  
 sion droite apparente, & qu'il est égal d'a-  
 jouter  $9''$  (aberration de l'Etoile au tems du  
 Solstice) à sa vraie ascension droite, pour a-  
 voir l'apparente, ou de ne faire aucune cor-  
 rection aux différences d'ascension droite dé-  
 terminées avant & après le Solstice, le résul-  
 tat sera toujours le même; ainsi cette métho-  
 de, dans de certains cas où les effets de l'a-  
 aberration se compensent. (ce qui n'arrive pas  
 toujours) peut être regardée comme indépen-  
 dante de tout élément, & toute l'exaëtitude  
 que l'on en peut espérer, dépend de celle avec  
 laquelle on aura déterminé l'ascension droite  
 d'une Etoile; c'est ce qui nous a engagés à  
 comparer d'autres observations faites à diffé-  
 rentes distances du Solstice.

Le 7 Juin le passage du centre du Soleil au  
 Méridien a été déterminé à  $11^h 55' 27''$ ; la  
 hauteur apparente de son bord supérieur étoit  
 de  $64^{\circ} 14' 45''$ . Le même jour le passage  
 d'Arcturus au Méridien a été observé à  $8^h 55'$   
 $57''$ ,

57", ou 9<sup>h</sup> 0' 30" après celui du Soleil; la révolution des fixes à la Pendule ayant été trouvée de 23<sup>h</sup> 56' 7"  $\frac{1}{2}$ , on aura la différence d'ascension droite entre le Soleil & Arcturus, le 7 Juillet à midi, de 135° 29' 30".

Le 5 Juillet le centre du Soleil a passé au Méridien à 12<sup>h</sup> 2' 20"  $\frac{1}{2}$ ; la hauteur de son bord supérieur a été déterminée de 64° 14' 50". Le même jour on a observé le passage d'Arcturus au Méridien à 7<sup>h</sup> 7' 42"; & comme la révolution des fixes à la Pendule n'étoit plus que de 23<sup>h</sup> 56' 6", \* la différence d'ascen- \* Pag. 135.  
sion droite entre le Soleil & Arcturus étoit in 4.  
donc le 5 Juillet à midi, de 106° 27' 50".

Il paroît par le détail de ces observations que le Soleil étoit plus élevé sur l'horison, ou moins éloigné du colure des Solstices le 5 Juillet à midi que le 7 Juin à la même heure. La différence est de 5", qui, supposant la variation diurne en déclinaison de 5' 45", répond à 20' de tems; le Soleil avoit donc la même déclinaison le 5 Juillet à 12<sup>h</sup> 20' que le 7 Juin à midi.

La différence d'ascension entre le Soleil & Arcturus, que nous avons déterminée le 5 Juillet de 106° 27' 50", est celle qui convient à l'heure du passage du Soleil au Méridien, & l'on trouvera celle qui répond à 20 minutes de tems, de 35", supposant la variation diurne en ascension droite, de 1° 1' 42"; donc la différence d'ascension droite entre le Soleil & Arcturus étoit le 5 Juillet à 12<sup>h</sup> 20', de 106° 27' 15": on l'avoit trouvée le 7 Juin de 135° 29' 30"; la différence est 29° 2' 15", dont la moitié 14° 31' 7"  $\frac{1}{2}$  étant retranchée de 135° 29' 30", donne la distance d'Arcturus au

colure des Solstices, de  $120^{\circ} 58' 22'' \frac{1}{2}$ , plus grande de  $11''$  que par la détermination précédente.

Quoique l'aberration de cette Etoile fût différente dans le tems de ces deux observations, qu'on l'ait trouvée de  $14''$  dans l'une & de  $5''$  dans l'autre, la moitié de la somme est à peu-près égale à l'aberration solsticiale, conformément à ce que nous avons trouvé dans le premier exemple.

### *Détermination du Solstice.*

Présentement que l'on a bien constaté l'ascension droite d'Arcturus, il sera aisé de trouver le tems du Solstice, ou l'heure à laquelle la différence d'ascension droite entre le Soleil & Arcturus auroit été observée de  $120^{\circ} 58' 11'' \frac{1}{2}$ , telle qu'elle résulte de la première détermination, préférable à la seconde en ce que les observations ont été faites dans un tems où la variation diurne du Soleil en déclinaison est \* plus grande, & où l'Etoile étoit dans le même parallèle que le Soleil. Voici donc les observations pour trouver le tems du Solstice.

|              |                                             |         |                                                 |                          |
|--------------|---------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Le 20 Juin   | $11^h 58' 47''$                             | 21 Juin | $11^h 59' 2''$                                  | $8^h 1' 35''$            |
| Arcturus..   | $8 \ 5 \ 29 \frac{1}{2}$                    |         | $8 \ 1 \ 35$                                    | $8 \ 5 \ 29 \frac{1}{2}$ |
| Différence.. | $8 \ 6 \ 42 \frac{1}{2}$                    |         | $8 \ 2 \ 33$                                    | $3 \ 54 \frac{1}{2}$     |
|              | $23^h 56' 5'' \frac{1}{2} : 360^{\circ} ::$ |         | $8^h 6' 42'' \frac{1}{2} : 122^{\circ} 0' 30''$ |                          |
|              | $:: 8 \ 2 \ 33$                             |         | $:: 120 \ 58 \ 0$                               |                          |
|              | $1^{\circ} 2' 30'' : 24^h ::$               |         | $12'' : 4' 36''$                                |                          |

Les

Les derniers termes de ces trois proportions nous font connoître, premièrement que le Solstice a dû arriver avant le midi du 21 Juin, puisqu'alors la distance d'Arcturus au Soleil étoit moindre que la distance de cette Etoile au colure des Solstices; secondement, que la différence, qui est de  $12''$ , répond à  $4\frac{1}{2}$  de tems qu'il faut retrancher du midi du 21 Juin pour avoir l'heure vraie du Solstice à  $11^h 55'\frac{1}{2}$  du matin. Si l'on avoit supposé la distance d'Arcturus au colure des Solstices plus grande de  $11''\frac{1}{2}$ , on auroit trouvé l'heure du Solstice le 21 Juin à  $11^h 51'$  du matin.

On ne sauroit présentement décider à laquelle des deux méthodes appartient la différence que l'on peut remarquer dans leurs résultats, sans avoir déterminé les limites de la précision dans lesquelles chacune est renfermée.

Si l'on suppose l'ascension droite de l'Etoile une fois connue, & qu'il ne s'agisse que de déterminer le tems du Solstice, on ne doit plus considérer que l'erreur dans les observations du passage du Soleil & de l'Etoile au Méridien faites le jour du Solstice; & si l'on s'en rapporte à l'expérience, on reconnoitra qu'il est difficile de déterminer à moins d'une demi-seconde, les différens instans où deux Etoiles arrivent à un même fil. Mais s'il est nécessaire d'avoir recours à de nouvelles observations pour déterminer l'ascension droite de l'Etoile, on aura bien d'autres sujets de \* considération, l'erreur dans les observa-<sup>\*Pag. 137.</sup> tions des hauteurs apparentes du Soleil avant<sup>in 4.</sup> & après le Solstice y doit entrer, elle est d'au-



d'autant plus grande que les observations ont été faites plus près du Solstice; enfin on a besoin d'un plus grand nombre d'observations des passages du Soleil & de l'Etoile au Méridien.

Supposons que l'on se soit trompé de 5'' dans l'observation de la hauteur apparente du Soleil le 22 Juillet, il en résulteroit une différence de 10' de tems dans l'heure de l'observation correspondante à celle du 21 Mai, une erreur de 17'' dans la différence d'ascension droite calculée pour ce tems, une de 8''  $\frac{1}{2}$  dans l'ascension droite de l'Etoile, & enfin une de près de 4' dans le tems du Solstice; & il faut avouer que cette supposition peut être admise, sur-tout si l'on emploie pour les observations les instrumens ordinaires.

A l'égard des erreurs dans l'observation des passages au Méridien, elles seroient fort à craindre si elles ne se compensoient; car si on les déduit des hauteurs correspondantes du Soleil & de l'Etoile, il faut au moins huit observations, & on n'en sauroit trop faire, puisque ce n'est qu'en prenant un milieu entre plusieurs hauteurs correspondantes, qu'on peut espérer de déterminer les passages au Méridien à une demi-seconde près. Il ne faut que jeter les yeux sur les observations que Mr. le Monnier rapporte dans les Mémoires de l'Académie de l'année 1738, pour reconnoître combien cette détermination est délicate, puisque les milieux qu'il a établis, résultent de plus de 60 observations; il est vrai que si on se sert d'une Lunette fixe, garnie seulement d'un Micromètre, l'opération de-

deviendra beaucoup plus simple, elle se réduira à quatre observations, & on fera usage du Micromètre pour déterminer la différente hauteur du Soleil au tems des observations correspondantes.

L'autre méthode suppose à la vérité beaucoup moins d'observations, mais aussi elle demande plus de calcul, de sorte que l'on ne peut apprécier les erreurs dont elle est \* susceptible, sans avoir examiné séparément \* Pag. 138. tous les élémens qu'on est obligé d'employer in 4. pour suppléer aux observations.

L'erreur dans les observations des hauteurs du Soleil lui est commune avec l'autre méthode, & produit le même effet sur le tems du Solstice, que l'on déduit en partie de l'intervalle de tems écoulé entre les observations des hauteurs égales du Soleil.

Parmi les élémens qu'elle suppose, l'un est la connoissance du vrai lieu du Soleil, l'autre la distance de son apogée au colure des Solstices. On peut déduire l'un, ou de l'observation même, ou des Tables astronomiques: si on déduit le lieu du Soleil de sa déclinaison observée, & qu'on la suppose affectée de la même erreur qu'on a assignée aux hauteurs du Soleil, c'est-à-dire, de  $5''$ , il en résultera une différence de  $30''$  dans le lieu du Soleil pour le tems de cette observation; d'où l'on peut conclure que dans le cas où la variation diurne du Soleil en déclinaison est peu sensible, on doit s'en rapporter aux Tables qui sont susceptibles d'une plus grande précision; on a même un moyen de les vérifier, car si elles s'accordent avec l'observation, elles doi-

doivent donner deux lieux du Soleil, tels que l'un soit le supplément de l'autre à  $180^{\circ}$ .

A l'égard de la situation de l'apogée du Soleil, il est certain que selon qu'on le supposera plus ou moins avancé dans le Ciel, il en doit résulter une différence dans les sommes & différences des Equations, & par conséquent dans le tems du Solstice; & comme les méthodes que l'on emploie ordinairement pour trouver le lieu de l'apogée du Soleil & des autres Planètes, ne peuvent fixer la position de ce point qu'à un quart de degré près, toute l'incertitude se trouve réduite à celle que 15 minutes de différence dans la situation de l'apogée peuvent produire dans les Equations que l'on emploie: si on suppose dans l'exemple précédent, que le lieu de l'apogée du Soleil soit moins avancé de 15 minutes de degré, on trouvera  $1^{\circ} 58''$  pour la différence du Solstice apparent \* au vrai, au lieu de  $2^{\circ} 2''$  qu'on avoit d'abord trouvées, ce qui produit une minute de tems de différence sur le tems du Solstice.

\*Pag. 139.  
in 4.

Il en sera de même des Equations qui conviennent aux anomalies vraies, quoique les Tables ne s'accordent point, ni sur la plus grande Equation du Soleil, ni sur la manière de la distribuer pour tous les degrés d'anomalie, & que par exemple les Tables de Mr. de la Hire donnent l'Equation solsticielle plus petite de  $6''$  que les Tables de mon Père, celle qui convient à  $10^{\circ} 22'$ , plus petite de  $27''$ , & à  $0^{\circ} 22'$ , plus petite de  $13''$ ; on trou-

trouvera également  $1' 58''$  pour la réduction au Solstice vrai.

Bien loin que l'on puisse encore décider sur la préférence qu'on doit donner à l'une de ces deux méthodes qui, quoique différentes dans la spéculation, paroissent également bonnes dans la pratique, il semble au contraire que si l'on s'en rapporte aux observations & au peu de différence que l'on a remarqué dans leurs résultats, on doit de plus en plus suspendre son jugement. La nouvelle méthode ne suppose à la vérité que des observations, mais ces observations, quoique simples & communes, deviennent difficiles par la rigoureuse précision dont on a besoin : l'autre suppose des connoissances que nous avons acquises par un grand nombre d'observations, & qui nous dispensent de les répéter; cela revient à peu-près au même. Mais n'insistons pas davantage sur l'éclaircissement d'un fait que nous ne voulons approfondir que par la voie d'observation & d'expérience; revenons aux observations, & cherchons dans celles des autres Astronomes des preuves de ce que nous venons d'avancer.

Nous employerons pour cet effet des observations faites dans des tems différemment éloignés du Solstice, avec des instrumens & par des Observateurs différens. Les unes ont été faites à l'Observatoire par mon Père, & les autres au Collège d'Harcourt par Mr. le Monnier; elles sont rapportées dans les Mémoires de l'Académie de l'année 1738.

\* Selon les observations de mon Père, le \*Pag. 140.  
Soleil étoit le 19 Juillet 1738 à  $14^h 44' 30''$  à in 4.  
la

la même hauteur apparente que le 24 Mai à midi ; l'intervalle de tems écoulé entre ces deux observations, est de 56 jours  $14^h 44' 30''$ , dont la moitié  $28^j 7^h 22' 15''$  étant ajoutée au 24 Mai, donne le tems du Solstice apparent le 21 Juin de l'année 1738, à  $7^h 22' 15''$ .

Mr. le Monnier a trouvé par ses observations, que le Soleil répondoit au même parallèle le 29 Mai à  $14^h 5'$  que le 14 Juillet à midi, après un intervalle de tems de  $45^j 9^h 55'$ , dont la moitié  $22^j 16^h 57\frac{1}{2}'$  étant ajoutée au 29 Mai, détermine le tems du Solstice apparent le 21 Juin à  $7^h 2' 30''$ .

Il est évident que ces observations faites dans des tems différemment éloignés du Solstice, ne doivent donner le même résultat que lorsqu'elles auront été corrigées par les Equations nécessaires.

Comme ces deux Astronomes ne nous ont donné que les hauteurs apparentes du Soleil, sans avoir égard aux corrections des instrumens, & qu'en effet elles suffisoient pour la méthode qu'ils ont pratiquée, nous ne pouvons ici en faire usage pour conclurre le vrai lieu du Soleil; nous y avons suppléé par le moyen des Tables.

| Longitude vraie du Soleil.    | Anomalie vraie,     | Equation.     |
|-------------------------------|---------------------|---------------|
| 24 Mai. . $2^s 2^o 58' 35''$  | $10^s 24^o 43' 3''$ | $1^o 5' 47''$ |
| 29 Mai. . $2 \ 8 \ 19 \ 51$   | $11 \ 0 \ 4 \ 19$   | $0 \ 56 \ 48$ |
| 14 Juillet $3 \ 21 \ 40 \ 10$ | $0 \ 13 \ 24 \ 38$  | $0 \ 26 \ 19$ |
| 19 Juillet $3 \ 27 \ 1 \ 27$  | $0 \ 18 \ 46 \ 10$  | $0 \ 36 \ 32$ |

L'Equation qui convient à  $8^o 15'$ , distance  
de



de l'apogée du Soleil au colure des Solstices, est, selon les mêmes Tables, de  $0^{\circ} 16' 18''$ , la différence entre la première & la quatrième Equation est  $0^h 29' 15''$ , dont la moitié  $14' 37'' \frac{1}{2}$  étant retranchée de  $16' 18''$ , reste  $1' 41''$  pour la réduction \* qui convient au Solstice \* Pag. 141. apparent, que le Soleil parcourt en 42 minutes de tems; donc l'heure du Solstice vrai sera le 21 Juin à  $6^h 40'$ .

Prenant de même la différence entre les deux autres Equations, on aura  $30' 29'$ , dont la moitié  $15' 14'' \frac{1}{2}$  étant retranchée de  $0^h 16' 18''$ , reste  $1' 3''$  que le Soleil parcourt en 26' de tems; on aura donc l'heure du Solstice, selon les observations de Mr. le Monnier, le 21 Juin à  $6^h 36''$ .

On remarquera présentement que ces deux Astronomes ont déterminé par la nouvelle méthode l'heure vraie du Solstice, l'un à  $6^h 33'$ , & l'autre à  $6^h 23'$ , avec une différence de 10' de tems, beaucoup plus grande que celle qui résulte de la comparaison des hauteurs du Soleil observées: il est vrai qu'il seroit fort aisé de concilier ces différences, en employant l'ascension droite d'Arcturus, telle qu'elle résulte de plusieurs autres observations de ces mêmes Astronomes; car mon Père, par un milieu qu'il a pris entre un grand nombre d'observations qu'il avoit faites pour déterminer le mouvement des Etoiles fixes en longitude, établit (a) l'ascension droite d'Arcturus, de  $210^{\circ} 56' 1''$ , dont retranchant  $9''$  pour l'aberration, on trouvera la vraie ascension droi-

(a) Voy. les Mém. de l'Ac. 1738. p. 384.

# 190 MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE

droite de cette Etoile, de  $210^{\circ} 55' 52''$ . Mr. le Monnier l'avoit trouvée (a) par ses observations, de  $210^{\circ} 55' 52''$ , précisément de même, quoique cependant il l'établit de  $210^{\circ} 56' 0''$ , ayant pris un milieu entre le résultat des observations de 1737 & 1738; d'ailleurs ces deux déterminations s'accordent parfaitement avec l'ascension droite de cette Etoile, que nous avons déterminée cette année de  $210^{\circ} 58' 2''\frac{1}{2}$ ; car si l'on en retranche  $2' 9''\frac{1}{2}$  pour la variation en ascension droite dans l'intervalle de trois années, on trouvera l'ascension droite de cette Etoile pour le mois de Juin de l'année 1738, de  $210^{\circ} 55' 52''$ .

Nous laissons présentement à juger sur l'exposé de ces observations & sur l'application que nous en avons faite aux deux différentes méthodes que l'on a mises en usage jusqu'à

\*Pag. 141.  
in 4.

\* présent, si l'une a un avantage si certain sur l'autre, qu'elle doive la faire rejeter, ou plutôt si elles ne peuvent pas être employées très utilement pour se vérifier réciproquement, & pour parvenir à la même recherche.

Tel a été le procédé de Mr. Manfredi, un des Auteurs de la nouvelle méthode. Avant que de la proposer, il jugea devoir en faire un essai sur le Solstice, tant d'Été que d'Hiver, de l'année 1734. Après avoir déterminé par onze observations correspondantes faites avant & après le Solstice, la distance en tems de Sirius au colure des Solstices, il conclut des distances de cette Etoile au Soleil, observées le

jour

(a) V. les mêmes, p. 366.

jour du Solstice, l'heure du Solstice d'Été le 21 Juin à 7<sup>h</sup> 52' tems vrai. Il parvient ensuite à la même recherche, en employant les mêmes hauteurs du Soleil observées avant & après le Solstice; & déduisant les autres élémens nécessaires pour le calcul des Tables de mon Grand-père, selon la méthode que feu Mr. Maraldi & mon Père ont pratiquée, il conclut l'heure du Solstice d'Été le 21 Juin à 7<sup>h</sup> 49', différente seulement de 3 minutes de tems.

On voit aisément par le résultat des observations qui sont rapportées dans l'excellent Livre que cet Astronome nous a donné (a) intitulé *de Gnomone meridiano*, à quel degré de précision l'on peut aspirer dans la détermination de l'ascension droite d'une fixe, & par conséquent dans celle de l'heure du Solstice; car quoique la plupart des observations aient été faites dans les circonstances les plus favorables, c'est-à-dire, proche des Equinoxes, où la variation diurne en déclinaison est la plus sensible, & quoiqu'on ne puisse d'ailleurs soupçonner leur exactitude, puisqu'elles ont été faites exprès, & qu'il s'agissoit de constater la précision d'une méthode dont Mr. Manfredi se croyoit le seul inventeur, on remarque cependant des différences de 3'' de tems dans la distance de Sirius au colure des Solstices, déduite de certaines observations, & par conséquent de 45'' dans l'ascension droite d'une fixe, dont la moitié 22<sup>1</sup>/<sub>2</sub> peut être regardée comme \* l'erreur commissible dans la détermination de l'ascension droite d'une fixe, que le Soleil parcourt en

(a) Page 79.

\* Pag. 143. in 4.

en 9 minutes de tems. Telle sera donc l'erreur qui en résultera sur le tems du Solstice.

Si l'on s'en rapporte à d'autres observations de ce même Astronome, exposées dans le même Livre (a) d'où il conclut, selon l'ancienne méthode, l'heure du Solstice d'Hiver de l'année 1733 le 21 Décembre à 6<sup>h</sup> 20', on déterminera aisément les limites de précision dans lesquelles cette méthode est renfermée.

Cet Astronome, après avoir insisté sur la nécessité d'employer un grand nombre d'observations des hauteurs du Soleil, pour prendre un milieu entre leurs différens résultats, & par conséquent pour approcher davantage du vrai, donne les résultats de dix observations correspondantes, dont la plupart s'accordent à quelques minutes près, & les plus éloignées diffèrent de 19 minutes; prenant la moitié de la plus grande différence, comme nous avons fait pour l'autre méthode, ou aura 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, qui sera l'erreur dont cette méthode peut être susceptible.

Après avoir déterminé l'heure du Solstice, il reste encore à connoître la hauteur solsticielle du Soleil pour en déduire l'obliquité de l'Ecliptique.

#### *Sur l'obliquité de l'Ecliptique.*

Nous avons déjà communiqué à l'Académie les observations que nous avons faites l'année dernière pour déterminer la hauteur du Soleil; nous avons exposé non seulement toutes

tes les précautions que l'on a prises pour une recherche aussi délicate, mais même les avantages que nos observations avoient sur toutes celles qui les ont précédées, fondées sur la perfection de l'instrument que l'on y a employé; nous avons jugé devoir répéter cette année les mêmes observations. Comme elles nous ont donné lieu de faire quelques remarques assez importantes, nous ne devons point différer à en faire part à l'Académie.

\* Ceux même qui prétendent que l'obliquité de l'Ecliptique diminue, conviennent que cette variation est insensible d'une année à l'autre, & nullement reconnoissable par voie d'observation. En effet, quoiqu'on ait souvent remarqué des différences dans les hauteurs solsticiales observées d'une année à l'autre, on avoit jugé devoir les attribuer aux erreurs des observations, & à la difficulté d'estimer de si petites quantités sur les divisions peu sensibles des instrumens; nous avons même avancé dans la comparaison des hauteurs solsticiales observées à Bourges & à Paris, qu'on pouvoit supposer la hauteur solsticiale constante d'une année à l'autre, & l'employer très utilement pour déterminer la différence de parallèle entre deux lieux où l'on aura fait l'observation correspondante, quoiqu'en deux années différentes; & en effet on remarquoit un accord si parfait entre les résultats de cette comparaison, qu'on ne devoit tout au plus qu'en être étonné. On ne pouvoit cependant juger par cette observa-



tion si l'obliquité de l'Ecliptique varie , à moins de supposer connue la différence des parallèles entre Paris & Bourges , & même sans tenir compte des réfractions différentes à la hauteur du Tropique , à Bourges & à Paris ; & il est aisé de concevoir que lorsque les observations ont besoin de quelque correction , il peut se faire que les erreurs se compensant , on trouve les mêmes résultats , quoique souvent les observations & les éléments que l'on emploie , soient fautifs ; d'où l'on peut conclurre que ce n'est que par des observations directes , faites dans le même lieu , avec le même instrument , par les mêmes Observateurs , qu'on pourra parvenir à quelque connoissance certaine sur cette matière.

Lorsque nous avons tenté cette année les mêmes observations que l'année précédente , nous étions bien éloignés de croire qu'elles nous feroient remarquer une différence si considérable , qu'elle est au-dessus des erreurs que l'on peut supposer , tant de la part de l'observation que de celle de l'instrument , & enfin dans un sens contraire à ce que l'on

\* Pag. 145. in 4. \* avoit observé jusqu'à présent , puisqu'il en résulteroit que l'obliquité de l'Ecliptique augmente , tandis que l'on a toujours cru qu'elle diminuoit. Une remarque si singulière devoit être fondée sur un grand nombre d'observations , & il nous a réussi d'en faire plusieurs qui concourent toutes à la preuve de ce fait ; nous ne rapporterons cependant que celles qui ont été faites proche du Solstice , nous

nous supprimerons le détail des autres, parce qu'il seroit nécessaire de rapporter toutes les circonstances de l'observation, & du tems qui n'a pas toujours été également favorable, le Soleil n'ayant paru souvent à midi qu'au travers d'une brume qui empêchoit de distinguer nettement ses bords.

Pour déterminer le zénith de notre instrument, nous avons employé la même Etoile que l'année dernière, l'Etoile  $\alpha$  de l'Ourse, dont voici les observations.

*Observations de l'Etoile  $\alpha$  de l'Ourse.*

|            |                                   |                 |     |     |       |   |                              |
|------------|-----------------------------------|-----------------|-----|-----|-------|---|------------------------------|
| 1741. .... | 10 Juin                           | 24 <sup>f</sup> | 36° | 15' | 31''  | } | 24 <sup>f</sup> 36° 15' 17'' |
|            | 11 Juin                           | 24              | 36  | 15  | 1     |   |                              |
|            | 12 Juin                           | 28              | 9   | 56  | 2     | } | 28 9 57 38                   |
|            | 13 Juin                           | 28              | 9   | 58  | 56    |   |                              |
|            | 14 Juin                           | 28              | 9   | 57  | 54    |   |                              |
|            | Somme . . . .                     |                 | 52  | 46  | 12 55 |   |                              |
|            | Zénith du Secteur . .             |                 | 26  | 23  | 6 27½ |   |                              |
|            | Distance de l'Etoile au Zénith. . |                 | 1   | 46  | 51 11 |   |                              |

On avoit trouvé par les observations de l'année dernière, la hauteur de cette Etoile au Zénith de l'Observatoire, de 1<sup>f</sup> 47° 11' 51'', de laquelle il faut retrancher . . . . 18 45 mouvement de cette Etoile en déclinaison dans l'intervalle d'une année, & l'on aura la distance de cette Etoile au Zénith pour le mois de Juin de cette année, de 1<sup>f</sup> 46° 53' 6'', plus grande de 2'' que par la détermination précédente.

\* Pag. 146. in 4. \* Observations des hauteurs du bord supérieur du Soleil.

| Jours.  | Points du limbe. | Réduet. au Solstice. | Hauteur solsticiale. |
|---------|------------------|----------------------|----------------------|
| 19 Juin | 16° 48' 16"      | + 50"                | 64° 54' 31"          |
| 20      | 17 26 23         | + 12                 | 64 54 32             |
| 23      | 16 49 19         | + 49                 | 64 54 31             |
| 24      | 15 42 54         | 1' 52"               | 64 54 29             |
| 29      | 4 24 30          | 13 12                | 64 54 30             |

En prenant un milieu entre ces observations, on trouve la hauteur solsticiale du bord supérieur du Soleil, de  $64^{\circ} 54' 31''$ ; on l'avoit trouvée par les observations de l'année dernière, de  $64^{\circ} 54' 24''$ , différente de  $7''$ .

Pour parvenir présentement à la connoissance de l'obliquité de l'Ecliptique, on est obligé de connoître la réfraction, la parallaxe, le demi-diamètre du Soleil, la hauteur du Pole; nous avons déduit l'année dernière, de la Connoissance des Temps, tous ces élémens, nous réservant cependant de les vérifier lorsque l'occasion s'en présenteroit, & que nous aurions les instrumens nécessaires pour cela.

Celui sur lequel il sembloit qu'on dût former le moins de doute, étoit le diamètre du Soleil déterminé une infinité de fois par différens Astronomes; cependant les observations que mon Père rapporte dans ses Elémens d'Astronomie, par lesquelles il a trouvé le diamètre du Soleil plus petit qu'il n'est marqué dans la Connoissance des Temps, m'ont paru mériter une nouvelle confirmation.

Quoi-

Quoique nous ayons fait cette année un grand nombre d'observations du diamètre du Soleil, elles ne nous paroissent pas encore suffisantes ni en assez grande quantité, pour que nous puissions absolument compter sur les résultats qu'elles nous ont donnés: ce qui est certain, c'est que toutes ont concouru à établir le diamètre du Soleil plus petit qu'il n'est marqué dans la Connoissance des Temps, & fort approchant de celui qu'a établi Mr. le Chevalier de Louville.

\* Nous avons reconnu après cet exact Ob- \* Pag.  
servateur, combien cette recherche est déli- 147. in 4.  
cate, combien il est difficile de s'assurer du parallélisme parfait des deux fils, de faire en sorte que ces fils comprennent exactement le diamètre du Soleil, dont les bords, quoique bien terminés, paroissent par une espèce d'ondulation, tantôt au-dessus & tantôt au-dessous du fil, & enfin combien le jeu de la vis est à craindre, puisqu'il se peut faire que la marche du fil ne réponde point à celle de la vis du Micromètre.

Nous ne pouvons donc encore rien prononcer de positif sur cette matière, & en attendant nous avons cru devoir nous arrêter à la détermination de Mr. de Louville; ainsi nous supposerons le demi-diamètre du Soleil de  $15^{\circ} 46''$ , la hauteur solsticielle du bord supérieur du Soleil ayant été déterminée de  $64^{\circ} 54' 31''$ , on trouvera celle de son centre de  $64^{\circ} 38' 15''$ , de laquelle ôtant  $25''$  pour la refraction moins la parallaxe, &  $41^{\circ} 9' 50''$ , hauteur du pôle de l'Observatoire, il reste-



ra par l'obliquité de l'Ecliptique  $23^{\circ} 28' 30''$ .

Cette nouvelle détermination est si différente de celle que nous avons établie l'année dernière, qu'elle m'a paru devoir être confirmée par d'autres observations.

Tandis que j'observois au Secteur avec Mr. l'Abbé de la Caille, mon Père déterminoit sur la Méridienne la hauteur des deux bords du Soleil; mais comme son image n'a paru bien terminée que le 23 Juin, nous ne pouvons ici faire usage que de cette seule observation.

Le 23 Juin mon Père a déterminé la hauteur des deux bords du Soleil, l'une de  $64^{\circ} 21' 5''$ , & l'autre de  $64^{\circ} 54' 52''$ , avec une différence de  $33' 47''$ , dont la moitié  $15' 52''$  étant retranchée de  $64^{\circ} 54' 52''$ , donne la hauteur apparente du centre du Soleil, de  $64^{\circ} 37' 58''$ : si l'on en retranche  $25''$  pour la réfraction,  $41^{\circ} 9' 50''$  pour la hauteur de l'Equateur, on trouvera la déclinaison du Soleil le 23 Juin, de  $23^{\circ} 27' 43''$ ; mais l'Equation qui convient à la distance du Soleil au Solstice, est de  $49''$  additive, donc\* l'obliquité de l'Ecliptique sera de . . . .  $23^{\circ} 28' 32''$ , peu différente de celle qu'on a trouvée par les observations faites au Secteur.

Par les observations faites à la Méridienne en 1738, & rapportées dans les Mémoires de l'Académie de la même année, mon Père avoit conclu l'obliquité de l'Ecliptique de  $23^{\circ} 28' 20''$ , avec une différence de  $12''$ ; ainsi toutes les observations faites, tant à la Méridienne qu'au Secteur, concourent à prou-

\* Pag.  
248. in 4.




prouver que l'obliquité de l'Ecliptique augmente après avoir diminué , qu'elle a été , pour ainsi dire , stationnaire pendant plusieurs années , où elle a été trouvée de  $23^{\circ} 28' 20''$  , & que présentement elle augmente considérablement , ce qui méritoit bien d'être remarqué , mais ce qui a encore besoin de nouvelles preuves , que nous espérons trouver dans les observations des Astronomes qui auront fait la même remarque.



132

VAN 1519564









xii

11

~~LX~~  
~~B~~  
~~17~~

